

# Bài tập cơ sàn chậu & Tập luyện bàng quang

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Phương pháp đầu tay đơn giản, hiệu quả cho rò rỉ và tiểu gấp

Hai bước đầu tiên hiệu quả nhất để kiểm soát bàng quang không cần thuốc hay phẫu thuật: **bài tập cơ sàn chậu** (thường gọi là bài tập Kegel) giúp tăng cường cơ giữ nước tiểu, và **tập luyện bàng quang** giúp bàng quang chờ lâu hơn giữa các lần đi vệ sinh. Thực hiện đều đặn, hai phương pháp này cải thiện tình trạng tiểu rò rỉ khi gắng sức, tiểu gấp và tiểu nhiều lần — hoàn toàn miễn phí và an toàn.

## Tác dụng như thế nào

- **Bài tập cơ sàn chậu** tăng cường cơ nâng đỡ bàng quang và niệu đạo, giúp giảm rò rỉ khi ho, mang vác hoặc vận động — và giúp kiểm chế cơn tiểu gấp.
- **Tập luyện bàng quang** dần kéo dài khoảng cách giữa các lần đi vệ sinh, làm dịu bàng quang tăng hoạt và giảm tiểu nhiều lần.

## Tìm đúng nhóm cơ

Cơ sàn chậu là các cơ bạn dùng để **ngừng dòng nước tiểu** hoặc nhin hơi. Co và nâng các cơ đó lên, **không** siết bụng, hông hay đùi, và **không nín thở**. (Đừng thực hành bằng cách thực sự ngừng dòng tiểu — đó chỉ là cách xác định vị trí cơ.) Nếu bạn chưa tìm được đúng cơ, **chuyên gia vật lý trị liệu sàn chậu** có thể hỗ trợ, đôi khi bằng phản hồi sinh học (biofeedback).

## GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

### Sàn chậu

Nhóm cơ nâng đỡ bàng quang, ruột và (ở phụ nữ) tử cung.

### Bài tập Kegel

Bài tập co/thả cơ sàn chậu.

### Tập luyện bàng quang

Dần tăng thời gian giữa các lần đi vệ sinh.

### Kiểm chế tiểu gấp

Làm dịu cơn tiểu gấp để có thể đến toilet mà không bị rò rỉ.

### Phản hồi sinh học (Biofeedback)

Thiết bị cho thấy bạn có đang dùng đúng cơ không.

### Vật lý trị liệu sàn chậu

Chuyên gia trị liệu chuyên về nhóm cơ này.

**BAO LÂU THÌ CÓ HIỆU QUẢ?** Hãy kiên nhẫn — hầu hết mọi người nhận thấy cải thiện sau khoảng **6–12 tuần** luyện tập đều đặn, và hiệu quả tiếp tục tăng khi duy trì thói quen. Như mọi bài tập, lợi ích sẽ giảm nếu bạn ngừng, vì vậy mục tiêu là biến đây thành thói quen hằng ngày lâu dài.

### Thói quen hằng ngày đơn giản

- 1 **Co** cơ sàn chậu và giữ từ 3–5 giây, sau đó **thả** hoàn toàn trong cùng khoảng thời gian đó.
- 2 Lặp lại khoảng **10 lần**, thực hiện **3 đợt mỗi ngày**. Tăng dần thời gian giữ khi cơ khỏe hơn.
- 3 Thêm một vài lần **co nhanh, mạnh** để dùng ngay trước khi ho, hắt hơi hoặc mang vác (“động tác phòng ngừa”).
- 4 Thả hoàn toàn giữa các lần co quan trọng không kém gì bản thân động tác co.

### Tập luyện bàng quang

- Ghi **nhật ký bàng quang** ngắn gọn để theo dõi thói quen của bạn.
- Khi cơn tiểu gấp ập đến, **dừng lại, co cơ sàn chậu, hít thở và chờ cơn qua đi** — rồi bình tĩnh đi đến toilet.
- Dần kéo dài khoảng cách giữa các lần đi tiểu thêm 15 phút mỗi bước, hướng đến mỗi 3–4 giờ.

### Điều cần biết

- Bạn có thể tập ở **bất cứ đâu** — không ai biết bạn đang tập.
- Kiên trì quan trọng hơn cường độ; gắn bài tập với việc thường ngày (bữa ăn, đèn đỏ).
- Nếu bạn có **đau vùng chậu** hoặc cơ sàn chậu quá căng, mục tiêu có thể là **thả lỏng** (không phải tăng cường) — hỏi nhóm chăm sóc của bạn.

#### Hãy hỏi nhóm chăm sóc nếu:

- Bạn không chắc mình đang dùng đúng cơ
- Bài tập **làm đau tăng lên** hoặc tạo cảm giác nặng nề
- Sau vài tháng bạn chưa thấy cải thiện

### BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Bài tập cơ sàn chậu và tập luyện bàng quang là phương pháp đầu tay an toàn, miễn phí, được chứng minh hiệu quả cho rò rỉ, tiểu gấp và tiểu nhiều lần.
2. Co đúng cơ (không nín thở), thả hoàn toàn giữa các lần co, và tập luyện để bàng quang chờ lâu hơn.
3. Kiên trì 6–12 tuần và duy trì thói quen. Nếu đau tăng hoặc chưa tìm được đúng cơ, hỏi về vật lý trị liệu sàn chậu.