

Khâu Gấp Nếp Dương Vật

Thông tin cho bệnh nhân · Phẫu thuật chỉnh thẳng dương vật (bệnh Peyronie)

WARWIKI

Bệnh Peyronie gây ra một mảng sẹo bên trong dương vật khiến dương vật bị cong khi cương, đôi khi làm cho việc quan hệ tình dục trở nên khó khăn. Khâu gấp nếp dương vật (penile plication) chỉnh thẳng chỗ cong bằng cách đặt mũi khâu vào phía dài hơn của dương vật để “gấp nếp” nhẹ, cho khớp với phía ngắn hơn. Tờ thông tin này giải thích cách thực hiện, cách chuẩn bị và những điều cần biết.

Về thủ thuật này

Trong bệnh Peyronie, mô sẹo kéo căng một phía dương vật, khiến dương vật bị cong khi cương. Khâu gấp nếp chỉnh thẳng bằng cách khâu và làm ngắn **phía dài hơn (phía ngoài)** của chỗ cong cho đến khi cả hai phía bằng nhau. Không cần cắt sẹo và không dùng mảnh ghép — đây là phẫu thuật chỉnh thẳng đơn giản và ngắn nhất, với **nguy cơ thấp nhất gây ra vấn đề cương dương mới**.

Đây là lựa chọn phù hợp khi:

- Độ cong ở mức vừa phải và không quá phức tạp
- **Chức năng cương dương còn tốt** (có hoặc không cần thuốc hỗ trợ)
- Dương vật đủ dài để có thể chấp nhận việc làm ngắn một chút

Những điều cần biết

Đánh đổi chính là dương vật sẽ **ngắn hơn** một chút — thường khoảng 1–2 cm. Nhiều nam giới đánh giá quá mức điều này; vì chỗ cong được chỉnh thẳng, chiều dài sử dụng được thực tế thường không kém trước. Khoảng **9 trong 10** nam giới đạt được sự cương đủ thẳng để quan hệ. Bạn có thể **sờ thấy các mũi khâu** dưới da (thường gấp và thường không gây khó chịu). Mục tiêu là dương vật đủ thẳng để quan hệ thoải mái, không nhất thiết phải hoàn toàn thẳng.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Bệnh Peyronie

Mảng sẹo trong dương vật khiến dương vật bị cong khi cương.

Mảng xơ (plaque)

Vùng mô sẹo gây ra sự cong.

Khâu gấp nếp (plication)

Chỉnh thẳng dương vật bằng cách khâu và làm ngắn phía dài hơn.

Cương dương nhân tạo

Sự cương được tạo ra trong phòng mổ (bằng cách tiêm) để bác sĩ đo và kiểm tra độ cong.

Cắt bao quy đầu

Cắt bỏ bao quy đầu — đôi khi thực hiện cùng lúc nếu bạn chưa được cắt.

Dụng cụ bơm hút (vacuum device)

Máy bơm đôi khi dùng trong thời gian lành thương để giúp duy trì chiều dài và chức năng cương.

Gây mê toàn thân

Thuốc giúp bạn ngủ sâu và không đau trong suốt ca phẫu thuật.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân, gây tê tùy sống, hoặc gây tê tại chỗ, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Sau đó, dương vật sẽ sưng, bầm và đau nhức trong 1–2 tuần — chườm đá, mặc đồ lót hỗ trợ và dùng thuốc giảm đau sẽ giúp ích. Đây là ca mổ ngắn (thường khoảng một giờ) và thường thực hiện trong ngày. Ống thông tiểu có thể được đặt trong thời gian ngắn.

Cách chuẩn bị (trước phẫu thuật)

- Thực hiện dưới **gây mê toàn thân, gây tê tùy sống, hoặc gây tê tại chỗ** — tuân thủ mọi hướng dẫn phẫu thuật (nhịn ăn, và thuốc nào cần ngừng, kể cả thuốc làm loãng máu).
- Bệnh Peyronie của bạn cần **ổn định** (độ cong và đau đã không thay đổi trong vài tháng) — bác sĩ phẫu thuật xác nhận thời điểm phù hợp.
- Không hút thuốc lá**; mọi nhiễm trùng cần được điều trị trước, và bạn sẽ được dùng kháng sinh. Nếu chưa cắt bao quy đầu, có thể thực hiện cùng lúc — hỏi bác sĩ phẫu thuật.

Hãy báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Có **chức năng cương dương yếu** hoặc đang dùng thuốc hỗ trợ cương
- Đang dùng thuốc làm loãng máu, hoặc đã từng phẫu thuật dương vật trước đây

Quá trình phẫu thuật

- Bạn được gây mê hoặc gây tê, và được dùng kháng sinh.
- Tạo cương dương bằng cách tiêm** để bác sĩ quan sát độ cong, sau đó đặt mũi khâu vào phía dài hơn để gấp nếp và chỉnh thẳng dương vật.
- Kết quả được kiểm tra lại bằng cách tạo cương một lần nữa, rồi đóng da (có thể cắt bao quy đầu cùng lúc nếu cần).

Sau phẫu thuật

- Dự kiến **sưng, bầm và đau nhức** trong 1–2 tuần. Dùng đá chườm, đồ lót hỗ trợ và thuốc giảm đau; giữ vùng mổ sạch sẽ.
- Nếu có đặt ống thông tiểu, thường được rút vào sáng hôm sau phẫu thuật.
- Tránh quan hệ tình dục khoảng 4–6 tuần** để vết mổ lành.
- Bác sĩ có thể yêu cầu bạn dùng **thuốc hỗ trợ cương liều thấp** và/hoặc dùng **dụng cụ bơm hút** hàng ngày trong thời gian lành thương để giúp duy trì chiều dài và chức năng cương.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh, hay vết thương ngày càng đỏ, đau, sưng hoặc có dịch tiết
- Không thể đi tiểu được
- Sưng hoặc đau nặng và tăng dần, hoặc chảy máu nhiều

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- Khâu gấp nếp chỉnh thẳng chỗ cong bằng cách khâu phía dài hơn của dương vật — không cắt sẹo, không dùng mảnh ghép. Đây là phẫu thuật chỉnh thẳng đơn giản nhất, ít nguy cơ gây rối loạn cương dương mới nhất.
- Đánh đổi là dương vật ngắn hơn một chút (thường 1–2 cm), nhưng việc chỉnh thẳng thường khôi phục chiều dài sử dụng được; khoảng 9/10 nam giới đạt cương đủ thẳng. Bạn có thể sờ thấy các mũi khâu dưới da.
- Bệnh Peyronie cần ổn định trước; không hút thuốc. Sau mổ, tránh quan hệ ~4–6 tuần và tuân theo kế hoạch phục hồi (thuốc / dụng cụ bơm hút). Gọi ngay nếu có sốt, sưng nặng hoặc khó tiểu.