

Liệu pháp kéo giãn dương vật

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Thiết bị đeo giúp kéo giãn nhẹ nhàng để giảm độ cong

Liệu pháp kéo giãn dương vật sử dụng một thiết bị tạo **lực kéo giãn nhẹ, liên tục** trên dương vật theo thời gian. Phương pháp này chủ yếu dùng cho **bệnh Peyronie** (để giảm độ cong và giúp duy trì chiều dài), đồng thời hỗ trợ phục hồi dương vật — ví dụ, duy trì chiều dài sau phẫu thuật đặt bộ phận giả. Đây là phương pháp không phẫu thuật và an toàn, nhưng chỉ hiệu quả khi **sử dụng đều đặn mỗi ngày trong nhiều tháng**.

Cơ chế hoạt động

Lực kéo nhẹ, duy trì liên tục giúp mô và mô sẹo (màng xơ) dần dần **tái cấu trúc**, từ đó có thể giảm độ cong và giúp duy trì chiều dài. Hiệu quả là vừa phải và từ từ — đây là liệu pháp chậm và bền, không phải giải pháp nhanh chóng. Thường kết hợp với các phương pháp điều trị bệnh Peyronie khác.

Điều cần biết

- Bạn đeo thiết bị trong **thời gian quy định mỗi ngày** theo hướng dẫn của từng loại thiết bị (một số đeo liên tục lâu hơn; loại mới hơn dùng nhiều lần ngắn trong ngày).
- Kết quả tích lũy sau **nhiều tháng** — tính nhất quán là yếu tố then chốt.
- Hiệu quả tốt nhất thường ở **giai đoạn hoạt động** của bệnh Peyronie hoặc kết hợp cùng các phương pháp khác.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Liệu pháp kéo giãn

Dùng thiết bị để kéo giãn dương vật nhẹ nhàng theo thời gian.

Bệnh Peyronie

Mô sẹo làm cong dương vật — lý do chính để dùng liệu pháp kéo giãn.

Màng xơ (plaque)

Mô sẹo mà lực kéo giãn giúp tái cấu trúc.

Phục hồi dương vật

Duy trì chiều dài/chức năng, ví dụ sau phẫu thuật đặt bộ phận giả.

Giai đoạn hoạt động và ổn định

Cho biết độ cong của bệnh Peyronie còn thay đổi hay đã ổn định.

CÓ THỰC SỰ HIỆU QUẢ KHÔNG? Phương pháp này có thể mang lại **cải thiện thực sự, vừa phải** về độ cong và chiều dài — nhưng chỉ khi bạn sử dụng đều đặn trong nhiều tháng. Hãy xem như đây là vật lý trị liệu cho dương vật: dần dần và phụ thuộc vào tính nhất quán. Nó không tự mình làm thẳng hoàn toàn độ cong nặng, và phối hợp tốt với tiêm thuốc hoặc phẫu thuật.

Sử dụng an toàn

- 1 Tuân thủ đúng hướng dẫn **thời gian đeo và lực căng** của thiết bị — không siết quá chặt.
- 2 Chỉ dùng khi dương vật ở trạng thái mềm; ngừng ngay nếu có **tê, đổi màu hoặc đau**.
- 3 Tăng dần thời gian đeo khi bạn đã quen.
- 4 Giữ thiết bị sạch sẽ và nghỉ theo hướng dẫn.

Nên biết thêm

- Thiết bị kín đáo và dùng tại nhà; nhiều bệnh nhân kết hợp với các phương pháp điều trị bệnh Peyronie khác.
- Cần kiên nhẫn — đánh giá kết quả sau nhiều tháng, không phải sau vài ngày.
- Hỏi nhóm chăm sóc loại thiết bị và lịch trình phù hợp với bạn.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Tê** hoặc dương vật lạnh, nhợt, hoặc xanh tím không phục hồi nhanh
- Đau kéo dài, trầy da, hoặc loét
- Độ cong tăng thêm hoặc xuất hiện cục mới

Tác dụng thường gặp

- Đỏ da hoặc vết hằn tạm thời ở chỗ thiết bị tiếp xúc
- Khó chịu nhẹ, giảm dần khi quen

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Liệu pháp kéo giãn dương vật giúp giảm độ cong do bệnh Peyronie và duy trì chiều dài — không phẫu thuật và an toàn.
2. Chỉ có hiệu quả khi **sử dụng đều đặn mỗi ngày trong nhiều tháng**; kết quả dần dần và vừa phải, thường kết hợp với các phương pháp khác.
3. Không bao giờ siết quá chặt. Ngừng và gọi nhóm chăm sóc nếu có tê, đổi màu, hoặc đau kéo dài.