
(A) Lesion detection under universal colonoscopy among men
Low-risk adenoma
High-risk adenoma
Any adenoma
Colorectal cancer
PRENEC-derived FIT sensitivity
Literature-based FIT sensitivity
31.7%
30.6%
14.4%
14.5%
46.0%
45.2%
0.542%
0.556%
29.1%
28.1%
13.6%
13.7%
51.0%
50.1%
0.732%
0.751%
Lesion detection under universal colonoscopy (%)
(B) Prevalence among men
39.7%
38.4%
17.6%
17.7%
49.7%
48.8%
0.594%
0.609%
36.5%
35.2%
16.6%
16.7%
55.1%
54.2%
0.802%
0.824%
Prevalence (%)
(C) Lesion detection under universal colonoscopy among women
18.9%
18.7%
8.1%
8.7%
26.4%
27.8%
0.211%
0.181%
17.4%
17.2%
7.7%
8.2%
29.3%
30.8%
0.286%
0.245%
Lesion detection under universal colonoscopy (%)
(D) Prevalence among women
23.7%
23.5%
9.9%
10.6%
28.5%
30.0%
0.232%
0.199%
21.7%
21.5%
9.3%
10.0%
31.7%
33.3%
0.313%
0.268%
Prevalence (%)
Analysis base
Base A
Base B