

# 107年第2次北科入學數學會考

---

## 107-02-01

### Statement

設拋物線 $y = ax^2 + bx - c$ ， $a$ 、 $b$ 、 $c$ 皆為正實數，則下列敘述何者正確？

- (A) 開口向下
- (B) 與 $x$ 軸無交點
- (C) 交於正 $y$ 軸
- (D) 頂點在第三象限
- (E) 準線平行 $y$ 軸

### Solution

$$y = ax^2 + bx - c$$

$$\Rightarrow y = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) - \frac{b^2}{4a} - c$$

$$\Rightarrow y = a\left(x + \frac{b}{2a}\right) - \frac{b^2}{4a} - c$$

因此可知頂點為 $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2 + 4ac}{4a}\right)$ ，必在第三象限，故選(D)

## 107-02-02

### Statement

$(150x^5 - 312x^4 + 28x^3 - 13x - 9) \div (x - 2)$ 的餘式為何？

- (A)  $-19$
- (B)  $-3$
- (C)  $-1$
- (D)  $1$
- (E)  $3$

### Solution

利用綜合除法

$$\begin{array}{r}
 150 \quad -312 \quad 28 \quad 0 \quad -13 \quad -9 \\
 \phantom{150} \quad 300 \quad -24 \quad 8 \quad 16 \quad 6 \\
 \hline
 150 \quad -12 \quad 4 \quad 8 \quad 3 \quad -3
 \end{array} \bigg| 2$$

可得餘式為 $-3$ ，故選(B)

## 107-02-03

### Statement

設 $Q(a, b)$ 為直線 $L: 2x - y = 4$ 到 $P(1, 3)$ 的最近點，則 $a + b = ?$

(A) 2

(B)  $\frac{7}{2}$

(C) 5

(D)  $\frac{13}{2}$

(E) 7

### Solution

考慮做一直線 $M$ 垂直直線 $L$ ，且過點 $(1, 3)$

因此直線 $M: x + 2y = d$ ，代入 $(1, 3)$ 得到 $d = 7$

找直線 $L$ 與直線 $M$ 的交點，解聯立方程組 $\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2x - y = 4 \end{cases} \Rightarrow (x, y) = (3, 2)$

因此 $Q(a, b) = (3, 2)$ ， $a + b = 5$ ，故選(C)

## 107-02-04

### Statement

設有一橢圓中心在 $(1, 1)$ ，其長軸平行 $x$ 軸且長軸長為短軸長的3倍，並通過 $(4, 0)$ ，則短軸長為何？

(A)  $2\sqrt{2}$

(B)  $2\sqrt{3}$

(C)  $2\sqrt{5}$

(D)  $2\sqrt{6}$

(E)  $4\sqrt{2}$

## Solution

設 $2a = 3 \times 2b = 6b$ ，因此 $a = 3b$

可列式 $\frac{(x-1)^2}{9b^2} + \frac{(y-1)^2}{b^2} = 1$

代入 $(4, 0)$ 可得 $b = \sqrt{2}$ ，因此短軸長 $2b = 2\sqrt{2}$ ，故選(A)

## 107-02-05

### Statement

若直線 $3x + 4y + k = 0$ 與圓 $x^2 + y^2 + 8x + 16y - 20 = 0$ 相切且 $k < 0$ ，則 $k = ?$

(A)  $-8$

(B)  $-6$

(C)  $-4$

(D)  $-3$

(E)  $-2$

## Solution

$$x^2 + y^2 + 8x + 16y - 20 = 0$$

透過配方法後可得 $(x+4)^2 + (y+8)^2 = 100$

可得半徑為10且中心為 $(-4, -8)$

考慮直線與圓相切，因此直線與中心相隔的距離為10

利用點到直線公式， $\frac{|3x + 4y + k|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 10$

將 $x, y$ 代入 $(-4, -8)$ ，得到 $|-44 + k| = 50$ ，因此 $k = -6$ 或 $k = 94$ (不合)，故選(B)

## 107-02-06

### Statement

設 $\vec{a} = \langle 1, t-1 \rangle$ 、 $\vec{b} = \langle 2t-2, t+2 \rangle$ 。若 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 且 $|\vec{b}| > 2$ ，則 $t = ?$

(A)  $-4$

(B)  $-1$

(C)  $1$

(D)  $2$

(E)  $4$

## Solution

已知 $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，因此 $2t - 2 + (t + 2)(t - 1) = t^2 + 3t - 4 = (t + 4)(t - 1) = 0$

故 $t = -4$ 或 $t = 1$

考慮 $t = 1$ ，得到 $\vec{b} = \langle 0, 3 \rangle = \sqrt{0^2 + 3^2} = 3$

考慮 $t = -4$ ，得到 $\vec{b} = \langle -10, -2 \rangle = \sqrt{10^2 + 2^2} = \sqrt{104}$

故兩者皆可，故選(A), (C)

## 107-02-07

### Statement

設 $f(x) = (5^{2x} + 5^{-2x}) - (5^x + 5^{-x}) + 3$ ，則 $f(x)$ 的最小值為何？

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

## Solution

令 $t = 5^x + 5^{-x}$ ，則 $t^2 = 5^{2x} + 5^{-2x} + 2$

因此 $f(t) = t^2 - t + 1 = (t - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$

利用算幾不等式，得到 $\frac{5^x + 5^{-x}}{2} \geq \sqrt{1}$ ，得到 $t$ 的最小值域為2，故 $t = \frac{1}{2}$ 不在值域內。

將2帶入 $f(t)$ 得到 $f(2) = \frac{9}{4} + \frac{3}{4} = \frac{12}{4} = 3$ ，故選(C)

## 107-02-08

### Statement

不等式 $x^2 - 4x + 2 \geq |x - 2|$ 的解為何？

(A)  $(-\infty, 0] \cup [1, \infty)$

(B)  $(-\infty, 0] \cup [2, \infty)$

(C)  $(-\infty, 0] \cup [4, \infty)$

(D)  $(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$

(E)  $(-\infty, 1] \cup [4, \infty)$

## Solution

考慮 $|x - 2| = x - 2$ ，則

$$x^2 - 4x + 2 \geq x - 2$$

$$\Rightarrow x^2 - 5x + 4 \geq 0$$

$$\Rightarrow (x - 4)(x - 1) \geq 0$$

$$\Rightarrow x \geq 4 \text{ 或 } x \leq 1$$

考慮 $|x - 2| = -x + 2$ ，則

$$x^2 - 4x + 2 \geq -x + 2$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x \geq 0$$

$$\Rightarrow x(x - 3) \geq 0$$

$$\Rightarrow x \leq 0 \text{ 或 } x \geq 3$$

兩種結果取交集，得到 $(-\infty, 0] \cup [4, \infty)$ ，故選(C)

## 107-02-09

### Statement

設 $a = \log \frac{4}{3}$ 、 $b = \log \frac{2}{3}$ ，則 $\log 24 = ?$

(A)  $2a - 5b$

(B)  $3a - 5b$

(C)  $4a - 5b$

(D)  $4a - 4b$

(E)  $4a - 3b$

## Solution

$$4a - 5b = 4 \log \frac{4}{3} - 5 \log \frac{2}{3} = \log \left( \left( \frac{4}{3} \right)^4 \cdot \left( \frac{3}{2} \right)^5 \right) = \log 3 \cdot 2^3 = \log 24 \text{，故選(C)}$$

## 107-02-10

### Statement

設方程式 $3^{x^2} \cdot (3^x)^2 = 27$ 之所有解為 $\alpha$ 與 $\beta$ ，則 $\alpha^2 + \beta^2 = ?$

(A) 10

(B) 11

(C) 12

(D) 13

(E) 14

### Solution

$$3^{x^2} \cdot (3^x)^2 = 27$$

$$\Rightarrow 3^{x^2} \cdot 3^{2x} = 3^3$$

$$\Rightarrow 3^{x^2+2x-3} = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$\Rightarrow (x+3)(x-1) = 0$$

可得  $x = 1$  或  $x = -3$

因此  $\alpha^2 + \beta^2 = (1)^2 + (-3)^2 = 10$ ，故選(A)

## 107-02-11

### Statement

$$\sin(-23^\circ) \sin 367^\circ + \cos 7^\circ \sin(-247^\circ) = ?$$

(A)  $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

(B)  $-\frac{1}{2}$

(C)  $\frac{1}{2}$

(D)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(E)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

### Solution

$$\sin(-23^\circ) \sin 367^\circ + \cos 7^\circ \sin(-247^\circ)$$

$$= -\sin(23^\circ) \sin 7^\circ + \cos 7^\circ \cos(23^\circ)$$

$$= \cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \text{故選(E)}$$

## 107-02-12

### Statement

若  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ，則  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(3x-1) - f(x+1)}{x-1} = ?$

(A)  $\sqrt{2}$

(B)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(C)  $\frac{\sqrt{2}}{4}$

(D)  $\frac{-\sqrt{2}}{4}$

(E)  $\frac{-\sqrt{2}}{2}$

### Solution

$$\begin{aligned} \text{令 } h = x - 1, \text{ 則 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(3x-1) - f(x+1)}{x-1} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h+2) - f(h+2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h+2) - f(2) - f(h+2) + f(2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h+2) - f(2)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+2) - f(2)}{h} \\ &= 3 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3h+2) - f(2)}{3h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+2) - f(2)}{h} \\ &= 3 \cdot f'(2) - f'(2) = 2f'(2) = 2 \cdot -\frac{1}{4\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}}{4}, \text{ 故選 (D)} \end{aligned}$$

## 107-02-13

### Statement

若甲乙兩人解方程式  $x^2 + mx + n = 0$ ，甲看錯  $m$  解得兩根為  $-3$ 、 $5$ ，乙看錯  $n$  解得兩根為  $-4$ 、 $2$ ，則原方程式的兩根為何？

(A)  $-3$ 、 $-4$

(B)  $-3$ 、 $2$

(C)  $-4$ 、 $5$

(D)  $2$ 、 $5$

(E)  $3$ 、 $-5$

## Solution

甲的方程式為  $(x+3)(x-5) = x^2 - 2x - 15$

乙的方程式為  $(x+4)(x-2) = x^2 + 2x - 8$

因此可得原方程式為  $x^2 + 2x - 15 = (x+5)(x-3)$ ，解為  $x = -5$  或  $x = 3$ ，故選 (E)

## 107-02-14

### Statement

設  $\frac{x^2 + x - 3}{(x-1)^2(x^2 - x + 1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 - x + 1}$ ，則  $B = ?$

(A)  $-7$

(B)  $-5$

(C)  $-3$

(D)  $-1$

(E)  $2$

## Solution

$$\frac{x^2 + x - 3}{(x-1)^2(x^2 - x + 1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 - x + 1}$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 3 = A(x^2 - x + 1)(x-1) + B(x^2 - x + 1) + (Cx + D)(x-1)^2$$

故代  $x = 1$ ，得  $-1 = B$ ，故選 (D)

## 107-02-15

### Statement

設直線  $L$  通過  $P(1, 6)$  且與第二象限所圍的三角形面積為 4，則直線  $L$  的方程式為

(A)  $4x - y = 2$

(B)  $x + 4y = 5$

(C)  $2x - y = -4$

(D)  $2x + y = 8$

(E)  $4x + y = 4$



## Solution

令  $L: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ，又已知  $ab = -8$ ，得  $a = \frac{-8}{b}$

將  $L$  代入  $P(1, 6)$ ， $L: \frac{1}{a} + \frac{6}{b} = 1$

代入  $a = \frac{-8}{b}$ ， $L: -\frac{b}{8} + \frac{6}{b} = 1$

$$\Rightarrow \frac{-b^2}{8} + 6 = b$$

$$\Rightarrow -b^2 - 8b + 48 = 0$$

$$\Rightarrow (b + 12)(b - 4) = 0$$

得到  $b = 4$  或  $b = -12$  (不合， $ab > 0$ )

因此  $a = -2$ ，代入得  $2x - y = -4$ ，故選 (C)

## 107-02-16

### Statement

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} + x) = ?$$

(A) 2

(B) 1

(C) -1

(D) -2

(E) 不存在

### Solution

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} + x) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2x - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x} - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{|x| \sqrt{1 + \frac{2}{x}} - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{-\sqrt{1 + \frac{2}{x}} - 1} = \frac{2}{-2} = -1，故選 (C) \end{aligned}$$

## 107-02-17

### Statement

設 $a = \log 2$ 、 $b = \log 3$ 。若 $x$ 滿足 $5^x - 6 \cdot 5^{-x} = 1$ ，則 $x = ?$

(A)  $\frac{a}{1+b}$

(B)  $\frac{b}{1+a}$

(C)  $\frac{b}{a}$

(D)  $\frac{b}{1-a}$

(E)  $\frac{a}{1-b}$

### Solution

$$5^x - 6 \cdot 5^{-x} = 1$$

$$\Rightarrow 5^{2x} - 6 = 5^x$$

$$\Rightarrow 5^{2x} - 5^x - 6 = 0$$

設 $t = 5^x$ ，則

$$t^2 - t - 6 = 0$$

$$\Rightarrow (t-3)(t+2) = 0$$

得到 $t = -2$ (不合)或 $t = 3$

還原 $t$ 得到 $x = \log_5 3 = \frac{b}{1-a}$ ，故選(D)

## 107-02-18

### Statement

函數 $f(x) = \tan^2 x - \sec x + 4$ 之最小值為何？

(A)  $\frac{11}{4}$

(B) 3

(C)  $\frac{13}{4}$

(D)  $\frac{7}{2}$

(E)  $\frac{15}{4}$

## Solution

$$f(x) = \tan^2 x - \sec x + 4$$

$$= \sec^2 x - 1 - \sec x + 4$$

$$= \sec^2 x - \sec x + 3$$

$$= \left(\sec^2 x - \sec x + \frac{1}{4}\right) + 3 - \frac{1}{4}$$

$$= \left(\sec x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{11}{4}$$

由於 $\sec x$ 的值域為 $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ ，因此 $\frac{1}{2}$ 不在 $\sec x$ 的值域內

從值域考慮 $\sec x = 1$ ，得最小值為3，故選(B)

## 107-02-19

### Statement

設 $f(x) = \sqrt{5-x}$ 、 $g(x) = \frac{1}{\sqrt{3-x}}$ ，則合成函數 $g \circ f$ 的定義域為何？

(A)  $(-4, 5]$

(B)  $[-4, 5)$

(C)  $[-4, 3)$

(D)  $(-4, 3]$

(E)  $[3, 5]$

## Solution

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{\sqrt{3 - \sqrt{5-x}}}$$

考慮 $\sqrt{3 - \sqrt{5-x}} > 0$ ，則 $3 - \sqrt{5-x} > 0$ ，得到 $x > -4$

考慮 $\sqrt{5-x}$ 裡面的值必須要是非負整數，因此 $x \leq 5$

兩者取交集得到 $(-4, 5]$ ，故選(A)

## 107-02-20

### Statement

若 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + (a-3)x - 3a}{x^2 + 3x + 2} = b$ ，則 $ab = ?$

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

(E) 10

### Solution

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + (a-3)x - 3a}{x^2 + 3x + 2} = b$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + (a-3)x - 3a}{(x+2)(x+1)} = b$$

考慮到極限存在，則分子必須要能被 $(x+2)$ 整除

因此 $4 + (-2)(a-3) - 3a = 0$ ，得到 $a = 2$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - x - 6}{x^2 + 3x + 2} = b$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x-3)(x+2)}{(x+2)(x+1)} = 5$$

故 $b = 5$ ，因此 $ab = 10$ ，故選(E)