

# 國立台北科技大學 數學入學會考詳解

---

## 作者

---

- 109 資工系 黃漢軒
  - [Instagram](#)
  - [sigtunatw@gmail.com](mailto:sigtunatw@gmail.com)
- 109 化工系 羅昇宇
  - [Instagram](#)
  - [qoo18105@gmail.com](mailto:qoo18105@gmail.com)

感謝北科入學會考出題老師。

所有的解答均為非官方，有任何勘誤上的問題，請聯繫作者。

## 100年第1次北科入學數學會考

---

### 100-01-01

#### Statement

已知 $f(x)$ 為一實系數多項式，且 $f(\frac{3}{2}) = 27$ ， $f(-\frac{5}{3}) = 8$ 。

若 $f(x)$ 除以 $(6x^2 + x - 15)$ 的餘式為 $ax + b$ ，則 $b - a = ?$

- (A) 4
- (B) 8
- (C) 12
- (D) 16
- (E) 20

#### Solution

可以把式子轉成

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x)(6x^2 + x - 15) + ax + b \\ &= g(x)(3x + 5)(2x - 3) + ax + b \end{aligned}$$

代入 $x = \frac{3}{2}$ ，得到 $\frac{3}{2}a + b = 27$

代入 $x = -\frac{5}{3}$ ，得到 $-\frac{5}{3}a + b = 8$

解聯立之後得到 $(a, b) = (6, 18)$

因此 $b - a = 12$ ，故選(C)

## 100-01-02

### Statement

若 $\alpha, \beta$ 為方程式 $x - \frac{3}{x} + 1 = 0$ 的兩根，則 $(\frac{2}{\alpha} + 5)(\frac{2}{\beta} + 5) = ?$

- (A) 9
- (B) 15
- (C) 21
- (D) 27
- (E) 33

### Solution

$$(\frac{2}{\alpha} + 5)(\frac{2}{\beta} + 5) = \frac{4}{\alpha\beta} + \frac{10(\alpha + \beta)}{\alpha\beta} + 25$$

$$x - \frac{3}{x} + 1 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 3 = 0$$

$$\text{利用根與係數，得到 } \alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{-1}{1} = -1, \alpha\beta = \frac{c}{a} = -3$$

$$\text{因此 } (\frac{2}{\alpha} + 5)(\frac{2}{\beta} + 5) = \frac{4}{-3} + \frac{-10}{-3} + 25 = 27$$

故選(D)

## 100-01-03

### Statement

求 $13^5 - 14 \times 13^4 + 15 \times 13^3 - 25 \times 13^2 - 12 \times 13 + 9 = ?$

- (A) 22
- (B) 25
- (C) 28
- (D) 31
- (E) 34

### Solution

將式子考慮成 $f(x) = x^5 - 14x^4 + 15x^3 - 25x^2 - 12x + 9$

式子等價於 $f(x)$ 除以 $x - 13$ 的餘數（餘式定理）。

因此  $C = \frac{1}{4}$ ,  $D = 1$ 。

因此  $A + B + C + D = 2$

故選(B)

## 100-01-05

### Statement

$\frac{x^2 - 7x + 12}{x^2 - 3x + 2} \leq -1$  之解為何？

(A)  $1 \leq x < 2$

(B)  $1 < x \leq 2$

(C)  $1 < x < 2$

(D)  $x \geq 2$  或  $x < 1$

(E)  $x > 2$  或  $x < 1$

### Solution

$$\frac{x^2 - 7x + 12}{x^2 - 3x + 2} \leq -1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 - 7x + 12}{x^2 - 3x + 2} + 1 \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{2x^2 - 10x + 14}{x^2 - 3x + 2} \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{2(x^2 - 5x + 7)}{(x-1)(x-2)} \leq 0$$

故我們考慮

$$\begin{cases} x^2 - 10x + 14 \leq 0 \\ (x-1)(x-2) > 0 \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset$$

$$\begin{cases} x^2 - 10x + 14 \geq 0 \\ (x-1)(x-2) < 0 \end{cases} \Rightarrow 1 < x < 2$$

因此  $1 < x < 2$  時， $\frac{x^2 - 7x + 12}{x^2 - 3x + 2} \leq -1$ ，故選(C)

## 100-01-06

### Statement

若  $a, b$  均為實數且  $ax^2 + bx - 10 < 0$  之解為  $\frac{-5}{2} < x < \frac{4}{3}$ ，則  $a + b = ?$

(A) 5

(B)  $\frac{11}{2}$

(C) 6

(D)  $\frac{13}{2}$

(E) 7

## Solution

可以根據結果列出式子，得：

$$(x + \frac{5}{2})(x - \frac{4}{3}) < 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \frac{4x}{3} + \frac{5x}{2} + \frac{-20}{6} < 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 - 8x + 15x - 20 < 0$$

$$\Rightarrow 6x^2 + 7x - 20 < 0$$

$$\text{兩邊共除2，得 } 3x^2 + \frac{7}{2}x - 10 < 0$$

$$a = 3, b = \frac{7}{2}, a + b = \frac{13}{2}$$

## 100-01-07

### Statement

若直線  $12x - 5y = 21$  與兩直線  $x = \frac{23}{39}$ 、 $x = \frac{16}{13}$  分別交於  $A$ 、 $B$  兩點，則線段長  $\overline{AB} = ?$

(A)  $\frac{6}{5}$

(B)  $\frac{5}{4}$

(C)  $\frac{5}{3}$

(D)  $\frac{13}{5}$

(E)  $\frac{25}{7}$

## Solution

已知  $12x - 5y = 21$ ，則斜率為  $\frac{12}{5}$

$$\Delta x = \frac{16}{13} - \frac{23}{39} = \frac{25}{39}$$

$$y = mx + b, \text{ 則 } 0 = \frac{12}{5}(\frac{16}{13} - \frac{23}{39}) + b, \text{ 得到 } b = \frac{60}{39} = \Delta y$$

因此距離為  $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{(\frac{25}{39})^2 + (\frac{60}{39})^2} = \frac{5}{3}$ ，故選 (C)

## 100-01-08

### Statement

設兩向量  $\vec{a}, \vec{b}$  的夾角為  $\theta$ ，且  $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ， $|\vec{a} + \vec{b}| = 4$ ， $|\vec{a} - \vec{b}| = 3$ ，則  $\cos \theta = ?$

(A)  $\frac{7}{25}$

(B)  $\frac{5}{13}$

(C)  $\frac{3}{5}$

(D)  $\frac{4}{5}$

(E)  $\frac{5}{6}$

### Solution

可以考慮成

$$\cos \theta = \frac{|a|^2 + |b|^2 - |a - b|^2}{2 \times |a| \times |b|}$$

$$\cos(\pi - \theta) = \frac{|a|^2 + |b|^2 - |a + b|^2}{2 \times |a| \times |b|} = -\cos \theta$$

$$\text{因此, } \frac{|a|^2 + |b|^2 - |a - b|^2}{2 \times |a| \times |b|} = \frac{-|a|^2 - |b|^2 + |a + b|^2}{2 \times |a| \times |b|}$$

$$|a|^2 + |b|^2 - 9 = -|a|^2 - |b|^2 + 16$$

$$\text{設 } x = |a| = |b|, \text{ 故 } 2x^2 - 9 = -2x^2 + 16, \text{ 得到 } x = \frac{5}{2} = |a| = |b|$$

$$\text{代入 } \cos \theta, \text{ 得到 } \frac{\frac{25}{4} + \frac{25}{4} - 9}{2 \times \frac{5}{2} \times \frac{5}{2}} = \frac{\frac{25}{2} - 9}{\frac{25}{2}} = \frac{7}{25}$$

故選(A)

## 100-01-09

### Statement

設兩向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的夾角為 $\theta$ ，且 $|\vec{a}| = 7$ 、 $|\vec{b}| = 5$ ， $\tan \theta = -\frac{3}{4}$ ，則 $(\vec{a} + \vec{b})(2\vec{a} - 3\vec{b}) = ?$

(A)  $-25$

(B)  $-5$

(C)  $0$

(D)  $44$

(E)  $51$

### Solution

$$(\vec{a} + \vec{b})(2\vec{a} - 3\vec{b}) = 2|\vec{a}|^2 - 3(\vec{a} \cdot \vec{b}) + 2(\vec{a} \cdot \vec{b}) - 3|\vec{b}|^2$$

$$\text{已知 } \tan \theta = -\frac{3}{4}, \text{ 則 } \cos \theta = -\frac{4}{5}$$

$$\text{因此 } \vec{a} \cdot \vec{b} = |a||b| \cos \theta = 7 \times 5 \times -\frac{4}{5} = -28$$

$$\text{因此 } (\vec{a} + \vec{b})(2\vec{a} - 3\vec{b}) = 98 + 28 - 75 = 51$$

故選(E)。

## 100-01-10

### Statement

橢圓以(2, 2)與(6, 2)為兩焦點，且與直線 $x + 1 = 0$ 相切，則橢圓短軸半長為何？

- (A) 4
- (B)  $\sqrt{21}$
- (C)  $\sqrt{23}$
- (D)  $\sqrt{29}$
- (E) 6

### Solution

將題目簡化為求 $b$ 的長度為何

橢圓中點為兩焦點座標之中點，也就是 $(\frac{2+6}{2}, \frac{2+2}{2}) = (4, 2)$

焦距 $c$ 為焦點與橢圓中點之距離，因此可知 $c = 2$

已知與直線 $x + 1 = 0$ 相切，因此橢圓左右一端會與 $x + 1 = 0$ 相切，因此其中一端為 $(-1, 2)$

故長軸 $a$ 為橢圓長軸端點與中心之距離，可知 $a = 5$

$$\text{因此 } b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{25 - 4} = \sqrt{21}$$

故選(B)。

## 100-01-11

### Statement

設拋物線 $y = 2x - \frac{1}{2}x^2$ 的焦點座標為 $(a, b)$ ，則 $ab = ?$

- (A) 3
- (B) 3.5
- (C) 4
- (D) 4.5
- (E) 5

## Solution

$$y = 2x - \frac{1}{2}x^2$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}(4x - x^2)$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}(-4 + 4x - x^2) + 2$$

$$\Rightarrow y = -\frac{1}{2}(x - 2)^2 + 2$$

$$\Rightarrow -2(y - 2) = (x - 2)^2$$

$$\text{因此可以知道頂點座標為}(2, 2) \cdot c = \frac{-2}{4} = \frac{-1}{2}$$

$$\text{因此焦點為}(2, 2 + \frac{-1}{2}) = (2, \frac{3}{2})$$

$$\text{故 } a = 2, b = \frac{3}{2}, \text{ 得到 } ab = 3, \text{ 故選 } (A)。$$

## 100-01-12

### Statement

雙曲線 $xy - 3x + 4y = 0$ 兩頂點的距離為何？

(A)  $2\sqrt{3}$

(B)  $4$

(C)  $2\sqrt{6}$

(D)  $4\sqrt{3}$

(E)  $4\sqrt{6}$

## Solution

$$xy - 3x + 4y = 0 \Rightarrow (x + 4)(y - 3) = -12$$

考慮通過頂點的線為 $y = -x + b$ ，代入必定通過的點 $(-4, 3)$ 得到 $b = -1$

因此 $y = -x - 1$ 會通過直角雙曲線的兩個頂點。

與原式解聯立

$$x(-x - 1) - 3x + 4(-x - 1) = 0 \Rightarrow x^2 + 8x + 4 = 0$$

$$\text{利用公式解得到 } x \text{ 的點，也就是 } x = \frac{-8 \pm \sqrt{64 - 4 \times 1 \times 4}}{2} = -4 \pm 2\sqrt{3}$$

$$\text{當 } x = -4 + 2\sqrt{3} \text{ 時， } y = 2\sqrt{3} - 3$$

$$\text{當 } x = -4 - 2\sqrt{3} \text{ 時， } y = -3 - 2\sqrt{3}$$

$$\text{兩點距離為 } \sqrt{(-4 + 2\sqrt{3} - (-4 - 2\sqrt{3}))^2 + (2\sqrt{3} - 3 - (-3 - 2\sqrt{3}))^2} = \sqrt{48 + 48} = 4\sqrt{6} \cdot \text{故選 } (E)$$



## 100-01-13

### Statement

若 $\log_2(3 - x^2) = 1 + \log_2 x$ ，則 $x = ?$

(A)  $-3$

(B)  $-3$ 或 $1$

(C)  $1$

(D)  $2$

(E)  $3$

### Solution

$$\log_2(3 - x^2) = 1 + \log_2 x$$

$$\Rightarrow \log_2(3 - x^2) - \log_2 x = 1$$

$$\Rightarrow \log_2\left(\frac{3 - x^2}{x}\right) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{3 - x^2}{x} = 2$$

$$\Rightarrow -x^2 - 2x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = 1, x = -3$$

驗根可知 $\log_2 x$ 無法放入 $-3$ ，因為 $\log$ 的定義域為正整數之集合，故 $x = -3$ 不合。

因此 $x = 1$ ，故選(C)

## 100-01-14

### Statement

若 $f(x) = \frac{1 + 2^x}{1 - 2^x}$ ，且 $f(a) = 3$ ， $f(b) = 5$ ，則 $f(a + b) = ?$

(A)  $\frac{5}{3}$

(B)  $2$

(C)  $6$

(D)  $8$

(E)  $15$

### Solution

$$\text{令 } t = 2^x \text{，則 } f(x) = \frac{1 + t}{1 - t}$$

$$\text{考慮 } f(a) = 3$$

$$\frac{1 + t}{1 - t} = 3$$

$$\Rightarrow 1 + t = 3 - 3t$$

$$\Rightarrow t = \frac{1}{2}$$

$$\text{因此 } 2^a = \frac{1}{2} \cdot \text{得到 } a = -1$$

$$\text{考慮 } f(b) = 5$$

$$\frac{1+t}{1-t} = 5$$

$$\Rightarrow 1+t = 5-5t$$

$$\Rightarrow t = \frac{2}{3}$$

$$2^b = \frac{2}{3} \cdot \text{則 } b = 1 - \log_2 3$$

$$\text{故 } f(a+b) = f(-\log_2 3) = f(\log_2 \frac{1}{3}) = \frac{1 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{4}{2} = 2 \cdot \text{故選}(B)$$

## 100-01-15

### Statement

$$\text{求 } \log_2(\sqrt{12 + 2^{\frac{7}{2}}} + \sqrt{12 - 2^{\frac{7}{2}}}) = ?$$

$$(A) \quad \frac{1}{2}$$

$$(B) \quad \frac{3}{2}$$

$$(C) \quad 2$$

$$(D) \quad \frac{5}{2}$$

$$(E) \quad 4$$

### Solution

$$\begin{aligned} \log_2(\sqrt{12 + 2^{\frac{7}{2}}} + \sqrt{12 - 2^{\frac{7}{2}}}) &= \log_2(\sqrt{12 + 8\sqrt{2}} + \sqrt{12 - 8\sqrt{2}}) = \log_2(\sqrt{8 + 8\sqrt{2} + 4} + \sqrt{8 - 8\sqrt{2} + 4}) \\ &= \log_2(\sqrt{(2 + 2\sqrt{2})^2} - \sqrt{(2 - 2\sqrt{2})^2}) = \log_2(4\sqrt{2}) = \frac{5}{2} \cdot \text{故選}(D) \end{aligned}$$

## 100-01-16

### Statement

$$\text{設 } 0 < \theta < \frac{\pi}{2} \cdot \text{且 } \sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2} \cdot \text{則 } \sin \theta + \cos \theta = ?$$

- (A)  $-1$   
(B)  $-\frac{1}{2}$   
(C)  $\frac{1}{2}$   
(D)  $\frac{\sqrt{5}}{2}$   
(E)  $\frac{\sqrt{7}}{2}$

### Solution

$$(\sin \theta - \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4}$$

$$\text{故 } \sin \theta \cos \theta = \frac{3}{8}$$

$$\begin{aligned} \text{則 } \sin \theta + \cos \theta &= \sqrt{(\sin \theta + \cos \theta)^2} = \sqrt{\sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta} \\ &= \sqrt{1 + 2 \sin \theta \cos \theta} = \sqrt{1 + 2 \cdot \frac{3}{8}} = \sqrt{\frac{7}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot \text{故選 (E)} \end{aligned}$$

## 100-01-17

### Statement

下列何者錯誤？

- (A) 若  $0 < x < \frac{\pi}{4}$ ，則  $\sin x < \cos x < \cot x$   
(B) 若  $\pi < x < \frac{5\pi}{4}$ ，則  $\sec x < \csc x < \cot x$   
(C) 若  $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ ，則  $\cos x < \sin x < \tan x$   
(D) 若  $\pi < x_1 < x_2 < \frac{3\pi}{2}$ ，則  $\sin x_1 > \sin x_2$   
(E) 若  $\frac{\pi}{2} < x_1 < x_2 < \pi$ ，則  $\cos x_1 > \cos x_2$

### Solution

$$\text{若 } \pi < x < \frac{5\pi}{4} \text{，則 } \sin \theta < \cos \theta < \tan \theta$$

$$\text{故 } \csc \theta < \sec \theta < \cot \theta \text{，故選 (B)}$$

## 100-01-18

### Statement

若 $mx + 3y + 1 = 0$ 與 $x + (m - 2)y + m = 0$ 之交點在第二象限內，則 $m$ 之範圍為何？

- (A)  $0 < m < 1$
- (B)  $0 < m < 2$
- (C)  $0 < m < 3$
- (D)  $1 < m < 3$
- (E)  $1 < m < 4$

### Solution

用一二式來解聯立，可以寫出交點參數式

$$\begin{cases} x = \frac{2m + 2}{(m - 3)(m + 1)} \\ y = \frac{m^2 - 1}{(-m + 3)(m + 1)} \end{cases}$$

考慮到 $y > 0, x < 0$ 的情況

得到 $((m < -1) \cup (-1 < m < 3)) \cap (1 < m < 3) \Rightarrow 1 < m < 3$

得到 $1 < m < 3$ ，故選(D)

## 100-01-19

### Statement

若點 $(a, b)$ 在直線 $2x + 3y = 1$ 上移動，則直線 $ax + by = 3$ 恆過哪一點？

- (A)  $(3, 4)$
- (B)  $(4, 5)$
- (C)  $(5, 7)$
- (D)  $(5, 8)$
- (E)  $(6, 9)$

### Solution

考慮 $x = 5$ 時 $y = -3$

考慮 $x = -4$ 時 $y = 3$

由於 $a, b$ 依照一定比例變換，因此只有直線上的斜率變換。

找到兩條線的交點即為恆過的點。

因此我們考慮 $5x - 3y = 3$ 與 $-4x + 3y = 3$ 的交點，得到 $(x, y) = (6, 9)$ ，故選(E)

## 100-01-20

### Statement

已知 $A(3, -5)$ 、 $B(-7, 4)$ ，且點 $P$ 介於 $A$ 、 $B$ 之間，又 $\overline{AB} : \overline{BP} = 7 : 4$ ，若 $P$ 之座標為 $(a, b)$ ，則 $7a + 21b = ?$

(A)  $-33$

(B)  $-32$

(C)  $-31$

(D)  $-30$

(E)  $-29$

### Solution

$$\overline{AB} : \overline{BP} = 7 : 4 \Rightarrow \overline{AP} : \overline{BP} = 3 : 4$$

利用內分點公式。

$$P = \left( \frac{4 \times 3 + 3 \times (-7)}{7}, \frac{4 \times (-5) + 3 \times 4}{7} \right) = \left( \frac{-9}{7}, \frac{-8}{7} \right)$$

則 $7a + 21b = (-9) + (-8) \times 3 = -33$ ，故選(A)

## 100年第2次北科入學數學會考

### 100-02-01

### Statement

若 $\alpha$ 、 $\beta$ 為方程式 $x^2 + 12x + 9 = 0$ 的兩根，則 $(\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta})^2 = ?$

(A)  $-18$

(B)  $-6$

(C)  $6$

(D)  $12$

(E)  $18$

### Solution

我們可以依照偉達定理(根與係數)的概念來寫這一題。

令一二次多項式 $ax^2 + bx + c$ ，存在兩根 $\alpha$ 與 $\beta$ 。

$$\text{那麼 } \alpha + \beta = \frac{-b}{a}, \text{ 且 } \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

因此，我們可以把欲求的式子展開，得：

$$\sqrt{\alpha}^2 - 2\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta} + \sqrt{\beta}^2$$

$$\Rightarrow \alpha - 2\sqrt{\alpha\beta} + \beta$$

根據偉達定理我們可以求得

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{-12}{1} = -12$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{9}{1} = 9$$

注意一下  $\alpha + \beta = -12$  ·  $\alpha\beta = 9$

若兩根一正一負那麼  $\alpha\beta < 0$  · 若兩根都是正的那麼  $a + b > 0$

因此剩下唯一的兩根都是負的才能使偉達定理成立。

$\sqrt{\alpha}\sqrt{\beta}$  會存在複數 · 相乘後可以得到  $-\sqrt{\alpha\beta}$ 。

因此帶回欲求之式子：

$$-12 - 2 \times -\sqrt{9} = -12 + 6 = -6$$

## 100-02-02

### Statement

若  $x^4 - x^3 - x^2 - x - 2$  與  $2x^3 + x^2 - 7x - 6$  的最高公因式為  $x^2 + bx + c$  · 則  $b + 2c = ?$

(A)  $-5$

(B)  $-3$

(C)  $0$

(D)  $5$

(E)  $7$

### Solution

第一式的因式  $ax + b$  的  $a$  一定會是 1 的因素(因為最大項係數等於 1) ·

且  $b$  一定會是 2 的因數(因為最小項的係數等於 2) · 第二式亦同。

因此我們可以對第一式做因式分解 · 得到  $(x + 1)(x - 2)(x^2 + 1)$

接著我們以相同方式對第二式做因式分解 · 得倒  $(x + 1)(x - 2)(2x + 3)$

可以觀察到最大公因式即為  $(x + 1)(x - 2) = x^2 - x - 2$

比較係數後得到  $b = -1, c = -2$

則  $b + 2c = -1 + 2 \times -2 = -5$ 。

## 100-02-03

### Statement

若  $\frac{8x^3 - 6x + 1}{(2x + 1)^4} = \frac{a}{(2x + 1)} + \frac{b}{(2x + 1)^2} + \frac{c}{(2x + 1)^3} + \frac{d}{(2x + 1)^4}$  · 則  $2a + b - c + d = ?$

(A)  $-2$

(B)  $-1$

(C)  $0$

(D)  $1$

(E)  $2$

## Solution

我們可以使用綜合除法，將 $2x + 1$ 改寫成 $x + \frac{1}{2}$ ，然後再對除出來的係數除以2。

$$\begin{array}{r|rrrr} 8 & 0 & -6 & 1 & -1/2 \\ & -4 & 2 & 2 & \\ \hline 8 & -4 & -4 & 3 & \\ & 4 & -2 & -2 & D \\ & & -2 & 2 & \\ \hline 4 & -4 & 0 & & \\ & 2 & -2 & C & \\ & & -1 & & \\ \hline 2 & -3 & & & \\ & 1 & B & & \\ A & & & & \end{array}$$

因此 $a = 1$ ,  $b = -3$ ,  $c = 0$ ,  $d = 3$ 。

$$2a + b - c + d = 1 \times 2 + (-3) - 0 + 3 = 2。$$

**100-02-04**

## Statement

$x^2 - 4x + 2 \leq |x - 2|$  之解為何？

- (A)  $1 \leq x \leq 4$
- (B)  $2 \leq x \leq 4$
- (C)  $0 \leq x \leq 2$
- (D)  $0 \leq x \leq 4$**
- (E)  $0 \leq x \leq 3$

## Solution

1. 考慮 $x^2 - 4x + 2 \leq x - 2$ ：  
移項， $x^2 - 4x + 2 - x + 2 \leq 0$   
整理， $x^2 - 5x + 4 \leq 0$   
那麼我們可以將其因式分解，得 $(x - 4)(x - 1) \leq 0$ ，並且可以得到 $1 \leq x \leq 4$ 。
2. 考慮 $x^2 - 4x + 2 \leq -x + 2$ ：  
移項， $x^2 - 4x + 2 + x - 2 \leq 0$   
整理， $x^2 - 3x \leq 0$   
那麼我們可以將其因式分解，得 $x(x - 3) \leq 0$ ，並且可以得到 $0 \leq x \leq 3$

對剛剛考慮的兩個東西產生出來的結果取聯集，得到 $0 \leq x \leq 4$ 。

## 100-02-05

### Statement

$2\log_2 x - \log_x 2 < 1$ 之解為何？

(A)  $x < \frac{-1}{2}$  或  $0 < x < 1$

(B)  $0 < x < \frac{1}{2}$  或  $1 < x < 2$

(C)  $x < \frac{-1}{\sqrt{2}}$  或  $0 < x < 1$

(D)  $x < \frac{-1}{\sqrt{2}}$  或  $1 < x < 2$

(E)  $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$  或  $1 < x < 2$

### Solution

$$2\log_2 x - \log_x 2 < 1$$

$$\Rightarrow 2\log_2 x - \frac{\log 2}{\log x} < 1$$

$$\Rightarrow 2\log_2 x - \frac{1}{\log_2 x} < 1$$

令  $\log_2 x = t$ ，那麼

$$2t - \frac{1}{t} < 1$$

$$\Rightarrow 2t - \frac{1}{t} - 1 < 0$$

$$\Rightarrow \frac{2t^2 - t - 1}{t} < 0$$

考慮兩種情況。

1. 若  $t > 0$  且  $2t^2 - t - 1 < 0$

$$2t^2 - t - 1 < 0 = (2t + 1)(t - 1) < 0 = \frac{-1}{2} < t < 1$$

與  $t > 0$  取交集得到  $0 < t < 1$ 。

2. 若  $t < 0$  且  $2t^2 - t - 1 > 0$

$$2t^2 - t - 1 > 0 = (2t + 1)(t - 1) > 0 = t < \frac{-1}{2} \text{ 或 } t > 1$$

與  $t < 0$  取交集得到  $t < \frac{-1}{2}$ 。

對這兩種考慮取聯集，得到  $t < \frac{-1}{2}$  或  $0 < t < 1$ 。

還原，得到  $x < \frac{1}{\sqrt{2}}$  或  $1 < x < 2$ 。

## 100-02-06



## Statement

已知 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 37$ ， $\overline{BC} = 53$ ， $\overline{AC} = 89$ ，則下列各內積中，何者為最大？

(A)  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$

(B)  $\vec{BC} \cdot \vec{BA}$

(C)  $\vec{CA} \cdot \vec{CB}$

(D)  $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$

(E)  $\vec{BC} \cdot \vec{CA}$

## Solution

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 37 \times 89 \times \frac{37^2 + 89^2 - 53^2}{2 \times 37 \times 89}$$

$$\vec{BC} \cdot \vec{BA} = 53 \times 37 \times \frac{53^2 + 37^2 - 89^2}{2 \times 53 \times 37}$$

$$\vec{CA} \cdot \vec{CB} = 89 \times 37 \times \frac{89^2 + 53^2 - 37^2}{2 \times 89 \times 53}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} < 0$$

$$\vec{BC} \cdot \vec{CA} < 0$$

故問題化簡成比較以下三者之大小：

$$37^2 + 89^2 - 53^2。$$

$$53^2 + 37^2 - 89^2$$

$$89^2 + 53^2 - 37^2$$

顯然是第三者較大，故選(C)

## 100-02-07

### Statement

已知向量 $\vec{AB} = (-31, 29)$ ， $\vec{AC} = (23, -11)$ ，則下列向量長中，何者為最大？

(A)  $|\vec{AB}|$

(B)  $|\vec{BC}|$

(C)  $|\vec{AB} + \vec{BC}|$

(D)  $|\vec{AB} + \vec{AC}|$

(E)  $|\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CA}|$

## Solution

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{BA} = (31, -29)$$

$$\overrightarrow{BC} = (31, -29) + (23, -11) = (54, -40)$$

$$\overrightarrow{CA} = (-23, 11)$$

考慮向量長的公式，當存在一向量  $\vec{L} = (A, B)$ ， $\vec{L}$  的向量長為  $|\vec{L}| = \sqrt{A^2 + B^2}$

因此若  $|A| + |B|$  越大，那麼向量長越大。

考慮選項A： $|-31| + |29| = 60$

考慮選項B： $|54| + |-40| = 94$

考慮選項C： $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = (-31, 29) + (54, -40) = (23, -11)$ ， $|23| + |-11| = 34$

考慮選項D： $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = (-31, 29) + (23, -11) = (-8, 18)$ ， $|-8| + |18| = 26$


考慮選項E： $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = (-31, 29) + (54, -40) + (-23, 11) = (0, 0)$ ， $|0| + |0| = 0$

因此，故選B。

## 100-02-08

### Statement

設  $y = ax^2 + bx + c$  的圖形如下，則下列各式中，何者為負值？



(A)  $abc$

(B)  $b^2 - 4ac$

(C)  $c^2 - 4ab$

(D)  $b + \sqrt{b^2 - 4ac}$

(E)  $b - \sqrt{b^2 - 4ac}$

## Solution

因為開口向上，所以  $a > 0$ 。

觀察  $x = 0$ ，可以發現對應到的  $y < 0$ ，因此  $c < 0$

觀察一下對稱軸， $\frac{-b}{2a} > 0$ ，因此  $b < 0$

因此  $abc > 0$ ， $b^2 - 4ac > 0$  因為有實數解。

$c^2 - 4ab > 0$  因為  $ab < 0$ 。

而  $b + \sqrt{b^2 - 4ac}$  必為正因為可以從圖中觀察到這個根是正數，

另一根是負數因此  $b - \sqrt{b^2 - 4ac}$  小於 0，故選 E。

## 100-02-09

### Statement

已知 $4x^2 + y^2 - 4x + 8y = 8$ ，則 $x$ 的最大值為何？

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

### Solution

這是一個橢圓，可以用配方法來找短邊或者長邊，加上中心就是最大的 $x$ 了。

$$4x^2 - 4x + y^2 + 8y = 8$$

$$4(x^2 - x) + y^2 + 8y = 8$$

$$4\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) + y^2 + 8y + 16 = 8 + 16 + 1$$

$$4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 4)^2 = 25$$

$$\frac{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}{\frac{25}{4}} + \frac{(y + 4)^2}{25}$$

由此可知這個橢圓的短邊平行 $x$ 軸

$$a = \sqrt{25} = 5, b = \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{5}{2}$$

中心可從式子得知， $(x, y) = \left(\frac{1}{2}, -4\right)$

因此，加上 $x$ 的部份得到 $\frac{5}{2} + \frac{1}{2} = 3$

## 100-02-10

### Statement

拋物線 $y = 4 - 2x - x^2$ 與 $x$ 軸兩交點的距離為何？

- (A) 2
- (B) 3
- (C)  $2\sqrt{5}$
- (D) 6
- (E) 8

### Solution

將 $y$ 等於0，求出 $x$ 。

$$-x^2 - 2x + 4 = 0$$

先確定 $b^2 - 4ac$ 是否大於0。

$$(-2)^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 4 + 16 = 20$$

$$\text{因此兩根為 } \frac{2 \pm \sqrt{20}}{-2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{5}}{-2}$$

$$\frac{2 + \sqrt{5}}{-2} - \frac{2 - \sqrt{5}}{-2} = 2\sqrt{5}$$

## 100-02-11

### Statement

設雙曲線  $x^2 - y^2 = x + 2y$  兩漸進的夾角為  $\theta$ ，則  $\sin \frac{\theta}{2} = ?$

(A) 0

(B)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(D)  $\frac{2}{\sqrt{5}}$

(E) 1

### Solution

配方雙曲線得到標準式。

$$x^2 - x - y^2 - 2y = 0 \Rightarrow x^2 - x + \frac{1}{4} - y^2 - 2y + 1 = \frac{5}{4}$$

$$(x - \frac{1}{2})^2 - (y - 1)^2 = \frac{5}{4}$$

$$\frac{4(x - \frac{1}{2})^2}{5} - \frac{4(y - 1)^2}{5} = 1$$

求漸進線，令等號右邊為0

$$\frac{4(x - \frac{1}{2})^2}{5} = \frac{4(y - 1)^2}{5}$$

$$(x - \frac{1}{2})^2 = (y - 1)^2$$

$$(x - \frac{1}{2})^2 - (y - 1)^2 = 0$$

$$(x - \frac{1}{2} - (y - 1))(x - \frac{1}{2} + (y - 1)) = 0$$

$$(x - y + \frac{1}{2})(x + y + \frac{3}{2}) = 0$$

第一條線  $(x - y + \frac{1}{2})$  可求斜率  $m = 1$

第二條線  $(x + y + \frac{3}{2})$  可求斜率  $m = -1$

因此，這兩條線垂直 ( $m_1 \times m_2 = -1$ )，夾角為  $90^\circ$

因此  $\sin \frac{90^\circ}{2} = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$

## 100-02-12

### Statement

不等式  $\frac{3 \cdot 2^x - 18 \cdot 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}} \leq 2$  之解為何？

(A)  $-1 \leq x \leq 1$

(B)  $0 < x \leq 1$

(C)  $1 \leq x \leq 2$

(D)  $0 < x \leq 2$

(E)  $1 \leq x \leq 4$

### Solution

將分子分母上下同乘  $2^x$ 。

$$\frac{3 \cdot 2^x - 18 \cdot 2^{-x}}{2^x - 2^{-x}} \Rightarrow \frac{3 \cdot 2^{2x} - 18}{2^{2x} - 1} \leq 2$$

移項。

$$\frac{3 \cdot 2^{2x} - 18}{2^{2x} - 1} - 2 \leq 0$$

$$\frac{3 \cdot 2^{2x} - 18 - 2(2^{2x} - 1)}{2^{2x} - 1} \leq 0$$

$$\frac{3 \cdot 2^{2x} - 18 - 2 \cdot 2^{2x} + 2}{2^{2x} - 1} \leq 0$$

$$\frac{2^{2x} - 16}{2^{2x} - 1} \leq 0$$

令  $t = 2^{2x}$

$$\frac{t - 16}{t - 1} \leq 0$$

考慮以下兩點：

1.  $t - 16 \geq 0 \cdot t - 1 < 0$

$t \geq 16, t < 1$ ，這兩個不等式沒有任何交集，因此  $t \in \emptyset$

2.  $t - 16 \leq 0 \cdot t - 1 > 0$

$t \leq 16, t > 1$ ，這兩個不等式的交集為  $1 < t \leq 16$

將以上考慮的兩點做聯集，得到  $1 < t \leq 16$

還原  $t$  得到  $1 < 2^{2x} \leq 16$ ，因此  $0 < x \leq 2$

## 100-02-13

### Statement

方程式  $10 \cdot x^{2 \log x} = x^3$  之所有實根的平方和為何？

- (A) 100
- (B) 101
- (C) 110
- (D) 111
- (E) 121

### Solution

等號兩邊同除  $x^{2 \log x}$

$$10 = x^{3-2 \log x}$$

$$1 = (3 - 2 \log x) \times \log(|x|)$$

因為要求實根，因此可以限定  $x > 0$ ，所以  $(3 - 2 \log x) \times \log(x)$

$$\text{令 } t = \log x$$

$$1 = (3 - 2t) \times t \Rightarrow -2t^2 + 3t - 1 = 0$$

$$\text{因式分解得到 } (-2t + 1)(t - 1) = 0$$

$$\text{可以解出 } t = \frac{1}{2} \text{ 或 } t = 1$$

$$\text{還原 } t，\text{可以得到 } \log x = \sqrt{10} \text{ 或 } \log x = 10$$

$$\text{兩根的平方和為 } \sqrt{10}^2 + 10^2 = 110$$

## 100-02-14

### Statement

若  $f(x) = \log_2(x^3 + x^2 - 7x + 5)$ ，則  $f(1 + \sqrt{2}) = ?$

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

### Solution

觀察一下，可以嘗試把  $x^3 + x^2 - 7x + 5$  化簡成  $c(x-1)^2 + b(x-1) + a \dots$

這部分可以用綜合除法做到。

$$\begin{array}{rrrr|rr}
 1 & 1 & -7 & 5 & 1 & & \\
 & 1 & 2 & -5 & & & \\
 \hline
 1 & 2 & -5 & & 0 & & \\
 & 1 & 3 & & & d & \\
 \hline
 1 & 3 & & -2 & & & \\
 & 1 & & & & c & \\
 \hline
 & 1 & & & & & \\
 & & 1 & 4 & & & \\
 & a & & b & & & 
 \end{array}$$

因此可得 $(x-1)^3 + 4(x-1)^2 - 2(x-1)$ 。

把 $f(1+\sqrt{2})$ 帶進去，得：

$$\log_2((\sqrt{2})^3 + 4(\sqrt{2})^2 - 2(\sqrt{2})) = \log_2(2\sqrt{2} + 8 - 2\sqrt{2}) = \log_2 8 = 3$$

## 100-02-15

### Statement

設 $\cos \theta + \cos^2 \theta = 1$ ，則 $\sin^2 \theta + \sin^4 \theta = ?$

(A)  $\frac{1}{4}$

(B)  $\frac{1}{3}$

(C)  $\frac{1}{2}$

(D)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(E) 1

### Solution

$$\cos^2 \theta = 1 - \cos \theta$$

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - (1 - \cos \theta) = \cos \theta$$

$$\sin^4 \theta = (\sin^2 \theta)^2 = \cos^2 \theta$$

$$\sin^2 \theta + \sin^4 \theta = \cos \theta + \cos^2 \theta = 1$$

## 100-02-16

### Statement

設 $\tan 100^\circ = k$ ，則 $\sin 80^\circ = ?$

(A)  $\frac{-k}{\sqrt{1+k^2}}$

(B)  $\frac{\sqrt{k}}{\sqrt{1+k^2}}$


(C)  $\frac{-1}{\sqrt{1+k^2}}$

(D)  $\frac{k}{\sqrt{1+k^2}}$

(E)  $\frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$

### Solution

畫個圖



看圖可以觀察到， $\sin 100^\circ = \sin 80^\circ = \frac{-k}{\sqrt{1+k^2}}$

## 100-02-17

### Statement

設 $a = \sec 434^\circ$ ， $b = \sin 100^\circ$ ， $c = \cos 260^\circ$ ， $d = \cot 28^\circ$ ， $e = \csc 155^\circ$

則下列何者正確？

(A)  $b < c < d < e < a$

(B)  $c < b < d < e < a$

(C)  $c < b < e < d < a$

(D)  $c < b < d < a < e$

(E)  $b < c < a < d < e$



## Solution

$$a = \sec 434^\circ = \sec 74^\circ = \csc 16^\circ$$

$$b = \sin 100^\circ = \sin 80^\circ$$

$$c = \cos 260^\circ = -\cos 80^\circ$$

$$d = \cot 28^\circ$$

$$e = \csc 155^\circ = \csc 25^\circ$$

因此  $a > e$ ， $c < b$ ，故選B。

## 100-02-18

### Statement

平面上有兩點  $A(1, 2)$ 、 $B(a, b)$ ，若直線  $\overline{AB}$  之垂直平分線為  $x + 2y - 10 = 0$ ，則  $a - b = ?$

(A)  $-1$

(B)  $-2$

(C)  $-3$

(D)  $-4$

(E)  $-5$

## Solution

垂直平分線，因此垂直平分線通過  $\overline{AB}$  的中點  $(\frac{1+a}{2}, \frac{2+b}{2})$ 。

$$\text{帶入垂直平分線得到 } \frac{1+a}{2} + 2 + b - 10 = 0 \Rightarrow 1 + a + 4 + 2b - 20 = 0$$

$$\Rightarrow a + 2b = 15$$

而我們可以求得垂直平分線的斜率，得到  $m = \frac{-1}{2}$ ，因此與其垂直的斜率一定是  $m = \frac{-1}{\frac{-1}{2}} = 2$

因此按照斜率定義，可以得到  $\frac{2-b}{1-a} = 2$ ，整理得到  $2 - b = 2 - 2a \Rightarrow 2a = b$ 。

帶回第一式可以得到  $5a = 15$ ， $a = 3$ ， $b = 6$ 。

$$a - b = 3 - 6 = -3$$

## Statement

設直線  $bx + ay - ab = 0$ ， $a > 0$ ， $b < 0$  過點  $(1, 2)$ ，若此直線與二坐標軸相交，圍成一個面積為 2 的三角形，則  $a + 2b = ?$

(A)  $-7 - 3\sqrt{3}$

(B)  $-6 - 3\sqrt{3}$

(C)  $-5 - 3\sqrt{3}$

(D)  $-4 - 3\sqrt{3}$

(E)  $-3 - 3\sqrt{3}$

## Solution

可以推出  $x, y$  的通式。

$bx + ay = ab$ ，求出  $x, y$  的截距。

當  $y = 0$ ，那麼  $bx = ab$ ， $x = a$

當  $x = 0$ ，那麼  $ay = ab$ ， $y = b$

已知  $a > 0, b < 0$  過點  $(1, 2)$ ，此直線與二坐標軸相交，圍成一個面積為 2 的三角形。

因此可以知道  $\frac{1}{2}|a||b| = 2$ ，可知  $ab = -4$  或者  $ab = 4$ ，但是  $a > 0, b < 0$ ，因此  $ab = 4$  不合。

已知過點  $(1, 2)$  且  $ab = -4$ ，因此可以把點帶入得到  $b + 2a = -4$ 。

又  $ab = -4$  所以  $a = \frac{-4}{b}$ ，所以得到  $b + \frac{-8}{b} = -4$

同乘以  $b$  可以得到  $b^2 + 4b - 8 = 0$ 。

利用公式解可以解出  $\frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \times 1 \times -8}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{48}}{2} = \frac{-4 \pm 4\sqrt{3}}{2}$

那麼可以解出兩根  $-2 + 2\sqrt{3}$  或者  $-2 - 2\sqrt{3}$ ，其中由於  $b < 0$ ，因此  $-2 + 2\sqrt{3}$  不合。

帶回求出  $a$  得到  $a = \frac{-4}{-2 - 2\sqrt{3}} = \frac{-4}{-2(1 + \sqrt{3})}$

化簡得到  $a = \frac{2}{1 + \sqrt{3}} = \frac{2(1 - \sqrt{3})}{-2} = -1(1 - \sqrt{3}) = \sqrt{3} - 1$

因此  $a + 2b = \sqrt{3} - 1 + -4 - 4\sqrt{3} = -5 - 3\sqrt{3}$

## 100-02-20

### Statement

設直線 $3x + y = 1$ 與 $x + 3y = 2$ 之夾角為 $\theta$ ，則 $\cos 2\theta = ?$

(A)  $\frac{-7}{25}$

(B)  $\frac{-6}{25}$

(C)  $\frac{-1}{5}$

(D)  $\frac{-4}{25}$

(E)  $\frac{-3}{25}$

### Solution 1

設 $n_1 = \langle 3, 1 \rangle$ ， $n_2 = \langle 1, 3 \rangle$

$$\text{則} \cos \theta = \frac{n_1 n_2}{|n_1| |n_2|} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$\text{因此} \sin \theta = \frac{4}{5}$$

$$\text{所以} \cos 2\theta = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) = -\frac{7}{25} \cdot \text{故選}(A)$$

### Solution 2

考慮兩條線的斜率。

$$3x + y = 1, m_1 = \frac{-3}{1} = -3$$

$$x + 3y = 2, m_2 = \frac{-1}{3}$$

兩條線的斜率相減可形成一個夾角，可以視為 $\tan$ 來考慮。

$$\tan(m_1 - m_2) = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \frac{-3 - \frac{-1}{3}}{1 + 1} = \frac{\frac{-8}{3}}{2} = \frac{-4}{3}$$

觀察到求出的這個 $\tan$ 夾角是負的，因此這個夾角是大於 $90^\circ$ 的鈍角。

可以依照 $\tan(180^\circ) = 0$ 來求得另一個銳角的夾角。

$$\frac{\frac{-4}{3} + \tan \theta}{1 - \frac{-4}{3} \tan \theta} \cdot \text{求得銳角} \tan \theta = \frac{4}{3}$$

由於 $\tan \theta = \frac{4}{3}$ ，那麼這個角度會介於 $45^\circ \sim 90^\circ$

因此乘以兩倍後就會大於 $90^\circ$

$$\text{用兩倍角公式求出} \tan 2\theta = \frac{\frac{4}{3} + \frac{4}{3}}{1 - \frac{4}{3} \times \frac{4}{3}} = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{-7}{9}} = \frac{24}{-7}$$

由於這個角度介於 $90^\circ \sim 180^\circ$ ， $y > 0$ ，而 $x < 0$ ，也因此 $y = 24$ ， $x = -7$ ， $r = \sqrt{24^2 + (-7)^2} = 25$

因此 $\cos 2\theta = \frac{-7}{25}$ ，故選(A)

## 101年第2次北科入學數學會考

### 101-02-01

#### Statement

設 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ ， $\cos \beta = \frac{-5}{13}$ ，且 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ， $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ ，則 $\sin(\alpha - \beta) = ?$

(A)  $\frac{-56}{65}$

(B)  $\frac{-16}{65}$

(C)  $\frac{16}{65}$

(D)  $\frac{27}{65}$

(E)  $\frac{56}{65}$

#### Solution

$$\because 0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore 0 < \sin \alpha < 1, 0 < \cos \alpha < 1$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$$

$$\because \frac{\pi}{2} < \beta < \pi$$

$$\therefore 0 < \sin \beta < 1, -1 < \cos \beta < 0$$

$$\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \left(\frac{-5}{13}\right)^2} = \frac{12}{13}$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha = \frac{4}{5} \times \frac{-5}{13} - \frac{12}{13} \times \frac{3}{5} = \frac{-20}{65} - \frac{36}{65} = \frac{-56}{65}$$

## 102-02-02

### Statement

方程式 $2^{x^2} \cdot 4^x \cdot 16 = 8^x \cdot 64$ 之所有解的和為何？

(A)  $-2$

(B)  $-1$

(C)  $0$

(D)  $1$

(E)  $2$

### Solution

將式子改寫。

$$2^{x^2} \cdot 4^x = 8^x \cdot 64$$

$$\Rightarrow 2^{x^2} \cdot 2^{2x} = 2^{3x} \cdot 2^6$$

$$\Rightarrow 2^{x^2+2x} = 2^{3x+6}$$

兩邊同取 $\log_2$ ，得到 $x^2 + 2x = 3x + 6$

也就得到 $x^2 - x - 6 = 0$ ，因式分解得到 $(x - 3)(x + 2) = 0$

解根得到 $x = 3$ 或 $x = -2$ ， $3 + (-2) = 1$

## 101-02-03

### Statement

已知 $\Gamma$ 表 $f(x, y) = 0$ 所對應之圖形，若 $\Gamma$ 水平方向拉長2倍，再往右平移1單位，則此新圖形的方程式為何？

(A)  $f(\frac{x}{2} + 1, y) = 0$

(B)  $f(\frac{x-1}{2}, y) = 0$

(C)  $f(\frac{x+1}{2}, y) = 0$

(D)  $f(2x + 1, y) = 0$

(E)  $f(2x - 1, y) = 0$

### Solution

考慮拉長兩倍，那麼 $a$ 要變大兩倍，因此 $x$ 乘以 $\frac{1}{2}$

考慮往右平移一單位，那麼座標 $x - 1$ ，因此 $x$ 減1

因此 $f = (\frac{x-1}{2}, y) = 0$ ，故選(B)

## 101-02-04

### Statement

設直線 $L$ 過點 $(-1, 1)$ 且與直線 $8x - 6y = 1$ 垂直，則此直線方程式為何？

(A)  $3x - 4y = -1$

(B)  $4x + 3y = -1$

(C)  $4x - 3y = -7$

(D)  $3x + 4y = 1$

(E)  $x - y = -2$

### Solution

直線 $8x - 6y = 1$ 的斜率為 $\frac{-8}{-6} = \frac{4}{3}$

因此造一條與其垂直的直線，這條直線的斜率與其斜率乘積必為 $-1$ 。

$$\frac{4}{3} \times m = -1, m = \frac{-3}{4}$$

已知此直線會過點 $(-1, 1)$ ，因此 $y - 1 = \frac{-3}{4}(x + 1)$

$$4y - 4 = -3(x + 1), 3x + 4y = 1$$

## 101-02-05

### Statement

過點 $(2, -3)$ 與圓 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 5$ 相切的直線方程式為何？

(A)  $2x - y = 7$

(B)  $x + 2y = -4$

(C)  $2x - 3y = 13$

(D)  $3x - 2y = 12$

(E)  $x - 2y = 8$

### Solution

從圓的方程式可以知道，圓心為 $(1, -1)$ 且半徑為 $\sqrt{5}$ 。

因此我們可以造過點 $(2, -3)$ 的線，並且距離與圓心剛好為 $\sqrt{5}$

可以套用距離公式來得到。

令與圓相切的直線為 $y + 3 = m(x - 2)$

整理後得到 $mx - y - 2m - 3 = 0$

我們可以套用距離公式，得到 $\frac{|mx - y - 2m - 3|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = \sqrt{5}$

將圓心帶入距離公式，得到 $|m + 1 - 2m - 3| = \sqrt{5}\sqrt{m^2 + 1}$

整理後得到 $|-m - 2| = \sqrt{5m^2 + 5}$

兩邊平方後得到 $(-m - 2)^2 = 5m^2 - 5 \Rightarrow m^2 + 4m + 4 = 5m^2 + 5$

因此 $-4m^2 + 4m - 1 \cdot m = \frac{1}{2}$  (重根)

$$y + 3 = \frac{1}{2}(x - 2)$$

$$\Rightarrow 2y + 6 = x - 2$$

$$\Rightarrow x - 2y - 8 = 0$$

$$\Rightarrow x - 2y = 8$$

## 101-02-06

### Statement

以 $(1, 3 + \sqrt{5})$ 與 $(1, 3 - \sqrt{5})$ 為兩焦點且短軸長為6之橢圓方程式為何？

(A)  $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{14} = 1$

(B)  $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y-3)^2}{25} = 1$

(C)  $\frac{(x-1)^2}{14} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$

(D)  $\frac{(x-3)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{14} = 1$

(E)  $\frac{(x-3)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$

### Solution

兩焦點只有 $y$ 軸有變動，因此這是一個貫軸平行 $y$ 軸的橢圓。

$$\text{中心}(x, y) = \left(\frac{1+1}{2}, \frac{3+\sqrt{5}+3-\sqrt{5}}{2}\right) = (1, 3)$$

$$2c = (3 + \sqrt{5}) - (3 - \sqrt{5}) = 2\sqrt{5}, c = \sqrt{5}$$

$$2b = 6, b = 3$$

$$\text{因此 } a = \sqrt{3^2 + (\sqrt{5})^2} = \sqrt{9+5} = \sqrt{14}$$

依照 $\frac{(x-h)}{b} + \frac{(y-k)}{a} = 1$ 列式，得

$$\frac{(x-1)}{9} + \frac{(y-3)}{14} = 1$$

## 101-02-07

### Statement

設 $2\log(x-3) - \log 2 = \log(x+9)$ ，則 $x^2 - 10x + 12$ 之值為何？

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

### Solution

$$2\log(x-3) - \log 2 = \log(x+9)$$

$$\Rightarrow \log\left(\frac{x^2 - 6x + 9}{x+9}\right) = \log(2)$$

$$\Rightarrow \log\left(\frac{x^2 - 6x + 9}{2x + 18}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 - 6x + 9}{2x + 18} = 1$$

$$\Rightarrow x^2 - 6x + 9 = 2x + 18$$

$$\Rightarrow x^2 - 8x - 9 = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)(x-9) = 0$$

得到 $x = -1, x = 9$

驗根，由於 $x = -1$ 帶進去後， $x - 3 < 0$ ，又因為 $\log$ 的定義域為正整數之集合，故 $x = -1$ 不合。

因此 $x = 9$ 。

$9^2 - 90 + 12 = 81 - 90 + 12 = 3$ ，故選(C)。

## 101-02-08

### Statement

若 $0 \leq \theta < 2\pi$ ，則 $\cos 2\theta + 2\cos^2 \frac{\theta}{2} = 1$ 有幾個解？

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4



## Solution

利用和角公式，可以知道

$$\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2}\right) = \cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2} = \cos^2 \frac{\theta}{2} - (1 - \cos^2 \frac{\theta}{2}) = 2 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) - 1 = \cos \theta$$

$$\text{因此 } \cos \theta + 1 = 2 \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\text{且 } \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

$$2 \cos^2 \theta - 1 + \cos \theta + 1 = 1$$

$$2 \cos^2 \theta + \cos \theta = 1$$

$$2 \cos^2 \theta + \cos \theta - 1 = 0$$

$$\text{令 } t = \cos \theta, \text{ 則 } 2t^2 + t - 1 = 0, \text{ 可得 } t = \frac{1}{2} \text{ 或 } t = -1$$

$$\text{考慮 } t = \cos \theta = \frac{1}{2}, \text{ 則 } \theta = \frac{\pi}{3} \text{ 或 } \theta = \frac{-\pi}{3}$$

$$\text{考慮 } t = \cos \theta = -1, \text{ 則 } \theta = \pi$$

因此有三組解，故選(D)

## 101-02-09

### Statement

設 $a$ 、 $b$ 、 $c$ 分別表示 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 之對邊長，若 $b^2 - (c - a)^2 = ca$ ，則 $\angle B = ?$

(A)  $30^\circ$

(B)  $45^\circ$

(C)  $60^\circ$

(D)  $120^\circ$

(E)  $135^\circ$

## Solution

$$b^2 - (c - a)^2 = ca$$

$$\Rightarrow b^2 - (c^2 - 2ac + a^2) = ca$$

$$\Rightarrow b^2 - c^2 + 2ac - a^2 = ca$$

$$\Rightarrow b^2 - c^2 - a^2 = -ac$$

$$\Rightarrow a^2 + c^2 - b^2 = ac$$

$$\Rightarrow \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{1}{2}$$

$$\text{又 } \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{1}{2}$$

因此 $\angle B = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$ ，故選(C)。

## 101-02-10

### Statement

方程式 $x^{1+\log_2 x} = (2x^3)$ 之所有解的和為何？

(A)  $\frac{15}{2}$

(B) 8

(C)  $\frac{17}{2}$

(D) 9

(E)  $\frac{19}{2}$

### Solution

$$x^{1+\log_2 x} = 8x^3$$

$$\Rightarrow 1 + \log_2 x = \log_x (8x^3)$$

$$\Rightarrow 1 + \log_2 x = \frac{\log_2 8x^3}{\log_2 x}$$

$$\Rightarrow \log_2 x + \log_2^2 x = \log_2 8x^3$$

$$\Rightarrow \log_2 x + \log_2^2 x = 3 + 3\log_2 x$$

$$\text{令 } t = \log_2 x, \text{ 則 } t + t^2 = 3 + 3t$$

$$\Rightarrow t^2 - 2t - 3 = 0$$

$$\Rightarrow t = 3 \text{ 或 } t = -1$$

$$\text{還原 } t, \text{ 得到 } \begin{cases} \log_2 x = 3, & x = 8 \\ \log_2 x = -1, & x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{因此 } 8 + \frac{1}{2} = \frac{17}{2}, \text{ 故選 (C)}$$

## 101-02-11

### Statement

若 $f(x) = \frac{x-1}{x}$ ，且 $(f \circ g)(x) = \frac{x}{x+1}$ ，則 $g(0) = ?$

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(E) 4

## Solution

$f(x) = \frac{x-1}{x}$ ，則  $f(g(0)) = \frac{x}{x+1} = 0$ ，因此  $\frac{x-1}{x} = 1$ ，因此  $g(0) = 1$ ，故選  $(B)$ 。

## 101-02-12

### Statement

已知平面上兩點  $A(-3, 1)$ 、 $B(3, 5)$ ，又點  $P(a, b)$  在直線  $2x + y + 1 = 0$  且  $\overline{PA} = \overline{PB}$ ，則  $a + b = ?$

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 9

## Solution

將  $A, B$  兩點帶入直線，確定是否同側或異側。

代入點  $A$ ： $2 \cdot (-3) + 1 + 1 = -4$

代入點  $B$ ： $2 \times 3 + 5 + 1 = 12$

因此兩點異側。

$$2x + y + 1 = 0 \Rightarrow y = -2x - 1$$

由於  $\overline{PA} = \overline{PB}$ ，因此

$$\sqrt{(-3-x)^2 + (1-y)^2} = \sqrt{(3-x)^2 + (5-y)^2}$$

$$\Rightarrow (-3-x)^2 + (1+2x+1)^2 = (3-x)^2 + (5+2x+1)^2$$

$$\Rightarrow (-3-x)^2 + (2x+2)^2 = (3-x)^2 + (6+2x)^2$$

$$\Rightarrow 5x^2 + 14x + 13 = 5x^2 + 18x + 45$$

$$\Rightarrow -4x = 32$$

$$\Rightarrow x = -8$$

$$\Rightarrow y = 15$$

因此  $a = -8, b = 15, a + b = 7$ ，故選  $(C)$

## 101-02-13

### Statement

設二向量  $\vec{a} = \langle 2, t^2 - 3 \rangle$ ， $\vec{b} = \langle t, -1 \rangle$ 。

若  $\vec{a}$  和  $\vec{b}$  的夾角為  $\frac{\pi}{2}$ ，且  $\vec{b}$  的長度不大於 2，則  $t = ?$

- (A)  $-2$   
(B)  $-1$   
(C)  $2$   
(D)  $3$   
(E)  $4$

### Solution

$\cos \frac{\pi}{2} = 0$ ，因此 $|\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta = 0$ ，因此 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2t - t^2 + 3 = (-t + 3)(t + 1) = 0$$

得到 $t = 3$ 或 $t = -1$

長度不大於2，因此我們考慮兩種 $t$ 套進 $\vec{b}$ 的影響

考慮 $t = 3$ ，得到 $\sqrt{(3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{10} > 2$ ，因此 $t = 3$ 不合

考慮 $t = -1$ ，得到 $\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

因此 $t = -1$ ，故選(B)。

## 101-02-14

### Statement

設 $\alpha + \beta$ 、 $\alpha - \beta$ 為方程式 $x^2 - 6x + 5 = 0$ 的兩根，且 $\alpha < \beta + 2$ ，則 $\beta = ?$

- (A)  $-2$   
(B)  $-1$   
(C)  $2$   
(D)  $3$   
(E)  $4$

### Solution

利用根與係數，可以知道

$$(\alpha + \beta) + (\alpha - \beta) = -\left(\frac{-6}{1}\right) = 6$$

$$2\alpha = 6 \text{ 則 } \alpha = 3$$

$$(\alpha - \beta)(\alpha + \beta) = \alpha^2 - \beta^2 = 5 \text{，則 } \beta = \pm 2$$

由於要滿足 $\alpha < \beta + 2$ ，所以 $\beta = -2$ 不合。

因此 $\beta = 2$ ，故選(C)。

## 101-02-15

### Statement

設 $f$ 為奇函數， $g$ 為偶函數，及對所有的 $x$ ，恆有 $f(-x) = -f(x)$ 且 $g(-x) = g(x)$ 。

如果 $f$ 和 $g$ 均為非零函數，則下列何者恆為正確？

(A)  $f - g$ 為奇函數

(B)  $f \cdot g$ 為奇函數

(C)  $f^3 \cdot g^3$ 為偶函數

(D)  $2f + 3g$ 為偶函數

(E)  $f + g$ 的函數圖形對稱於 $y$ 軸

### Solution

偶函數只有全部非負整數或全部非正整數兩種情況。

因此乘到奇函數只有全部改變函數上的正負號或不改變兩種情況，函數本身依然是奇函數。

故選(B)。

## 101-02-16

### Statement

下列何者為函數 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^3 - x^2 - x + 1}}$ 的定義域？

(A)  $\{x|x < -1\}$

(B)  $\{x|x > -1\}$

(C)  $\{x|-1 < x < 1\}$

(D)  $\{x|-1 < x, x \neq 1\}$

(E)  $\{x|x > 1\}$

### Solution

$$\sqrt{x^3 - x^2 - x + 1} > 0$$

$$\Rightarrow x^3 - x^2 - x + 1 > 0$$

$$\Rightarrow (x-1)^2(x+1) > 0 \cdot \text{得到 } x \neq 1 \text{ 且 } x \neq -1$$

由於 $(x-1)^2$ 恆正，因此我們考慮 $(x+1) > 0$ ，得到 $x > -1$ 。

因此 $f(x)$ 的定義域 $D(f(x)) = \{x|(x > -1), (x \neq 1)\}$ ，故選(D)

## 101-02-17

### Statement

設 $\frac{x^2 - 10x + 8}{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}$ 的部份分式為 $\frac{a}{x+2} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{(x-2)^2}$ ，則 $a - b - c = ?$

(A)  $-2$

(B)  $-1$

(C)  $1$

(D)  $3$

(E)  $5$

### Solution

$$\frac{x^2 - 10x + 8}{x^3 - 2x^2 - 4x + 8} \Rightarrow \frac{x^2 - 10x + 8}{(x-2)^2(x+2)}$$

$$x^2 - 10x + 8 = a(x-2)^2 + b(x-2)(x+2) + c(x+2)$$

$$\text{令 } x = 2 \cdot 4 - 20 + 8 = 4c \cdot \text{得到 } c = -2$$

$$\text{令 } x = -2 \cdot 16a = 4 + 20 + 8 = 32 \cdot \text{得到 } a = 2$$

$$\text{令 } x = 0 \cdot 8 = 4a - 4b + 2c = 8 - 4b - 4 \cdot \text{得到 } b = -1$$

$$a - b - c = 2 - (-1) - (-2) = 5 \cdot \text{故選}(E)。$$

## 101-02-18

### Statement

設 $2x^2 + (k-1)x + (k-3) = 0$ 之一根大於2，一根小於1，則 $k$ 之範圍為何？

(A)  $\{k | k < -1\}$

(B)  $\{k | 1 < k < 3\}$

(C)  $\{k | -1 < k < 3\}$

(D)  $\{k | k > 1\}$

(E)  $\{k | -\infty < k < \infty\}$

### Solution

$$\frac{-(k-1) \pm \sqrt{(k-1)^2 - 4 \times 2 \times (k-3)}}{2 \times 2}$$

$$\Rightarrow \frac{-k+1 \pm \sqrt{k^2 - 2k + 1 - 8k + 24}}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{-k+1 \pm \sqrt{k^2 - 10k + 25}}{4}$$

一根大於2，因此用  $\frac{-k+1+\sqrt{k^2-10k+25}}{4}$  考慮

因此  $-k+1+\sqrt{k^2-10k+25} > 8$ ， $-k+1+(k-5) > 8$ ，得到  $k < -1$

一根小於1，因此用  $\frac{-k+1-\sqrt{k^2-10k+25}}{4}$  考慮

因此  $-k+1-\sqrt{k^2-10k+25} < 4$ ， $-k+1+(k-5) < 4$ ，得到  $k \in \mathbb{R}$

取聯集得到  $k < -1$ ，因此  $k$  的範圍為  $\{k|k < -1\}$ ，故選 (A)

## 101-02-19

### Statement

若  $f(x) = \sqrt{3-x}$ ， $g(x) = \sqrt{x-1}$ ，則  $f \circ g$  的定義域為何？

(A)  $[1, 3]$

(B)  $[1, 4]$

(C)  $[2, 4]$

(D)  $[3, 9]$

(E)  $[1, 10]$

### Solution

$$f \circ g = \sqrt{3 - \sqrt{x-1}}$$

考慮根號內的數字必須要是非負整數，得到  $3 - \sqrt{x-1} \geq 0$ ， $x \leq 10$

考慮根號內的數字必須要是非負整數，得到  $x - 1 \geq 0$ ，得到  $x \geq 1$

取交集後得到  $1 \leq x \leq 10$ ，故選 (E)。

## 101-02-20

### Statement

若  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$  能被  $x^2 + 1$  整除，則  $f(x)$  除以  $x + 1$  的餘式為何？

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

(E) 10

### Solution

利用長除法來做  $f(x)$  除以  $x^2 + 1$ ，可以得到商為  $(x + a)$  且餘數為  $(b - 1)x + (2 - a)$

因為能夠被整除，因此餘數為0，得到  $b = 1$  且  $a = 2$

因此  $f(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2$

除以  $x + 1$ ，利用餘式定理，將  $x$  帶  $-1$

因此  $f(-1) = (-1)^3 + 2(-1)^2 + (-1) + 2 = -1 + 2 + (-1) + 2 = 2$ ，故選(A)