

103-02-01

Statement

若 $f(x) = 12x^2 - 26x + 5$ ，則 $f(\frac{3+\sqrt{2}}{2}) = ?$

(A) $-2 + 5\sqrt{2}$

(B) $-1 + 5\sqrt{2}$

(C) $1 + 5\sqrt{2}$

(D) 9

(E) $2 + 5\sqrt{2}$

Solution

利用綜合除法，將式子轉成以 $(3x - 2)$ 表示的形式。

$$\begin{array}{r|rr} 12 & -26 & 5 \\ & 18 & -12 \\ \hline 6 & -4 & -7 \\ & 9 & \\ \hline 3 & 5 & \end{array} \quad 3/2$$

綠色字：將 $(x - \frac{3}{2})$ 轉換成 $(2x - 3)$ ，因此係數的部分要除以2。

得到 $f(x) = 3(2x - 3)^2 + 5(2x - 3) - 7$ ，因此 $f(\frac{3+\sqrt{2}}{2}) = 6 + 5\sqrt{2} - 7 = 5\sqrt{2} - 1$ ，故選(B)

103-02-02

Statement

若 $f(\frac{2+x}{4-x}) = x + 2$ ，則 $f(a) = ?$

(A) $\frac{6a}{1-a}$

(B) $\frac{2+a}{2-a}$

(C) $\frac{4+a}{2-a}$

(D) $\frac{2-a}{2+a}$

(E) $\frac{6a}{1+a}$

Solution

$$\frac{2+x}{4-x} = a, \text{ 得到 } x = \frac{4a-2}{a+1}$$

$$\text{因此 } f(a) = \frac{4a-2}{a+1} + 2 = \frac{6a}{a+1}, \text{ 故選(E)}$$

103-02-03

Statement

設 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 6$ ， $\overline{BC} = 5$ ， $\overline{CA} = 4$ ，若 D 為 \overline{BC} 上一點使 $\overline{AD} = 4$ ，則 $\overline{BD} = ?$

(A) 1

(B) 2

(C) $\frac{5}{2}$

(D) 3

(E) 4

Solution

$$\cos C = \frac{5^2 + 4^2 - 6^2}{2 \times 5 \times 4} = \frac{1}{8}$$

$$\text{可以推得 } \cos C = \cos \angle ACD = \frac{4^2 + (\overline{CD})^2 - 4^2}{2 \times 4 \times \overline{CD}} = \frac{1}{8}, \text{ 可得 } \overline{CD} = 1$$

$$\text{因此 } \overline{BD} = \overline{BC} - \overline{CD} = 5 - 1 = 4, \text{ 故選(E)}$$

103-02-04

Statement

求圓 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$ 與直線 $3x - 4y = -7$ 的最近距離為何？

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 4

(E) 5

Solution

$$x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$$

利用配方法，得到 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 16$

因此得到圓心 $(2, -3)$ ，且半徑 $r = \sqrt{16} = 4$

考慮圓心與直線的最近距離，利用點到直線距離公式

$$\frac{|3(2) - 4(-3) + 7|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|25|}{5} = 5$$

長度大於半徑，因此與圓的最近距離為 $5 - 4 = 1$ ，故選(B)

103-02-05

Statement

下列何者錯誤？

(A) $\sin(\pi - x) = \sin x$

(B) $\cos(\pi - x) = -\cos x$

(C) $\tan(\pi + x) = \tan x$

(D) $\csc\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sec x$

(E) $\sec\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) = \csc x$

Solution

$\csc\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sec(x)$ ，故選(D)

103-02-06

Statement

已知 $f(x) = 3x^5 + 19x^4 - 13x^3 + 6x^2 - 6x + 15$ ，求 $f(-7) = ?$

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

(E) 8

Solution

$f(-7)$ 結果與 $f(x) \div (x - 7)$ 的餘數等價 (餘式定理) 。

因此利用綜合除法來找餘數

$$\begin{array}{r|rrrrrr} 3 & 19 & -13 & 6 & -6 & 15 \\ & -21 & 14 & -7 & 7 & -7 \\ \hline 3 & -2 & 1 & -1 & 1 & 8 \end{array} \quad -7$$

因此 $f(-7) = 8$ ，故選 (E)

103-02-07

Statement

設 $f(x) = x^2$ ，若將函數圖形向左平移1個單位，再向上平移 k 個單位後，所得到的圖形通過點 $(-2, 4)$ ，則 $k = ?$

(A) -5

(B) -3

(C) **3**

(D) 4

(E) 5

Solution

根據函數圖形平移，平移的結果為 $y = f(x) = (x + 1)^2 + k$

帶入點 $(-2, 4)$ 求 k ，得到 $4 = (-2 + 1)^2 + k$ ，因此 $k = 3$ ，故選 (C)

103-02-08

Statement

設雙曲線之方程式為 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ ，若將此雙曲線之實軸長放大為2倍，共軛軸與中心點不變，則此雙曲線方程式變為何？

(A) $\frac{x^2}{8} - y^2 = 1$

(B) $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$

$$(C) \quad \frac{x^2}{16} - y^2 = 1$$

$$(D) \quad \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{2} = 1$$

$$(E) \quad \frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$$

Solution

已知實軸長原先為 $2a = 2\sqrt{4} = 4$ ，放大為兩倍後得到 $2a = 8$ ，因此 $a = 4$ ，所以 $a^2 = 16$

又共軛軸與中心點不變，則此方程式變為 $\frac{x^2}{16} - y^2 = 1$ ，故選 (C)

103-02-09

Statement

不等式 $\frac{1 + 2\log_2 x}{-1 + \log_2 x} \leq 1$ 之解為何？

$$(A) \quad \frac{1}{2} \leq x \leq 2$$

$$(B) \quad \frac{1}{2} \leq x < 2$$

$$(C) \quad \frac{1}{4} \leq x \leq 2$$

$$(D) \quad \frac{1}{4} \leq x < 2$$

$$(E) \quad 1 \leq x < 2$$

Solution

$$\frac{1 + 2\log_2 x}{-1 + \log_2 x} \leq 1$$

$$\Rightarrow \frac{1 + 2\log_2 x}{-1 + \log_2 x} - 1 \leq 0$$

$$\Rightarrow \frac{2 + \log_2 x}{-1 + \log_2 x} \leq 0$$

因此我們考慮以下兩種情況取聯集

$$\begin{cases} 2 + \log_2 x \leq 0 \\ -1 + \log_2 x > 0 \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset$$

$$\begin{cases} 2 + \log_2 x \leq 0 \\ -1 + \log_2 x < 0 \end{cases} \Rightarrow [\frac{1}{4}, 2)$$

兩種情況取聯集，得到 $\frac{1}{4} \leq x < 2$ ，故選 (D)

103-02-10

Statement

設 $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$ ，求 $\cos 4\theta$

(A) $\frac{-1}{4}$

(B) $\frac{-1}{8}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(E) 1

Solution

展開 $\cos 4\theta$ 的式子

$$\cos 4\theta = \cos^2 2\theta - \sin^2 2\theta$$

$$= \cos^2 2\theta - (2 \sin \theta \cos \theta)^2$$

將 $\sin \theta - \cos \theta$ 平方，得到

$$(\sin \theta - \cos \theta)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 1 - 2 \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \sin \theta \cos \theta = \frac{3}{8}$$

求 $\sin^2 2\theta$

$$\sin^2 2\theta = \left(\frac{6}{8}\right)^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

求 $\cos^2 2\theta$

$$\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1, \quad \cos^2 2\theta = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$$

計算 $\cos^2 2\theta - \sin^2 2\theta$

$$\cos^2 2\theta - \sin^2 2\theta = \frac{7}{16} - \frac{9}{16} = \frac{-2}{16} = \frac{-1}{8}$$

因此 $\cos 4\theta = \frac{-1}{8}$ ，故選 (B)

