



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

001. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira para responder às questões de 01 a 03.



(Dik Browne. *Hagar. Folha de S. Paulo*, 19 de julho de 2006)

01. Assinale a alternativa que melhor explica o humor da tira.

- (A) O marido retifica imediatamente o conselho ao amigo assim que percebe que não deseja atender ao pedido de sua mulher.
- (B) A mulher vai até o bar onde estava o marido para fazer-lhe um pedido que ele não poderia recusar.
- (C) A mulher se surpreende ao perceber que o marido não é capaz de seguir aquilo que ele mesmo aconselha aos demais.
- (D) O amigo que está ouvindo o conselho não consegue compreender o motivo pelo qual ele é alterado no final.
- (E) O marido dá conselhos a uma pessoa, sem perceber que sua mulher também estava presente no ambiente.

02. No 2º quadro, a expressão “a não ser quando” introduz uma

- (A) concessão, e pode ser substituída por “por mais que”.
- (B) concessão, e pode ser substituída por “mesmo quando”.
- (C) negação, e pode ser substituída por “nunca quando”.
- (D) condição, e pode ser substituída por “salvo quando”.
- (E) condição, e pode ser substituída por “contanto que”.

03. A forma verbal destacada em “Quero que **pinte** a casa hoje” foi empregada no mesmo tempo e modo que a destacada em:

- (A) **Organize** a sala, deixando cada coisa em seu devido lugar.
- (B) Pode ser que **exista** um modo mais fácil de pintar essa parede.
- (C) Sei que **trabalhas** muito na manutenção desta casa.
- (D) Antes de ir viajar, por favor, **conserte** o telhado da casa.
- (E) Ele sempre **arruma** a cozinha antes de preparar as refeições.

Leia o texto para responder às questões de números **04 a 06**.

A memória dos que envelhecem (e que transmitem aos filhos, aos sobrinhos, aos netos, a lembrança dos pequenos fatos que tecem a vida de cada indivíduo e do grupo com que ele estabelece contatos, correlações, aproximações, antagonismos, afeições, repulsas e ódios) é o elemento básico na construção da tradição familiar. Esse folclore jorra e vai vivendo do contato do moço com o velho — porque só este sabe que existiu em determinada ocasião o indivíduo cujo conhecimento pessoal não valia nada, mas cuja evocação é uma esmagadora oportunidade poética. Só o velho sabe daquele vizinho de sua avó, há muita coisa mineral dos cemitérios, sem lembrança nos outros e sem rastro na terra — mas que ele pode suscitar de repente (como o mágico que abre a caixa dos mistérios) na cor dos bigodes, no corte do paletó, na morrinha do fumo, no ranger das botinas de elástico, no andar, no pigarro, no jeito — para o menino que está escutando e vai prolongar por mais cinquenta, mais sessenta anos a lembrança que lhe chega, não como coisa morta, mas viva qual flor olorosa e colorida, límpida e nítida e flagrante como um fato presente.

E com o evocado vem o mistério das associações trazendo a rua, as casas antigas, outros jardins, outros homens, fatos pretéritos, toda a camada da vida de que o vizinho era parte inseparável e que também renasce quando ele revive — porque um e outro são condições recíprocas. Costumes de avô, responsos de avó, receitas de comida, crenças, canções, superstições familiares duram e são passadas adiante nas palestras de depois do jantar; nas das tardes de calor, nas varandas que escurecem; nas dos dias de batizado, de casamento, de velório.

(Pedro Nava. *Baú de Ossos*. São Paulo: Cia das Letras, 2012)

04. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o autor

- (A) reconhece que certos conhecimentos quando são pessoais não valem nada e que, por isso, deve-se consultar outras pessoas, especialmente as de outras gerações.
- (B) menciona situações como batizados, casamentos e velórios para mostrar que há uma religiosidade mais profunda nas pessoas de gerações anteriores.
- (C) defende a transmissão das memórias dos mais velhos aos mais novos como modo de construção de conhecimento prático sobre o mundo.
- (D) compreende que há detalhes nas histórias do passado, como a rua, as casas antigas, entre outras coisas que fazem com que os mais velhos se sintam renascer.
- (E) enxerga na evocação de certos fatos do passado algo de poético que pode ser mantido como tradição viva nas gerações vindouras.

05. Há palavra ou expressão empregada em sentido figurado no trecho:

- (A) ... a lembrança dos pequenos fatos que tecem a vida de cada indivíduo e do grupo... (1º parágrafo)
- (B) Costumes de avô, responsos de avó, receitas de comida, crenças, canções, superstições familiares... (2º parágrafo)
- (C) ... são passadas adiante nas palestras de depois do jantar; nas das tardes de calor... (2º parágrafo)
- (D) ... só este sabe que existiu em determinada ocasião o indivíduo cujo conhecimento pessoal não valia nada... (1º parágrafo)
- (E) ... o menino que está escutando e vai prolongar por mais cinquenta, mais sessenta anos a lembrança que lhe chega... (1º parágrafo)

06. Assinale a alternativa que apresenta informação correta a respeito dos elementos linguísticos do trecho.

- (A) Em "... toda a camada da vida **de que o vizinho era parte inseparável**..." (2º parágrafo), a expressão destacada pode ser substituída por "onde o vizinho participava inseparavelmente".
- (B) Em "... superstições familiares duram e são passadas adiante nas palestras de depois do jantar; **nas das tardes de calor**" (2º parágrafo), a expressão "superstições familiares" está implícita no trecho destacado.
- (C) Em "... para o menino **que** está escutando e vai prolongar por mais cinquenta, mais sessenta anos..." (1º parágrafo), o termo em destaque pode ser substituído por "o qual".
- (D) Em "... mas **cuja evocação** é uma esmagadora oportunidade poética" (1º parágrafo), os termos destacados se referem à expressão "contato do moço com o velho".
- (E) Em "... pequenos fatos que tecem a vida de cada indivíduo e do grupo **com que ele estabelece contatos**..." (1º parágrafo), a expressão destacada pode ser substituída por "cujos contatos ele estabelece".

07. Está redigida em conformidade com a norma-padrão de concordância a frase:

- (A) Como deve agir aqueles que não estão próximos de seus avós para garantir a continuidade das tradições?
- (B) Ouvia-se os conselhos, as advertências e as canções do avô sempre com muita atenção e respeito.
- (C) Não se admitem que as memórias familiares sejam perdidas por falta de diálogo entre as gerações.
- (D) Fundamentais para garantir uma sensação de pertencimento, as tradições familiares vêm se perdendo nos últimos anos.
- (E) Haviam dez anos que o neto não visitava o avô e, por isso, surpreendeu-se quando o viu.

Ogiva

Armar um poema requer lógica.
Uma lógica secreta,
de seita, confraria,
e que apenas os poetas,
iniciados nas artes dessa alquimia,
conhecem e arriscam articular.

Armar um poema é sempre forma
de amar o poema
que o leitor, ao final,
amando-o também,
tentará eternamente,
e sem sucesso,
desarmar.

(Leonardo Almeida Filho. *Tutano*.
São Paulo: Patuá, 2020).

08. A partir da leitura do poema, é correto afirmar que o eu-lírico

- (A) compara a composição de um poema a um esforço de raciocínio lógico, visto que o efeito no leitor é idêntico ao da matemática.
- (B) fala do amor pela poesia como um privilégio apenas dos poetas que conhecem a difícil arte das palavras.
- (C) usa termos bélicos como “armar” e “ogiva” com o objetivo de fazer uma crítica ao poder destrutivo da poesia.
- (D) utiliza o verbo “armar” para se referir a uma composição que é lógica, mas que ainda assim não se opõe ao sentimento.
- (E) considera que somente os membros da confraria dos poetas são capazes de desarmar a poesia para proteger os leitores de seus efeitos.

09. As vírgulas intercalam uma expressão explicativa em:

- (A) ... confraria, e que apenas os poetas, iniciados...
- (B) ... amando-o também, tentará eternamente, e sem sucesso...
- (C) ... os poetas, iniciados nas artes dessa alquimia, conhecem...
- (D) ... uma lógica secreta, de seita, confraria...
- (E) ... que o leitor, ao final, amando-o também...

10. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase a seguir.

Os poetas, devido _____ uma enorme capacidade de expressão, nos fazem aspirar _____ momentos de encanto e emoção _____ que somos levados através de suas obras.

- (A) à ... aqueles ... a
- (B) a ... aqueles ... à
- (C) a ... àqueles ... à
- (D) à ... àqueles ... à
- (E) a ... àqueles ... a

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um auxiliar de escritório foi incumbido de arquivar determinado número de prontuários. No primeiro dia de trabalho, ele arquivou a terça parte dos prontuários. No segundo dia de trabalho, arquivou a quarta parte dos prontuários que ainda não haviam sido arquivados. No terceiro dia de trabalho, ele arquivou 15 prontuários, e outros 45 prontuários, que não faziam parte dos prontuários originais, chegaram para arquivamento, mas não foram arquivados no terceiro dia. No quarto dia ele arquivou 50 prontuários, no quinto dia ele arquivou 55 prontuários e encerrou o trabalho.

O total de prontuários arquivados pelo auxiliar é um número compreendido entre

- (A) 200 e 215.
- (B) 185 e 200.
- (C) 170 e 185.
- (D) 140 e 155.
- (E) 155 e 170.

12. A prescrição de três remédios para um paciente é a seguinte: remédio A, a cada 2 horas, remédio B a cada 1,5 hora e o remédio C sempre que coincidir o horário em que os remédios A e B são administrados simultaneamente. Sabendo que no dia inicial do tratamento o remédio A foi administrado pela primeira vez às 7 horas e o remédio B foi administrado pela primeira vez às 8 horas, o horário em que o remédio C foi administrado pela terceira vez foi às

- (A) 23h.
- (B) 17h.
- (C) 21h.
- (D) 14h 30min.
- (E) 19h 30min.

13. Marcelo subiu na balança e registrou 85 kg. Após 10 dias fazendo exercícios e se alimentando melhor, o registro foi 79,9 kg.

A porcentagem que representa a diminuição de seu registro na balança foi de

- (A) 8%.
- (B) 5%.
- (C) 6%.
- (D) 7%.
- (E) 4%.

14. No Brasil, uma pesquisa realizada pela Fiocruz, por iniciativa do Cofen (Conselho Federal de Enfermagem), revela que a proporção de enfermeiros para cada 100 mil habitantes é de 217, sendo que o ideal proposto pela OMS é de 500 para cada 100 mil habitantes. Supondo que a população brasileira seja aproximadamente de 203 milhões de habitantes, a defasagem no número de enfermeiros no Brasil, segundo o ideal proposto pela OMS, é de aproximadamente

- (A) 583430.
- (B) 581560.
- (C) 598900.
- (D) 574490.
- (E) 590570.


15. Sabe-se que 1 mL corresponde a 20 gotas. Um paciente deve receber a administração de 360 mL de soro. Essa administração deve durar 6 horas. A quantidade de gotas por minuto que deve ser administrada para esse paciente é igual a

- (A) 12.
- (B) 20.
- (C) 15.
- (D) 18.
- (E) 24.

Observe a figura a seguir para responder às questões de números **16** e **17**.

R A S C U N H O

Essa figura representa o contorno de um terreno. As medidas da figura estão expressas em decâmetros. Considere a seguinte relação de medidas: 1 decâmetro corresponde a 10 metros.



(Figura fora de escala)

16. O perímetro deste terreno é, em metros, igual a

- (A) 380.
- (B) 365.
- (C) 408.
- (D) 396.
- (E) 400.

17. A área do terreno, em metros quadrados, é igual a

- (A) 5 800.
- (B) 9 500.
- (C) 6 500.
- (D) 6 750.
- (E) 8 900.

18. Considere a sequência ilimitada:

10, 15, **2**, 20, 25, **4**, 30, 35, **8**, 40, ...

Nessa sequência, criada por meio de um padrão, há a situação na qual a diferença entre um de seus termos e o termo seguinte é igual a 1. Em relação a esses dois termos, sua soma é igual a

- (A) 119.
- (B) 113.
- (C) 123.
- (D) 127.
- (E) 129.

19. A afirmação: “Se você segue as recomendações, então fica tudo bem” é equivalente lógica da afirmação:

- (A) Ou você segue as recomendações ou fica tudo bem.
- (B) Você não segue as recomendações ou fica tudo bem.
- (C) Se fica tudo bem, então você não segue as recomendações.
- (D) Se você não segue as recomendações, então não fica tudo bem.
- (E) Se não fica tudo bem, então você segue as recomendações.

20. Um hospital com 140 leitos é considerado um hospital de médio porte. Já com 210 leitos o hospital é considerado de grande porte. Suponha que essas quantidades expressas anteriormente sejam a realidade em um hospital de médio porte e outro de grande porte. Se o número de leitos do hospital de médio porte for aumentado em 30% e o número de leitos do hospital de grande porte for reduzido de modo que os dois hospitais fiquem com o mesmo número de leitos, então a porcentagem de redução do número de leitos do hospital de grande porte foi um valor entre

- (A) 12% e 14%.
- (B) 10% e 12%.
- (C) 16% e 18%.
- (D) 14% e 16%.
- (E) 18% e 20%.

R A S C U N H O

LEGISLAÇÃO

21. Considere que Platão, servidor público do Município de Campinas, detendo com exclusividade conhecimentos práticos de seu cargo, está reiteradamente se isolando e recusando comunicação com Aristóteles, seu superior hierárquico imediato, por mera animosidade, atentando contra a integridade psíquica e degradando o ambiente de trabalho. Diante da situação hipotética é correto afirmar, de acordo com o Manual de Ética da Prefeitura de Campinas, que a conduta de Platão:

- (A) Configura assédio moral horizontal.
- (B) Ante a ausência de violência verbal, física ou sexual, deve ser afastada a possibilidade de caracterização de assédio moral.
- (C) Caracteriza assédio moral, apesar de Aristóteles ser seu superior hierárquico.
- (D) Configura assédio moral vertical descendente.
- (E) Não caracteriza assédio moral, pois este exige ofensas diretas ao servidor.

22. Assinale a alternativa correta sobre a competência para a definição, coordenação e execução de serviços de vigilância sanitária de acordo com o disposto na Lei nº 8.080/1990.

- (A) Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde definir os serviços de vigilância sanitária.
- (B) Compete à direção estadual do Sistema Único de Saúde coordenar com exclusividade os serviços de vigilância sanitária.
- (C) Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde definir e coordenar os serviços de vigilância sanitária.
- (D) Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde executar os serviços de vigilância sanitária.
- (E) Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde definir e coordenar com exclusividade os serviços de vigilância sanitária.

23. Com relação aos recursos do Fundo Nacional de Saúde direcionados à cobertura das ações e serviços de saúde, investimentos na rede de serviços, cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e demais ações de saúde, a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, nos termos do previsto na Lei nº 8.142/1990, é correto afirmar que

- (A) a criação de consórcio para a execução de ações e serviços de saúde pelos Municípios implica na impossibilidade de utilização dos recursos do Fundo Nacional de Saúde.
- (B) caso o Município não conte com fundo de saúde, os recursos concernentes serão divididos entre outros Municípios do Estado.
- (C) caso o Município não conte com Conselho de Saúde e Relatórios de Gestão, os recursos concernentes serão administrados diretamente pela União.
- (D) os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, considerando o princípio da legalidade.
- (E) serão destinados pelo menos 70% dos recursos aos Municípios e o restante aos Estados.

24. Tício, servidor público efetivo do Município de Campinas, está sofrendo processo administrativo, acusado de aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária. Nesse caso hipotético, assinale a alternativa correta à luz da previsão do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campinas (Lei nº 1.399/55).

- (A) A conduta é passível da imposição da pena de demissão, cuja autoridade competente para imposição é o Prefeito Municipal.
- (B) A conduta é passível de pena máxima de repreensão.
- (C) A conduta é passível de pena máxima de suspensão, cumulada ou isoladamente com multa.
- (D) A conduta é passível de pena de demissão, sendo autoridade competente para a aplicação o Diretor de Departamento.
- (E) A conduta é passível de pena de demissão a bem do serviço público, sendo autoridade competente para a imposição o Corregedor.

25. Gracinda, servidora do município de Campinas admitida após a entrada em vigor do Decreto nº 21.019/2020 do Município de Campinas, sujeita ao Programa de Avaliação Probatória, após duas avaliações semestrais em que obteve, em uma escala de 0 a 100, notas 70 e 90, obteve, na terceira avaliação, nota 40.

Diante da situação hipotética, é correto afirmar, com base no Decreto mencionado, que

- (A) não cabe recurso em face das avaliações semestrais, mas somente em face da avaliação final no caso de média final inferior a 70% dos pontos sob análise.
- (B) Gracinda poderá tomar ciência e discordar da avaliação realizada, que atribuiu a nota 40, realizando a autoavaliação.
- (C) Gracinda terá sua exoneração imediatamente recomendada, tendo em vista a nota inferior a 50.
- (D) cabe recurso em face das avaliações semestrais, a serem apreciados pelo Secretário de Recursos Humanos do Município de Campinas.
- (E) Gracinda deverá alcançar aproveitamento médio final de 60% dos pontos sob análise para que seja considerada aprovada e adquira estabilidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem

- (A) se aplica a enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem obstétrizes e parteiras, bem como aos atendentes de enfermagem.
- (B) estabelece o direito do enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem, de registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica e legível.
- (C) estabelece as normas procedimentais para serem aplicadas nos processos éticos no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
- (D) estabelece como dever dos profissionais de enfermagem, estimular, apoiar, colaborar e promover as atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovadas pelas instâncias deliberativas.
- (E) determina que os enfermeiros têm o dever de aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.

27. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2017) estabelece como atribuição comum a todos os profissionais que compõem as equipes de saúde da família (ESF) e de atenção básica (EAB), entre outras ações,

- (A) encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando os fluxos locais, mantendo o acompanhamento do plano terapêutico prescrito.
- (B) manter atualizadas rotinas, protocolos e fluxos relacionados ao atendimento de sua competência na unidade básica de saúde (UBS), domicílio e comunidade.
- (C) participar no processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
- (D) realizar o acolhimento com escuta qualificada e classificação de risco, de acordo com os protocolos estabelecidos pela instituição.
- (E) realizar a estratificação de risco e desenvolver o plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.

28. A obrigatoriedade de os profissionais de saúde informarem à gestante/puérpera e aos acompanhantes sobre a importância do teste do pezinho e sobre as eventuais diferenças existentes entre as modalidades oferecidas no Sistema Único de Saúde e na rede privada de saúde, durante os atendimentos de pré-natal e de puerpério imediato, é determinada pela(o)

- (A) Política Nacional de Atenção Integral à Criança.
- (B) Política Nacional de Atenção Básica.
- (C) Política Nacional de Humanização.
- (D) Estatuto da Criança e do Adolescente.
- (E) Estratégia Rede Cegonha.

29. De acordo com o estabelecido pela Norma Regulamentadora nº 32 (NR32) – Saúde e Segurança nos Serviços de Saúde, ao adotar as medidas de controle para reduzir os riscos de acidentes com materiais perfurocortantes que oferecem risco de exposição a agentes biológicos, a Comissão Gestora Multidisciplinar deve considerar a:

- I. implementação de mudanças na organização e nas práticas de trabalho;
- II. adoção de material perfurocortante com dispositivo de segurança para uso, quando existente, disponível e tecnicamente possível;
- III. adoção de medidas de controle de engenharia no ambiente;
- IV. substituição do uso de agulhas e outros perfurocortantes quando tecnicamente possível.

A adoção das medidas de controle deve obedecer à seguinte hierarquia:

- (A) I, II, III, IV.
- (B) IV, III, II, I.
- (C) III, II, I, IV.
- (D) I, II, IV, III.
- (E) IV, I, II, III.

30. Ao desenvolver a quinta etapa do Processo de Enfermagem, o enfermeiro realiza avaliação de processo quando

- (A) analisa se os recursos humanos garantiram a qualidade da assistência.
- (B) investiga a satisfação do usuário/paciente durante e após o cuidado.
- (C) verifica se ocorreu mudança no comportamento do usuário/paciente a partir da assistência prestada.
- (D) verifica se os recursos materiais disponíveis permitiram garantir a qualidade da assistência.
- (E) realiza o julgamento do cuidado prestado pela equipe de enfermagem.

31. Ao proceder ao exame físico de um paciente, sexo masculino, 30 anos, com queixa de febre, dor abdominal sem localização e náuseas há 1 dia, o enfermeiro realizou a palpação abdominal profunda e contínua do quadrante inferior esquerdo o que resultou em queixa de dor intensa na fossa ilíaca direita. Frente a essa situação, é correto afirmar que o enfermeiro obteve sinal de
- (A) Rovsing positivo.
 - (B) Murphy negativo.
 - (C) McBurney negativo.
 - (D) McBurney positivo.
 - (E) Jobert positivo.
32. Ao elaborar o plano de cuidados de um idoso diabético comprometido (frágil), portador de insuficiência cardíaca congestiva compensada, em consonância com a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes atualizada em 2023, o enfermeiro deve estabelecer como metas no tratamento da diabetes os seguintes valores para hemoglobina glicada (HbA1c) e glicemia de jejum/pré-prandial (GJ/PP):
- (A) HbA1c = $\leq 8,5\%$; GJ/PP = 100 – 180 mg/dL.
 - (B) HbA1c = $< 8,0\%$; GJ/PP = 90 – 150 mg/dL.
 - (C) HbA1c = $< 7,0\%$; GJ/PP = 80 – 130 mg/dL.
 - (D) HbA1c = $\leq 7,5\%$; GJ/PP = 90 – 150 mg/dL.
 - (E) HbA1c = $< 7,5\%$; GJ/PP = 80 – 130 mg/dL.
33. No momento da alta hospitalar, ao orientar uma paciente submetida a ressecção segmentar de cólon, com colostomia ascendente, e seus familiares, o enfermeiro deve esclarecer que é normal a eliminação de fezes
- (A) líquidas e ácidas.
 - (B) semisólidas.
 - (C) semiformadas/pastosas.
 - (D) firmes, sólidas.
 - (E) fluidas/semilíquidas.
34. J.E., 68 anos, sexo masculino, diabético, hipertenso, com diagnóstico de broncopneumonia, está internado na unidade de clínica médica para tratamento. No início do plantão, ao visitar o paciente para avaliação e atualização do plano de cuidados de enfermagem, o enfermeiro constatou que J.E. apresentava temperatura = $38,8\text{ }^{\circ}\text{C}$, frequência cardíaca = 112 batimentos por minuto, frequência respiratória = 24 respirações por minuto, pressão arterial = 88 x 58 mmHg, glicemia capilar em jejum = 210 mg/dL, cetonúria negativa, distensão abdominal com presença de ruídos hidroaéreos hipoativos e *delirium*. Frente a essa situação, solicitou a presença imediata do médico e tomou as demais providências.
- Com base no quadro clínico do paciente, assinale a alternativa que apresenta a principal suspeita (S) e a conduta (C) a ser adotada pelo enfermeiro.
- (A) S = obstrução intestinal; C = providenciar acesso venoso periférico, mantendo-o com soro fisiológico acrescido da dose de insulina simples constante da prescrição médica de rotina, colocar o paciente em jejum e realizar a cateterização nasogástrica, deixando a sonda aberta.
 - (B) S = cetoacidose diabética; C = providenciar acesso periférico calibroso, coletar amostra de sangue para a dosagem de eletrólitos, e iniciar a reposição hídrica com solução ringer lactato.
 - (C) S = sepse; C = providenciar imediatamente acesso venoso periférico calibroso e coletar amostras de sangue para a realização de lactato sérico, hemocultura, hemograma, creatinina, bilirrubinas e coagulograma, conforme protocolo.
 - (D) S = choque anafilático; C = administrar oxigênio por cateter com fluxo de 10 L/minuto; providenciar acesso venoso periférico e estar preparado para a administração de epinefrina por via subcutânea.
 - (E) S = síndrome hiperosmolar hiperglicêmica; C = antecipar imediatamente a aplicação da dose de insulina simples, por via subcutânea, constante da prescrição médica de rotina e coletar amostra de sangue para dosagem de eletrólitos.

35. Gestante, com idade gestacional de 38^{6/7} semanas, procurou uma unidade de pronto atendimento (UPA) relatando perda de líquido por via vaginal há 30 minutos, sem contrações uterinas. Ao exame obstétrico, constatou-se feto único, vivo, dinâmica uterina = 1 contração em 10 minutos, de fraca intensidade. Ao toque vaginal constatou-se: feto com apresentação pélvica, 3 cm de dilatação, rotura de bolsa amniótica e presença de cordão umbilical na vagina. Entre outras ações, foi providenciada ambulância para a remoção imediata da paciente para a maternidade mais próxima.

Frente a essa situação, o enfermeiro deve observar que durante a remoção a gestante seja transportada, em

- (A) maca, na posição de Fowler baixo, com a cabeceira elevada a 15°, com corpo alinhado à maca e os joelhos mais altos do que a cabeceira.
- (B) maca, na posição de semi-Fowler, com a cabeceira elevada a 30°.
- (C) maca, na posição de Sim's, à esquerda.
- (D) prancha, em decúbito lateral esquerdo, em Trendelenburg, com pés voltados para a cabeceira elevada da maca.
- (E) maca, na posição de Sims, à direita.

36. Em uma unidade de pronto atendimento (UPA), enquanto aguardava atendimento, paciente do sexo feminino, 52 anos, hipertensa, sem história de trauma, apresentou um quadro de perda da consciência. Transportada para a sala de emergência, a equipe constatou se tratar de um caso de parada cardiorrespiratória. A equipe iniciou, imediatamente, os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e ao instalar o monitor/cardioversor obteve o seguinte traçado:



(<https://www.facebook.com.br/braenf/photos/>)

Considerando-se o traçado obtido, entre outras ações, a sequência inicial dos procedimentos de ressuscitação que deve ser adotada é:

- (A) administração imediata de 1 mg de epinefrina, por via endovenosa, RCP de qualidade por 2 minutos, se não houver sinais de retorno da circulação espontânea, executar RCP de qualidade por mais 2 minutos, mantendo a administração da mesma dose de epinefrina a cada 3-5 minutos.
- (B) desfibrilação, se não houver sinais de retorno da circulação espontânea, RCP de qualidade por 2 minutos e administração de 1 mg de epinefrina, por via endovenosa e, se mantidas as mesmas condições, realizar nova desfibrilação.
- (C) desfibrilação, se não houver sinais de retorno da circulação espontânea, realizar nova desfibrilação e, se mantidas as mesmas condições, executar RCP de qualidade e por 2 minutos, administração de 300 mg de amiodarona, em bolus.
- (D) administração imediata de 1 mg de epinefrina, por via endovenosa, RCP de qualidade por 1 minuto, se não houver sinais de retorno da circulação espontânea, realizar a desfibrilação seguida de RCP de qualidade, mantendo a administração da mesma dose de epinefrina a cada 3-5 minutos.
- (E) desfibrilação, RCP de qualidade por 2 minutos e se não houver sinais de retorno da circulação espontânea, administrar 1,5 mg de lidocaína, por via endovenosa, seguida RCP de qualidade por 2 minutos.

37. Consideradas como as intercorrências mais comuns na gestação, as síndromes hipertensivas representam a principal causa de morbimortalidade materna no mundo (MS, 2022). Para obtenção de valores fidedignos, a aferição da pressão arterial (PA) deve ser feita, preferencialmente, com a gestante _____, e em mais de uma medida com intervalo de _____, aplicando o aparelho com manguito de 13 cm no membro superior _____, mantendo-o elevado, na altura do coração. A obtenção de pressão arterial sistólica _____ e/ou diastólica _____ definem hipertensão arterial na gestação.

Assinale a alternativa que, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde (2022), completa, correta e respectivamente, o texto apresentado.

- (A) sentada ... 30 a 60 minutos ... esquerdo ... > 130 mmHg ... > 85 mmHg.
- (B) em decúbito lateral esquerdo ... 1 a 2 horas ... esquerdo ... > 130 mmHg ... > 90 mmHg.
- (C) sentada ... 4 a 6 horas ... direito ... > 140 mmHg ... > 90 mmHg.
- (D) em decúbito lateral esquerdo ... 3 a 5 minutos ... direito ... > 130 mmHg ... > 90 mmHg.
- (E) em decúbito lateral esquerdo ... 3 a 5 minutos ... direito ... > 140 mmHg ... > 90 mmHg.

38. Considere os diferentes aspectos relacionados à amamentação/aleitamento materno e assinale a alternativa correta.

- (A) Atualmente, frente a puérperas com teste Rt-PCR ou Elisa positivos para covid19, apenas as mulheres que possuem esquema vacinal completo para a doença devem ser aconselhadas a amamentar seus bebês, observadas as demais medidas de prevenção.
- (B) Mesmo que não tenham sido realizadas ações para a prevenção da transmissão vertical da hepatite B, o bebê pode ser amamentado desde o nascimento.
- (C) Devido a hipotonia característica do recém-nascido com síndrome de Down, o aleitamento materno está contraindicado, recomendando-se que a criança seja alimentada com leite materno, recém ordenhado, em mamadeira.
- (D) A puérpera vivendo com HIV, em uso de antiretrovirais há, pelo menos, 6 meses, deve ser orientada a amamentar seu bebê.
- (E) Recém-nascidos portadores de fenda do palato não podem ser levados ao seio para amamentação, devendo ser alimentadas sentadas ou semissentadas, com leite materno oferecido em colherinha ou copinho.

39. Considere os itens apresentados no quadro a seguir.

- I. Facilita o processo interativo mãe-pai-bebê e com isto o vínculo afetivo familiar.
- II. Possibilita maior competência e confiança dos pais no cuidado de seu filho, inclusive após a alta.
- III. Estimula o aleitamento materno, garantindo maior frequência, precocidade e duração.
- IV. Promove a participação da família nos cuidados com o recém-nascido durante a internação.

O Método Canguru é um modelo de atenção perinatal voltado para o cuidado qualificado e humanizado do recém-nascido que apresenta como vantagem o apresentado em

- (A) I e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II, III, IV.

40. Em relação à Estratégia de Fortificação Infantil com Micronutrientes em Pó (NutriSUS), é correto afirmar que

- (A) deve contemplar todas as crianças de 6 a 24 meses de idade acompanhadas na atenção primária à saúde (APS).
- (B) as primeiras orientações sobre a suplementação e a dispensação inicial dos sachês de micronutrientes (NutriSUS) devem ser realizadas em consulta com o nutricionista membro da equipe do Nasf que atende as equipes de saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS) responsável pelo território onde a criança reside.
- (C) ao realizar a consulta de enfermagem de puericultura, o enfermeiro deve enfatizar à mãe/cuidador da criança incluída no programa, que os sachês devem ser ofertados três vezes por semana, junto com as refeições.
- (D) a criança que recebe suplementação pelo NutriSUS não deve receber outro suplemento de ferro, como o sulfato ferroso, e não necessita receber a megadose de vitamina A.
- (E) o enfermeiro deve orientar a mãe/cuidador da criança que o conteúdo em pó do sachê deve ser oferecido diluído completamente em líquidos como água, leite ou sucos.

41. O enfermeiro da equipe de Saúde da Família (ESF) realiza reuniões periódicas com os adolescentes de sua área de abrangência para conversar sobre os assuntos de saúde de interesse do grupo. Considerando que, os adolescentes têm direito de ter acesso livre à informação e à educação em saúde sexual e reprodutiva e ter acesso a meios e métodos que os auxiliem a evitar uma gravidez, ao ser questionado sobre anticoncepção, deve esclarecer que

- (A) os anticoncepcionais hormonais combinados, compostos por estrogênio e progestogênio, na apresentação injetável para aplicação mensal, são contraindicados na adolescência.
- (B) o uso do preservativo masculino ou do diafragma, em todas as relações sexuais, combinados com anticoncepcionais hormonais, constituem uma prática efetiva para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e gravidez.
- (C) a legislação atual proíbe a prescrição de anticoncepcionais hormonais para menores de 14 anos sem a autorização dos pais ou responsável legalmente constituído.
- (D) em caso de uma relação sexual desprotegida, a adolescente deve procurar o serviço de saúde em 24 horas, acompanhada por um dos pais ou responsável, que deverá autorizar o uso da “pílula do dia seguinte”.
- (E) o uso de métodos comportamentais, tais como: tabela, muco cervical e temperatura basal não é recomendável para adolescentes.

42. Observe atentamente o quadro a seguir e relacione suas colunas de modo a tornar verdadeira a associação entre a vacina e a conduta a ser adotada frente a situações em que as pessoas foram vacinadas com doses inadequadas (volume insuficiente).

Vacina	Conduta
a) Hepatite B (pós-exposição).	I. Repetir dose com intervalo mínimo de quatro semanas da última dose administrada.
b) Sarampo, caxumba e rubéola (SCR).	II. Realizar exames para verificar o <i>status</i> sorológico e aplicar a dose da vacina.
c) HPV.	III. Repetir a dose o mais rápido possível.

- (A) a - II; b - I; c - III.
- (B) a - I; b - III; c - II.
- (C) a - II; b - III; c - I.
- (D) a - III; b - II; c - I.
- (E) a - I; b - II; c - III.

43. Devido ao fato de ter contraído a doença, no momento da alta, devem ser orientados a procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber o esquema da vacina específica, todos os indivíduos diagnosticados com

- (A) Poliomielite.
- (B) Hepatite A.
- (C) Tétano.
- (D) Febre amarela.
- (E) Rubéola.

44. Ao desenvolver o Processo de Enfermagem para uma paciente, sexo feminino, 17 anos, com diagnóstico de bulimia nervosa, o enfermeiro registrou: “Risco para automutilação, relacionado a sentimento de inadequação e necessidade de alívio da tensão, evidenciado por ferimentos causados por vômito autoinduzido”, como um dos diagnósticos de enfermagem.

Assinale a alternativa que apresenta a intervenção de enfermagem adequada para esse diagnóstico de enfermagem.

- (A) Pesar a paciente diariamente, utilizando a mesma balança, logo após o despertar e depois da primeira micção, cuidando para que a paciente mantenha a quantidade de roupas.
- (B) Explorar o medo de ganhar peso quando a paciente expressar ou manifestar comportamento que denote exacerbação da ansiedade em relação ao aumento de peso.
- (C) Reconhecer e discutir valores familiares e culturais, crenças e estereótipos que dizem respeito à magreza e à atratividade.
- (D) Ajudar a paciente a perceber que a busca do corpo perfeito está fora da realidade.
- (E) Estabelecer com a paciente e a equipe interdisciplinar a meta de peso a ser alcançada.

Leia o relato a seguir para responder as questões de números 45 a 48.

Após tomar conhecimento pela imprensa do surto de febre maculosa no município, R.F., 34 anos, sexo masculino, agente de segurança, compareceu ao serviço de saúde referindo febre há 3 dias, cefaleia, mialgia intensa, náuseas e vômitos. Relatou ao enfermeiro que era vinculado formalmente a uma empresa que terceirizou o serviço de segurança do evento frequentado por pessoas recentemente diagnosticadas com febre maculosa, e que havia trabalhado nesse local há 8 dias, circulando por diversas áreas. Perguntado, negou perceber ter sido picado por carrapato na ocasião. Informou que residia em área urbana, não frequentava parques ou áreas de mata para recreação e não possuía animais domésticos.

Ao exame físico constatou-se: temperatura axilar = 38,8 °C, frequência cardíaca = 88 batimentos por minuto, frequência respiratória = 20 movimentos por minuto, pressão arterial = 122 x 78 mmHg, não sendo evidenciada a presença de exantema maculopapular ou outras alterações.

Considerado como caso suspeito de febre maculosa, foi prescrito o tratamento com doxicilina, por via oral, coletada a 1ª amostra de sangue para a realização do exame de reação de imunofluorescência indireta (Rifi) para riquetsias e preenchida a Ficha de Investigação da Febre Maculosa.

Finalizando o atendimento, entre outras ações, R.F. recebeu atestado médico para afastamento do trabalho por 8 dias para tratamento da saúde e foi orientado pelo enfermeiro sobre o tratamento, os sinais e sintomas de agravamento do quadro e a necessidade de retornar ao serviço em 14 dias para a coleta de amostra de sangue para realização de novo exame de Rifi para controle.

Ao longo do período de monitoramento de R.F., o enfermeiro constatou que o quadro evoluía sem complicações e os exames de Rifi realizados apresentavam: 1ª amostra: não reagente; 2ª amostra: IgG = 1:128.

45. No que diz respeito ao tratamento, é correto afirmar que o enfermeiro deve orientar R.F. que

- (A) só deveria iniciar a ingestão da doxicilina após ser informado de que o resultado do exame de Rifi estava positivo para febre maculosa.
- (B) a coloração esbranquiçada das fezes é normal até 2 dias após o término do tratamento.
- (C) o medicamento deve ser ingerido em jejum e, no mínimo, 1 hora antes das refeições, respeitando o intervalo de, pelo menos, 1 hora após a refeição anterior.
- (D) deve evitar a exposição excessiva à luz solar ou à luz ultravioleta artificial e usar bloqueadores solares durante o tratamento.
- (E) em caso de desconforto gástrico, deve fazer uso de antiácidos à base de alumínio, cálcio ou magnésio.

46. Considerando os dados apresentados, ao realizar o encerramento do caso, o enfermeiro deve considerar que, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (2022), o caso deve ser classificado como

- (A) confirmado por critério clínico-epidemiológico, porque R.F. apresentou sinais e sintomas compatíveis com a doença e antecedentes epidemiológicos que atendem a definição de caso suspeito, mas não apresentou soroconversão para IgM nos dois exames Rifi (para riquetsias) realizado.
- (B) descartado, porque se trata de caso suspeito que não se encaixou nos critérios estabelecidos para definição de caso confirmado de febre maculosa.
- (C) inconclusivo, porque não foi realizado um terceiro exame de Rifi IgG para confirmação da soroconversão, uma vez que os anticorpos IgG podem apresentar reação cruzada com outras doenças, como a dengue, e devem ser analisados com critério.
- (D) inconclusivo, porque R.F. não apresentou sinais patognomônicos da febre maculosa, o resultado do segundo exame de Rifi apresentou titulação IgG inferior a 1:256 e não se observou soroconversão para IgM.
- (E) confirmado por critério laboratorial, porque R.F. apresentou sinais e sintomas compatíveis com febre maculosa, antecedentes epidemiológicos que atendem a definição de caso suspeito e soroconversão dos títulos de Rifi, evidenciada por título IgG = 1:128.

47. Frente a um surto de febre maculosa, as equipes de saúde da família (ESF) e de atenção básica (EAB) devem, entre outras ações, intensificar as medidas de esclarecimento à população sobre o uso de barreiras físicas quando for se expor a áreas com possibilidade de presença de carrapatos, tais como:

- (A) usar calças compridas, inserindo a parte inferior por dentro de botas, preferencialmente de cano longo, e vedadas com fita adesiva de dupla face.
- (B) examinar o próprio corpo a cada 3 dias, a fim de verificar a presença de carrapatos.
- (C) Procurar o serviço de saúde para a retirada de carrapatos aderidos à pele, caso encontrados no corpo.
- (D) dar preferência ao uso de roupas escuras e com mangas compridas, para repelir os carrapatos ou diminuir sua adesão.
- (E) esmagar o carrapato logo após retirado da pele, para evitar a postura de ovos.

48. Confirmado o diagnóstico de febre maculosa para R.F., no que diz respeito aos aspectos trabalhistas, é correto afirmar que a situação
- (A) se equipara a acidente do trabalho, porém o preenchimento da comunicação de acidente do trabalho (CAT) é desnecessária, porque o período de afastamento do trabalho foi inferior a 15 dias.
 - (B) não pode ser considerada como um acidente de trabalho, porque não tem relação direta com as atividades descritas para a função de segurança.
 - (C) se equipara a acidente do trabalho e o empregador deve emitir a comunicação de acidente do trabalho (CAT).
 - (D) configura um caso de doença do trabalho e o empregador deve ser solicitado a emitir a comunicação de acidente do trabalho (CAT).
 - (E) configura um caso de doença profissional e o médico ou enfermeiro que atendeu o caso deve preencher a ficha de investigação de acidente do trabalho/doença profissional e providenciar seu registro no SINAN.
49. Considere os aspectos relacionados à síndrome de esgotamento profissional e assinale a alternativa correta.
- (A) Diferentemente da síndrome de burnout, na síndrome do esgotamento profissional o estresse não envolve atitudes e condutas negativas com relação aos clientes, ao trabalho e à organização.
 - (B) A síndrome afeta principalmente profissionais e ocupacionais cujo trabalho se caracteriza pelo isolamento, monotonia ou repetitividade.
 - (C) Mudanças na cultura da organização do trabalho, o estabelecimento de restrições à exploração do desempenho individual e a diminuição da competitividade constituem medidas eficazes para a prevenção da síndrome.
 - (D) A vivência de situações traumáticas no trabalho, tais como assaltos e acidentes, constitui um dos fatores desencadeantes da síndrome.
 - (E) Não existem evidências de que a síndrome de esgotamento profissional esteja associada a uma maior suscetibilidade ao uso abusivo do álcool ou outras drogas, bem como ao suicídio.
50. O Enfermeiro Responsável Técnico (ERT) é o profissional de enfermagem, de nível superior, que tem sob sua responsabilidade o planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos Serviços de Enfermagem, a quem é concedida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo Conselho Regional de Enfermagem. Tem como uma de suas atribuições:
- (A) presidir a Comissão de Ética de Enfermagem da instituição.
 - (B) organizar o Serviço de Enfermagem utilizando-se de instrumentos administrativos, como regimento interno, normas e rotinas, protocolos, procedimentos operacionais padrão e outros.
 - (C) designar o(s) enfermeiro(s) responsável(eis) pela realização do dimensionamento de pessoal de enfermagem.
 - (D) atuar, como representante do Serviço de Enfermagem, na Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH)
 - (E) garantir que o estágio curricular obrigatório e não obrigatório seja realizado apenas sob supervisão do enfermeiro responsável pelo setor de educação continuada da instituição.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

20.08.2023

001. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

VERSÃO 3

1 - A	2 - D	3 - B	4 - E	5 - A	6 - C	7 - D	8 - D	9 - C	10 - E
11 - B	12 - A	13 - C	14 - D	15 - B	16 - E	17 - C	18 - E	19 - B	20 - A
21 - C	22 - D	23 - E	24 - A	25 - B	26 - A	27 - C	28 - D	29 - B	30 - E
31 - A	32 - B	33 - E	34 - C	35 - D	36 - A	37 - C	38 - B	39 - E	40 - D
41 - E	42 - A	43 - C	44 - B	45 - D	46 - E	47 - A	48 - C	49 - C	50 - B