KURUTMA

Dane mısır üretiminde uzun süreli depolama için rutubet oranı %14-15'e düşürülmelidir. Hasatta %20-25 düzeyinde olan nem uzaklaştırılmadan depolanacak olursa küf mantarları gelişir ve bunlar tarafından aflatoksin adı verilen zehir üretilir. Bunun için çabuk bir kurutma işlemi uygulanmalıdır. Kurutma maliyetini düşürmek için zamanında uygun gelişme süresine sahip çeşitlerin ekimi önemlidir. Geç ekimlerde erkenci çeşitler üzerinde durulmalıdır. Sonbaharda iklim müsaade ettiği sürece hasat geciktirilerek kuruma belli ölçüde tarlada temin edilmelidir.

Silaj hasatının süt olumun tamamlanıp hamur olum dönemine geçildiği ve dane'nin üst kısmında hafif çöküntünün olduğu dönem uygundur. Bu dönemde hızlı bir fermantasyon, yüksek sindirilme oranı ve kuru madde %28-30 oranında olmaktadır.

EKİM NÖBETİ

Konya ilinde üst üste buğday ve arpa tarımı yaygındır. Sürekli bu bitkilerin yetiştirilmesi kök çürüklüğü hastalıklarında, yabancı ot sayılarında önemli artışlara neden olmakta, organik maddeyi azaltmakta ve toprağın besin maddesi dengesini bozmaktadır. Bunların sonucu sulu alanlarda buğday ve arpa verimlerinde düşüşler olmaktadır. Bu problemin çözüm yolu sulu tarım alanlarında farklı bitki türlerinin yetiştirilmesidir. Mısır bu alanlar için alternatif bir bitki olduğu için ekim nöbeti içerisine alınması önerilir.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Ereğli yolu üzeri 2. Km. PK: 125 42020 KONYA

+90 332 355 12 90 +90 332 355 12 88

www.arastirma.tarim.gov.tr/bahridagdas

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü

MISIR TARIMI



TOPRAK HAZIRLIĞI

Toprak sonbaharda tavında iken kulaklı pullukla 15-20 cm derinlikte işlenir. İlkbaharda kazayağı+tırmık kombinasyonu ile toprak kaymak bağlayıp, otlandığı zaman daha yüzlek (8-10 cm) sürüm ya da sürümler yapılır. Zorunlu olmadıkça toprağı parçalayarak işleyen aletler (diskaro gibi) kullanılmamalıdır.

Toprak havalandırıldıktan sonra tırmık çekilerek tarla ekime hazır hale getirilir. Eğer otlanma fazla değil ve kesekler dağılmış ise ilkbaharda sadece tırmık çekmek yeterlidir.

İlkbaharda toprak işlemesinin toprak tavında iken yapılmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Toprak fazla karıştırılıp tavı kaçırılmamalıdır.

EKİM ZAMANI

Konya ve benzeri yöreler için en uygun ekim zamanı olarak 25 nisan 20 mayıs tarihleri belirtilebilir. Bundan önce kesinlikle ekim yapılmamalıdır. Bu tarihten önce yapılacak ekimde ilkbahar son donları bitki ölümlerine sebep olabilir.

EKİM

Ekim mutlaka tavlı toprağa yapılmalıdır. Ekim derinliği 5-6 cm olmalıdır. Erken ekimlerde daha yüzlek, geç ekimlerde ise toprak yüzeyi kuru ve sıcaklık yüksek ise daha derin (en fazla 7.5 cm) ekim önerilir.

Bitki sıklığı çeşidin özelliği, toprağın verim gücü, sulama durumu ve yetiştirme amacına göre değişmektedir. Dane amaçlı üretimde sıra arası 70 cm, sıra üzeri mesafenin 20cm olması uygundur. Dekardaki bitki sayısı 6.000-7.000 adet olmalıdır. Buna göre kullanılacak tohum miktarı çeşidin bin dane ağırlığına göre değişmekle birlikte 1.5-3.0 kg arasındadır. Silaj amaçlı mısır üretiminde sıra arası 70 cm, sıra üzeri ise 13-15 cm olması ve dekara 11.000 bitki olması önerilir.

BAKIM

Mısıra verilecek gübre miktarı toprak ve iklim şartları, çeşit ve bitki sıklığına göre değişir. Melez çeşitlerde ekimle birlikte dekara 20 kg DAP, ikinci çapa ile birlikte 20-30 kg üre verilmelidir. Üre boğaz doldurma ekipmanları ile birlikte verilmesi önerilir.

Orta Anadolu şartlarında demir ve çinko gibi elementlerin eksikliğine sıkça rastlanmaktadır. Bu nedenle bitkilerin bu mikro element ihtiyacı karşılanmalıdır.

Mısırda iyi bir verimin sağlanması için bitkinin su ihtiyacının tam ve zamanında sağlanması gereklidir. Su ihtiyacı bakımından kritik dönemler çimlenme, çıkış, sapa kalkma, çiçeklenme ve dane dolum dönemleridir. Özellikle tepe püskülü çıkarmadan 5-6 gün önce ve süt olum devresinde yapılan sulamalar verimi önemli ölçüde artırmaktadır. Bitkilerin ilk sulama ihtiyaçları yağmurlama yöntemi ile karşılandıktan sonra boğaz doldurma ile birlikte damla sulamaya geçilmelidir.

Sulamalarda 60-80 cm'lik kök derinliğinin su ile doyurulması hedeflenmelidir. Aşırı su vermekten kaçınılmalı ve verilen su birkaç saat içinde çekmelidir.

Mısır bitkisi ilk dönemlerde yabancı otlara göre daha yavaş gelişmesi nedeniyle ot rekabetine hassas bir bitkidir.

Bu nedenle yabancı otun problem olduğu tarlalarda mekanik ve kimyasal mücadele yapılmalıdır.