

DOG OWNER HANDBOOK · 2026

养狗手册

与养猫手册同为五部分 25 章，为养狗场景重写。所有出处集中收进附录F/G/H，正文以 [n] 上标逐条可追；⚠ 标出犬与猫做法相反的关键处。

25 章 + 8 附录（知识库速查 / 宠物医院 / 毒物清单 / 急诊卡 / 勘误表 / 来源对照 / 差异说明 / 引用清单）

引用来源：默沙东兽医手册、WSAVA 2024、AAHA 2024、ACVIM、CVMA 团标与指南、GB/T 与 NY/T 标准、ASPCA

正文任何数字都可在附录H 找到出处；犬猫差异逐条列在附录G

附录B：全国宠物医院 24h 急诊与价格参考

权威数据已于 2026-10-01 逐条回查核对（见附录E）



关于这本手册

这本手册把犬的 25 个主题写成**可以直接照着做**的条目。犬的品种差异极大——体型能相差 60 倍，任何剂量与月龄都必须结合你家这只狗的具体情况。

全书分五个部分——**与狗共处、喂养、健康、购物清单、常见提问**，覆盖从选犬、行为训练、科学喂养，到急诊判断与日常照护。

💡 来源是怎么标：正文不再分成“底本”和“补充”两轨，读下来就是一本完整的手册；所有出处集中收进三个附录——**附录F** 逐章列出内容来源，**附录G** 逐条列出犬与猫的做法差异（**⚠️** 标出与猫相反的地方），**附录H** 是完整的引用来源清单。正文里凡出现 [n] 上标之处，点击即跳到附录H 对应条目。

关于配图

全书 **24 张插图**，全部为本手册原创绘制（暖色扁平插画风）。理由很简单：市面上的宠物配图大多是猫的，直接搬来会误导。每一张图都对应本章要讲的那个关键判断，而不是泛泛的“可爱狗狗图”。

犬与猫，最大的七个不同（先建立正确预期）

维度	猫	犬
驯化史	约 1 万年前自我驯化，独居猎手	约 1.5 万年以上，群体协作狩猎，被真正驯化
社交需求	独居动物，社交容忍度有限	群居动物，社交需求强 ，独处易分离焦虑
活动需求	短时爆发 + 高处观察	按品种差异极大 ：边牧/pointer 需要的运动量是巴哥的十倍
服从基础	无（靠利益与安全感）	有（有等级与协作基础） ，可做系统训练
口腔护理	牙周病、牙吸收病变高发	牙周病高发，但 咀嚼拖拽玩具能部分自洁
中暑风险	较耐热但会张口呼吸预警	犬耐热差得多 ，短头颅犬（巴哥、法斗、英斗）高危，犬主要靠喘气散热
核心疫苗	猫三联 + 狂犬	犬瘟/细小/腺病毒/副流感 + 狂犬； AAHA 2024 ^[4] 已将钩端螺旋体列为犬核心

使用前先看这三条

 **一、兽医面诊 > 指南共识 > 本手册。** 本手册不能替代诊断。犬的品种差异极大，任何剂量与月龄都必须结合你家这只狗的具体情况。

 **二、急诊不等天亮。** 犬的胃扭转（GDV）、中暑、误食都是分钟级的急症。附录D 列了红旗信号，背下来。

 **三、别信偏方。** 人用药（尤其对乙酰氨基酚、布洛芬）、“网红驱虫法”、大蒜驱虫、生鸡蛋“美毛”都是有害无益的。

全书速览

如果你刚接狗回家

先读第 1、3 章，把家改成“幼犬安全区”，并抓紧 3-14 周龄社会化窗口
预约首次体检，带上免疫本

如果你在纠结吃什么

第 6 章定主食框架，第 7 章看鲜食/生食的风险，第 8、9 章管零食与补剂
把钱花在主食上

如果你怕它生病

第 10-14 章：绝育、驱虫、疫苗、牙齿、常见症状
重点背下 GDV、中暑、误食的处置

如果你只想抄清单

直接跳第 15 章“新手狗家长购物清单”
第 16 章是到家 30 天日程

目录

第一部分 · 与狗共处

- 1 新手养狗30问
- 2 犬的行为与心理
- 3 幼犬到家注意事项
- 4 训练与建立感情
- 5 犬与人类的共生史

第二部分 · 喂养

- 6 狗粮
- 7 生骨肉与鲜食
- 8 零食
- 9 营养品

第三部分 · 健康

- 10 绝育
- 11 驱虫与心丝虫
- 12 疫苗
- 13 口腔与牙结石
- 14 呕吐、拉稀、外伤与中暑

第四部分 · 购物清单

- 15 新手狗家长购物清单
- 16 幼犬到家 30 天清单
- 17 养狗进阶好物

第五部分 · 常见提问

- 18 怎么给狗剪指甲、挤肛门腺？
- 19 夏天要给狗开空调么？
- 20 狗狗出远门：宠物托运
- 21 狗碗怎么选？
- 22 如何给狗狗拍出漂亮照片
- 23 狗狗掉毛多怎么办？
- 24 有狗家庭的植物与食物黑名单
- 25 拓展阅读：行为学、病理学

第一部分 · 与狗共处

养狗和养猫是两件事。这一部分先把预期校准。

1 新手养狗30问



配图 新手养狗：先把「体型、预算、时间」三笔账算清楚

一、我该养多大的狗？

体型	代表犬种	优点	需要想清楚
小型 (<10 kg)	泰迪、比熊、博美、吉娃娃、柯基	公寓友好、食量小、出行方便	需要更高的社会化强度，否则易吠叫、敏感； 外出需防大犬扑咬
中型 (10-25 kg)	柴犬、边牧、拉布拉多、柯基（偏中）、可卡	运动与陪伴平衡，训练性强	运动量需求高，每天需 1-2 小时
大型 / 超大 (>25 kg)	金毛、阿拉斯加、萨摩耶、罗威纳	性格多数稳定、陪伴感强	医疗、食物、洗护、寄养成本成倍上升 ；大型犬常见骨科问题，需要控制生长速度

💡 新手友好度排序（综合考虑训练性、体质、护理成本）：中华田园犬 ≈ 泰迪/比熊 > 金毛 > 拉布拉多 > 柴犬 > 边牧 > 短头颅犬种（巴哥/法斗）。**不建议新手**：有分离焦虑高发倾向的黏人犬种、需要大量专业训练的工作犬、短头颅犬（呼吸系统先天风险高）。

二、长期成本要算清楚

项目	小型犬	中大型犬
首年疫苗 + 体检 + 绝育	1500-4000 元	2500-6000 元
月度主粮	150-400 元	400-1200 元
月度驱虫	50-150 元	100-300 元
年度体检	300-800 元	500-1500 元
洗护美容（每月 1-2 次）	80-200 元/次	150-500 元/次
寄养（假期）	50-120 元/天	100-300 元/天
大型犬额外：髌肘关节评估、心脏彩超、麻醉费更高	—	单次 500-2000 元

三、30 个高频问题快答

问题	答案
狗一定要打疫苗吗？	核心疫苗强烈建议；狂犬在中国属强制免疫，办犬证必需。见第 12 章
幼犬多大可以接回家？	至少 8 周龄 。CVMA ^[8] 《动物福利友好繁育舍 ^[11] （犬）评价规范》明确：8 周龄以下、未断奶的犬不宜出售
狗必须绝育吗？	强烈建议，但 大型犬的月龄需与兽医商量 （涉及骨骼发育）。见第 10 章
小狗刚到家可以洗澡吗？	不建议 。到家 7 天内不洗澡，脏了用宠物湿巾擦
狗可以吃猫粮吗？	不可以长期吃。猫粮蛋白脂肪过高，犬长期吃易胰腺炎、肥胖；且猫粮含牛磺酸非犬所需。 应急一两顿可以，长期不行
猫可以吃狗粮吗？	绝对不可以 。狗粮缺牛磺酸，猫长期吃会致心肌病与失明
狗能吃骨头吗？	只能给生骨头 ，且大小合适。 熟骨头绝对禁止 （易碎成尖片刺穿肠道）
狗吃草是病吗？	多数是正常行为（好奇、纤维需求、轻微胃不适）。若频繁且伴随呕吐，需就诊
狗一天要遛几次？	至少 2 次；中型犬以上每天需 1-2 小时有效运动（含嗅闻与奔跑）
狗能憋尿多久？	成年犬 6-8 小时为宜； 幼犬月龄 + 1 小时 为上限（3 月龄约 4 小时）
狗必须办犬证吗？	多数城市要求办证并接种狂犬疫苗，否则可能被处罚
小狗咬手怎么办？	那不是“凶”，是 缺乏咬合抑制训练 + 把手当玩具 。见第 4 章
狗需要刷牙吗？	需要，越早越好。见第 13 章
狗怕热还是怕冷？	犬普遍怕热 ，散热靠喘气，效率低。短头颅犬高危。见第 19 章
狗能吃人的饭吗？	不建议。高盐高油，且葱蒜洋葱、葡萄、木糖醇对犬有毒
狗鼻子干是病吗？	不是。睡觉后鼻头干正常；配合精神差、食欲差才需注意
狗发抖是什么原因？	冷、紧张/害怕、疼痛、低血糖（幼犬）、神经系统问题。结合场景判断，持续发抖就医
公狗也会得乳腺肿瘤吗？	会，但概率远低于母犬
狗老了会怎样？	7 岁（大型犬）/8 岁（小型犬）进入老年期，需半年一次体检，关注肾、心、关节、牙齿、认知
狗能一直吃幼犬粮吗？	不建议。幼犬粮能量与钙磷高，成年后长期吃易肥胖与关节负担
狗拉稀能自己好么？	轻微软便 1-2 次可观察； 水样便 + 精神差 + 呕吐需就医
狗可以吃生鸡蛋吗？	不建议。生蛋清含抗生物素蛋白，长期吃致生物素缺乏；且有沙门氏菌风险
狗能吃胡萝卜吗？	可以， 熟制或切小块生喂 ，是很好的低热量零食
狗需要剪指甲吗？	需要，每 3-4 周一次。见第 18 章
狗有分离焦虑怎么办？	见第 4 章： 逐步脱敏 + 独处训练 ，严重者需行为兽医介入

问题	答案
狗能坐电梯/进商场吗？	按各地规定与场所要求；出行建议用航空箱或抱在怀里
狗需要挤肛门腺吗？	多数狗排便时能自行排出。 不要常规去挤 ，摩擦过度反而会致炎症。见第 18 章
狗可以喂牛奶吗？	多数成年犬乳糖不耐，易腹泻。可用宠物羊奶粉替代
小狗什么时候可以出门？	打完第 2 针后 可以在“不接触其他犬”的安全地面活动；完成全部基础免疫（≥16 周龄）后再去犬多的地方
狗狗多大算成年？	小型犬约 10–12 月龄，大型犬 18–24 月龄

✅ **幼犬 3–14 周龄是“社会化窗口期”**，这是犬与猫最根本的区别之一。在这个窗口内接触过的人、环境、声音、其他动物的种类，会决定它一生的胆量。**但此时疫苗尚未完成**——正确做法是“抱着出门、坐车、听声音、见人”，而不是“关在家里什么也不接触”。见第 4 章。


四、30 问的犬版答案

#	问题	犬的答案（与猫逐条对照）
1	好养吗？	犬投入的精力远高于猫。犬是群居动物，需要每天 2 次外出、1-2 小时有效运动、持续的陪伴与训练。养狗不是“养个伴”，是一份每天都要兑现的遛狗承诺。
2	一个月要花多少钱？	小型犬约 300–700 元/月；中大型犬 800–2000 元/月（含主粮、驱虫、洗护摊销）。约为猫的 2–5 倍，主要差在运动、洗护与体型带来的医疗成本。
3	可以活多久？	小型犬 12–16 岁，中型 10–14 岁，大型 8–12 岁，超大型常不到 10 岁。⚠️ 与猫相反：犬的体型越大，寿命越短。
4	要绝育吗？	建议绝育，但 ⚠️ 时机必须与兽医商定（尤其大型犬，涉及骨骼发育闭合与部分肿瘤风险权衡）。不要照搬猫的“尽早绝育”。
5	绝育手术危险么？	常规手术，技术成熟。⚠️ 但短头颅犬种（巴哥、法斗、英斗）麻醉风险显著高于普通犬，术前必须做麻醉评估。
6	会长多重？	⚠️ 没有统一答案：从吉娃娃 1.5 kg 到马士提夫 90 kg，跨度是猫的十几倍。体重管理一律以 BCS 体况评分 + 品种标准 为准。
7	一天吃几顿？	幼犬 3–4 顿，成犬 2 顿。⚠️ 犬不能“放一周粮自助”——犬会暴食，且大型犬深胸品种有胃扭转（GDV）致命风险，必须定时定量、餐后 1 小时不剧烈运动。
8	吃鱼油会毛发好吗？	全价犬粮已配平，无需额外补。但 ⚠️ 与猫不同：Ω-3（EPA/DHA）对犬的关节炎、肾脏病、皮肤过敏有较明确的循证支持，这些情况下属于“该补”。
9	要刷牙吗？	⚠️ 必须，且比猫更重要——3 岁前约 80% 的犬已有牙周病（猫约 70%）。好消息是：犬通常比猫配合得多。
10	要洗澡吗？	⚠️ 与猫完全相反：猫可以几个月不洗，犬建议 2–4 周一次。犬皮脂分泌旺盛、体味重，且会滚脏东西。
11	每天睡多久？	成年犬 12–14 小时，幼犬可达 18–20 小时。老年犬睡眠更碎片化。
12	睡哪里？	⚠️ 犬的安全感来自主人，但同样需要固定的犬窝——这是学独处、建立规则的基础。可上床睡，但要由你决定规则，且从第一天就固定。
13	需要“遛”吗？	⚠️ 必须，这是猫与狗最大的日常差别。犬每天至少 2 次外出，中型犬以上需 1-2 小时有效运动，且嗅闻本身就是运动。
14	出门怎么办？	牵引绳是底线（多数城市强制）。远行用航空箱或车载安全带固定，⚠️ 绝不能让犬在车内自由活动。
15	只养一只会孤独吗？	⚠️ 会，与猫正好相反。犬是群居动物，长期独处易发展为分离焦虑（拆家、狂吠、随地排泄）。要么有人陪，要么从幼犬期开始做独处训练。
16	出门几天，狗在家可以吗？	⚠️ 不可以。犬不能像猫一样独留家中数日——必须寄养或安排上门喂养，且每天至少 2 次外出。
17	要封窗吗？	犬坠楼风险低于猫，但高层仍需防护。⚠️ 犬的真实风险是从阳台/敞开的车门窜出，因此重点在阳台防护与牵引固定。
18	有什么不能吃？	巧克力（可可碱）、葡萄与葡萄干、木糖醇、洋葱大蒜、澳洲坚果、酒精、熟骨头（易碎成尖片刺穿肠道）。详见附录C。

#	问题	犬的答案（与猫逐条对照）
19	会冷会热么？	会。⚠️ 犬显著怕热——犬靠喘气散热，效率极低，短头颅犬与双层毛犬种高危。夏季遛狗避开 10:00–17:00，地面温度会烫伤肉垫。
20	会生病吗？	会。⚠️ 犬的急症清单与猫不同：胃扭转、中暑、急性胰腺炎、异物梗阻排在前面。详见附录D。
21	喜欢猫吗？能融洽相处吗？	犬的捕猎驱动可能被小动物触发，尤以猎犬/梗犬类明显。需要训练 + 全程看护。⚠️ 永远不要让犬与猫单独相处，除非已长期确认安全。
22	会认主人吗？	⚠️ 会，而且很明确。犬有群体结构，会建立清晰的依恋对象与人际排序。这与猫“人类是平等朋友”的关系模型根本不同。
23	从多大开始养比较好？	⚠️ 8 周龄以上即可（CVMA 繁育福利规范：8 周龄以下不宜出售）。3–16 周是犬的社会化窗口期，比猫的 2–8 周更长、影响面更广（人、犬、环境、声音、地面材质）。
24	为什么它总跟着我，却不让我抱？	⚠️ 与猫相反：多数犬其实喜欢被抱。若抗拒，优先排除疼痛（大型犬的腕肘关节问题、脊柱问题），而不是“性格问题”。
25	养狗人每天要做哪些事？	⚠️ 遛 2 次 + 喂 2 次 + 梳毛 + 刷牙 + 陪伴训练。日常投入约为猫的 3–5 倍。
26	掉毛吗？	掉。⚠️ 分两类：双层毛犬种（哈士奇、金毛、柯基）一年两次大换毛，量极大；常年掉毛型（拉布拉多、比熊掉毛少但需定期美容）。
27	住单间能养吗？	可以，但 ⚠️ 仅限小型犬，且必须保证每天户外运动。中大型犬在单间长期居住易出现行为问题。
28	什么品种温顺？	⚠️ 品种只决定概率，不决定个体。且犬的品种间差异（体型、驱动、攻击性、运动需求）远大于猫——选犬要先匹配生活方式，再看品种。
29	性格会变么？	会。⚠️ 但社会化窗口期（3–16 周）对犬一生的影响，比猫大得多；幼犬期缺失的经历很难在成年后补回。
30	会死么？	会。犬的寿命普遍短于猫，大型犬常不到 12 年。同样一句“埋下一颗十几年后的悲伤种子”，在犬身上更短、更急。

✅ 怎么用这张表：是猫的答案，右边是犬的答案。两者一致的地方（封窗、看疫苗本、及时就医）直接照做；带 ⚠️ 的地方必须按犬的版本执行——尤其是第 7（喂食）、15/16（独处）、19（怕热）、23（社会化窗口）这几条，照搬猫的做法会出事。

2 犬的行为与心理



配图 犬的安定信号：读懂身体语言，比大声制止有效得多

犬是群居的协作猎手，它的行为逻辑是“这段关系里我的位置是什么”，这与猫的“这个环境对我安全吗”完全不同。

一、读懂身体语言

信号	含义	你该做什么
尾巴自然下垂、缓慢摆动	放松、友好	可以正常互动
尾巴高举快速摆动	高度兴奋/警觉（不一定是开心）	先观察，避免直接扑抱
尾巴夹在腹下	恐惧、顺从、不安	降低音量、给退路、不要逼近
身体僵硬、重心前移、闭嘴盯视	警告信号，攻击前兆	立刻停止接近，慢慢后退，不要对视
露齿 + 低吼 + 背毛竖立	明确警告	停止一切动作，不要惩罚（惩罚会跳过警告直接咬）
舔鼻、打哈欠、扭头、缓慢眨眼	安定信号（Calming Signals）	它在说“我不想冲突”，你也应该缓和
肚皮朝上	可能是顺从，也可能是恐惧性示弱	看整体姿态，不要一律当“求抚摸”
邀玩姿势（前肢趴地、臀部翘起）	邀请玩耍	可以回应

💡 **低吼是好事**：它是犬的“警告系统”。惩罚低吼会导致犬跳过警告直接咬人，这是行为学上最危险的操作之一。正确做法是**移除压力源**，然后针对性训练。

二、犬的五个核心需求

- 1. **运动**：按品种差异极大。边牧、哈士奇等工作犬每天需要 2 小时以上的高强度运动 + 脑力消耗；巴哥、法斗则需严格控制运动强度（短头颅犬易中暑）。
- 2. **嗅闻**：**15 分钟的“自由嗅闻散步”≈ 1 小时的快走**（在脑力消耗上）。对犬来说，“闻”就是“读新闻”。
- 3. **社交**：犬是群居动物，长期独处是分离焦虑的主因。
- 4. **可预期**：固定作息（吃饭、遛狗、睡觉的时间）能显著降低焦虑。
- 5. **有边界**：不是“凶”，而是清晰一致的规则。规则不清比规则严格更让犬焦虑。

三、五个最常见的“问题行为”

行为	常见根因	解法
拆家/咬坏东西	运动与脑力不足、分离焦虑、换牙期（3-7 月龄）	增加运动与嗅闻游戏；提供合适的啃咬玩具（KONG 塞冻干）； 不要事后惩罚 （犬无法把几小时前的行为与惩罚关联）
吠叫不止	警戒、无聊、分离焦虑、求关注	区分类型：警戒吠叫要做“看门 → 回窝”训练；无聊要增加运动； 绝不能靠吼回去 ，那等于一起吠
拉拽牵引绳	缺乏松绳行走训练	停走法 ：一拽就停，绳松才前进。从家里开始练，再过渡到户外
扑人	打招呼的犬类礼节（但人不喜欢）	忽略 + 转身 ：扑上来时转身不给关注，四脚着地才给抚摸与零食
随地大小便	幼犬膀胱控制未成熟、作息没建立、疾病	定时带出 （吃后 5-20 分钟、睡醒后、玩后）；成功立刻奖励； 错误现场不要打 ，要用酶类清洁剂彻底去味

⚠️ **分离焦虑的边界**：轻度（哼叫、门口踱步）可用逐步脱敏训练；重度（持续嚎叫、自伤、破坏门窗、失禁）需要兽医行为学专科介入，可能配合药物。这不是“惯的”，是真实的焦虑障碍。

四、犬与猫的七个根本差异

对猫给出的很多结论，放到犬身上**正好反过来**。这一张表是全书最重要的一页。

狗狗的安全感来自主人。猫咪的安全感来自环境。——内容底本

⚠️ 所以：犬到新家需要的是**你**；猫到新家需要的是一个**可躲的空间**。

猫咪是独居动物，独自生活也能自得其乐。

⚠️ 所以：犬是群居动物，**独处是需要训练的**，不是天生就会。

猫咪在 2-8 周是否接受过人类的抚摸和照顾，将决定它们终生对人类的观感。

⚠️ 犬的窗口更长：**3-16 周**，且内容更多——见过的人、犬、声音、地面、被触碰的部位（耳朵、爪子、嘴）。

想训练猫咪通常不会成功，它能理解但懒得配合。

⚠️ 犬恰好相反：**犬是地球上最可训练的动物之一**。训练犬不是“能不能”，而是“你用不用正向强化”。

在猫咪心中，人类不是主人，而是好朋友，它们和人相处很平等。

⚠️ 犬会明确建立依恋对象与秩序。这不是“服从训练”的借口，但确实意味着**规则对犬是安全感，而不是压迫**。

给它碗里放一整周的猫粮就好。

⚠️ 犬绝对不能这样喂：会暴食，且大型犬深胸品种有**胃扭转（GDV）**致死风险。**犬必须定时定量**。

前爪长得快，每周都要剪一次；后爪长得慢，可以 2-3 周剪一次。

⚠️ 犬的指甲更长更硬，**每 3-4 周剪一次**即可；剪得过勤反而容易伤到甲床，且犬的趾部对疼痛更敏感。

3 幼犬到家注意事项



配图 幼犬到家：先给一个「小空间」，不要一上来就全屋放风

一、到家前：把家改成“幼犬安全区”

区域	必做	为什么
电线/数据线	全部收进线槽或用理线管包好	幼犬换牙期啃咬欲望强，电击伤可致肺水肿
地面小物	拖鞋、袜子、药片、电池、橡皮筋、硬币全部收起	犬的肠梗阻手术里，袜子与玩具碎片是常客
阳台/窗户	全部封网 （金刚网或防护网）	高层坠楼在幼犬期高发
垃圾桶	换成带盖且犬打不开的	厨余（尤其熟骨头、洋葱、葡萄）是中毒高发源
室内植物	按附录C 清单清理	百合、绿萝、夹竹桃、苏铁等对犬有害
爬楼梯	幼犬期 尽量抱上抱下	幼犬髌关节发育未完成，反复上下楼梯会增加关节疾病风险（尤其大型犬）
围栏/围栏门	设置安全区（围栏 + 尿垫区 + 窝）	既能限制破坏，也让幼犬有安全感

二、到家第 1-14 天日程

时间	做什么	不要做什么
第 1 天	限缩在围栏/一个房间；用前主人给的粮；安静休息	不要全屋放开、不要洗澡、不要带去遛（未完成免疫）
第 2-3 天	建立固定地点如厕；观察进食饮水与排便	不要频繁抱来抱去
第 4-7 天	约首次体检（体检 + 粪检 + 传染病快检 + 驱虫）	不要在体检前换粮或叠加驱虫
第 8-14 天	抱着出门做社会化（见第 4 章）；按免疫程序补疫苗	不要把幼犬放到公共地面（未完成免疫前）

三、第一周必须盯的五件事

有进食

有饮水

有排尿

有成形排便

精神状态有清醒期

眼鼻无脓性分泌物

体温正常（37.5-39.2 °C）

 **幼犬不吃、精神差、呕吐腹泻，是急症。**幼犬体液储备极少，脱水与低血糖可在数小时内进展到休克。**不要在家观察 24 小时，直接去医院。**

四、家里已有其他宠物

1. **先隔离 7-14 天**，各自完成体检与驱虫。
2. **气味交换**：用毛巾擦拭后互换给对方闻。
3. **隔栏见面**：两边同时喂食或玩耍，建立正面联想。
4. **短时共处**：全程有人看护，观察是否僵住、盯视、低吼（有则退回上一步）。
5. **注意**：成年猫需要真正的“避难所”（高处、可全身而退的通道）；**犬与猫同住，永远不要让犬单独与猫相处。**

五、头 48 小时怎么做

与一致的部分（可直接照做）

- 到家前先**封窗/封阳台**，并把电线、药品、小物件收好。
- 到家第一天**不要激烈互动**，先让它吃饱、喝水、睡一觉。
- 用**引导**把它带到排泄点，而不是按住它训斥。
- 家中曾养过病犬的，必须消毒——**犬瘟、细小**在环境中可存活数月¹到一年。
- 出门/回家看**疫苗本**，并核对免疫记录是否可查。

与相反的部分（⚠ 犬的专属要点）

1. ⚠ **破冰方式不同**：猫可以“不去打扰它”；幼犬需要你**主动**、但温和地建立联系——因为它的安全感来自你。完全不理睬，对犬是压力而不是安慰。
2. ⚠ **第一晚安排**：幼犬建议**睡在能看到你的地方**（笼子或围栏放在卧室旁），硬关在远处房间会显著加重分离焦虑。这是与猫相反的。
3. ⚠ **排泄引导从第一天开始并且高频**：幼犬憋尿能力约等于“月龄 + 1 小时”。饭后、睡醒、玩耍后立刻带出去，成功当场奖励。
4. ⚠ **不要抱出门“见世面”就以为完成了社会化**：3-16 周内需要的是在**安全地面的真实体验**（不同地面、声音、人、温和的犬）。
5. ⚠ **不能自助喂食**。固定餐次、固定地点，并观察每顿吃了多少——这是你发现疾病最早、最可靠的一个信号。

与同一个底层原则

无论是猫还是犬，**别把“互动”当成奖励自己的方式**。每一次你主动伸手，都应该是安全、可预期、有回报的——这点说得对：日久见人心，谁对它好，它心里清楚。

4 训练与建立感情

犬是世界上唯一可以稳定接受人类指令的非人动物。训练不是“管教”，而是你与它之间的**沟通方式**。

一、黄金窗口：3-14 周龄社会化

- **社会化窗口期内**（约 3-14 周龄，可持续到 16-18 周）接触过的东西，会被犬视为“正常”；接触不到的，成年后可能一辈子恐惧。
- **要接触**：不同性别/年龄的人（尤其戴帽、骑车的、推车的）、雨伞、气球、塑料袋、各种地面（瓷砖/金属/木地板/草地）、吸尘器、门铃、汽车声、洗衣机声、电梯。
- **正确做法**：疫苗完成前**抱着出门**、坐车兜风、坐在车里看世界，不要落到公共地面。家中播放环境音效做脱敏。
- **原则**：每次新体验都要**让它觉得是好事**（给零食），而不是“硬塞体验”。一次惊吓可能抵消十次好体验。



配图 社会化窗口期是犬一生中最贵的几周（约 3-16 周龄）。疫苗没打完不等于“关在家里四个月”——抱着出门、坐在车里看世界、在自家院子活动、只接触已知健康且已完成免疫的成犬，都是安全的。窗口期内缺什么，成年后就要用几倍的训练去补。

二、必学的五个基础指令

指令	作用	训练要点
坐下	一切行为的基础，用于控制冲动	零食从鼻尖向头顶上方引导；臀部落地瞬间标记（“好”或响片）+ 奖励
过来（召回）	保命技能，最重要	永远不要惩罚回到你身边的犬。每次召回都给高价值奖励；先在无干扰环境练到 100% 再加难度
等待/别动	防止冲门、冲车	从 1 秒开始，逐步延长；练习场景：开门、放粮碗、过马路
放下	防止误食、抢东西	用“交换”而不是硬抢——给一块更好的零食换取嘴里的东西
牵引绳松绳行走	日常幸福感的关键	停走法 + 变换方向；绝不要用伸缩绳教松绳行走（它奖励“拉”）



配图 训练的本质是“**标记 + 奖励**”：行为发生的 0.5–1 秒内给出标记（“好”或响片），紧接着给奖励。犬不需要被管教，它需要的是清楚地知道你要什么、以及做对了会得到什么。这也是犬可以训练、而猫很难被“命令”的根本原因。

三、奖励与惩罚的正确用法

- **奖励时机**：行为发生后 **0.5–1 秒内**。晚了犬不知道你在奖励什么。
- **奖励等级**：日常干粮 = 一般；冻干/鸡肉 = 高价值；**高价值奖励只用在关键指令（召回、陌生环境）**。
- **不要惩罚**：事后惩罚无效；体罚会破坏信任、诱发恐惧性攻击。代替惩罚的是“**拿走资源 + 引导正确行为**”。
- **一致性**：全家用同一套口令与规则。爸爸允许上沙发、妈妈不允许，是行为问题最常见的成因。

四、咬合抑制：幼犬咬手的正确处理

1. **先理解**：幼犬咬手是正常的探索与游戏行为，不是攻击。**关键是教“力度”，而不是“不许咬”**。
2. **方法一（轻咬）**：被咬时发出短促高音“哎”，立刻收回手并**停止互动 10 秒**。反复几次，犬会学会“咬重了 = 游戏结束”。
3. **方法二（重咬或兴奋度高）**：立刻结束游戏并离开房间，让「咬人」与「失去你」建立关联。
4. **替代方案**：手里永远有一个合法啃咬物（玩具/咬胶），它咬手就把玩具塞过去，咬玩具时大力表扬。
5. **绝不要**：打嘴、捏嘴、把手塞进喉咙、大声吼叫。这些会让犬把手与疼痛关联，长大后可能发展为**手靠近就防御性咬人**。

✅ 每天 10 分钟训练，胜过周末一次 1 小时。训练对犬来说就是工作与游戏，是精力消耗的一部分——一只被训练过的犬，比一只没被训练的犬更安静、更不容易拆家。

五、抚摸、互动与训练

抚摸：与猫相反，犬大多喜欢肚子和爪子

- ⚠️ 猫：嘴巴以外的雷区是肚皮、尾巴、爪子。明确写“很多猫咪被摸肚子第一反应就是咬你一口”。
- ⚠️ 犬：多数犬喜欢被摸肚皮、揉耳根、挠胸口——尤其在你蹲低、侧身、不俯视它的姿势下。
- 共通安全区：耳根后、下巴、胸口、背部（顺着毛流）。
- 共通铁律：任何动物在进食、睡觉、护着玩具时都不要去摸，这是被咬的头号场景。

互动：“让猫更爱你”的 11 条，犬的版本

- 手心喂食 → 对犬同样有效，且是建立“你 = 资源分配者”最快的方式，也是训练的起点（零食奖励）。
- 抚摸它挠不到的地方 → 犬同样适用；顺带做全身脱敏抚摸（摸耳朵、爪子、尾巴、张嘴看牙），将来体检、剪指甲、刷牙会省一半力气。
- 踩奶 → 犬无此行为。犬的对应是贴靠（leaning）：身体重量压在你腿上，是犬表达信任与依恋的方式。
- 剪指甲 → ⚠️ 犬每 3-4 周一次（猫前爪每周）。犬的指甲更长更硬，且长期不剪会导致趾部变形、走路疼痛。
- 偏袒原住民 → 引入新犬/新猫时同样成立：⚠️ 但犬的次序感更强，必须明确谁是“先来的”，否则易打架。
- 每天玩一会儿 → 对犬不是“一会儿”，是 1-2 小时。且“嗅闻散步”和“奔跑”要分开安排。
- 零食拉近感情 → 对犬就是训练零食。⚠️ 但零食热量要计入日粮，肥胖是犬最常见的问题之一。
- 语言沟通 → ⚠️ 与猫不同：犬能学会大量词汇与口令。关键不是“说得多”，而是口令一致、全家统一、当下奖励。
- 平起平坐 → 对犬同样是信任信号。避免长时间俯视、按压头部——这在犬语里是压制。
- 朝它闭眼 → 犬不吃这套（那是猫语）。犬的对应是避免长时间直视，⚠️ 直视在某些犬身上会被读作挑战。
- 让它来你腿上/上床 → 犬更会主动索取身体接触。⚠️ 但要由你设定“什么时候可以”，否则会演变成推挤、护窝。

“差的行为”，在犬身上更严重

5 犬与人类的共生史



配图 从篝火旁的狼，到沙发上的家人

犬是人类最早驯化的动物。这段历史解释了为什么犬能理解人的手势、表情，甚至能分辨人的情绪。

一、时间线

时期	关键事件	对今天的意义
约 2-4 万年前	欧亚大陆的灰狼亚群开始靠近人类营地，利用人类剩余食物	犬是与人类最“老”的伙伴，早于农业、早于家畜
约 1.5 万年前	出现形态明确的家犬遗骸（德国波恩-奥伯卡塞尔等）	驯化不是“人抓了狼来养”，而更可能是双向选择
新石器时代—古代	犬分化出狩猎、护卫、牧羊、拉雪橇等功能	品种的多样性来自功能需求，而非审美
19 世纪	维多利亚时代兴起犬展与品种登记，品种逐渐被“标准化”	近百年的人工选育是很多遗传病的根源
近 30 年	分子生物学确认：现代家犬全部源自灰狼	犬与狼基因差异不到 0.2%，却行为分化极大

二、这段历史对养狗人的三个启示

1. 犬天生能读懂人。研究显示，犬能跟随人的指向、注视方向甚至眼神；这种能力在狼身上基本不存在，是驯化过程中被共同“选择”出来的。这意味着：你的手势、语气、身体姿态，比你喊的口令更重要。

2. 犬的社交逻辑来自狼群，但不是“争首领”。现代行为学已基本放弃“阿尔法狼/支配理论”——真实狼群是以繁殖对为核心的家族。所以“压制它、当老大”是错误的训练观，正确方向是“清晰规则 + 可靠奖励”。
3. 品种是可预期的倾向，不是命运。边牧有牧羊本能、猎犬有嗅猎冲动，这些是长期选育的结果；但具体行为仍大量取决于个体经历与社会化。买狗前研究品种，是有责任心的表现。

💡 一个实用推论：犬的“破坏行为”里，很大一部分是未被满足的工作本能。猎犬需要嗅闻、牧羊犬需要追逐、雪橇犬需要奔跑。如果你选了工作犬种却住在公寓，必须用运动 + 嗅闻游戏 + 训练去补足这部分需求，否则问题行为会一直出现。

第二部分 · 喂养

犬是杂食偏肉食（facultative carnivore），与猫的“绝对肉食”不同——这意味着更灵活，也更容易被喂错。

6 狗粮

一、犬的营养需求

犬在演化中保留了消化淀粉的能力（与狼相比，犬的淀粉酶基因拷贝数显著更多），因此是“偏肉食的杂食动物”。这意味着碳水可以吃，但不代表高碳水好。

阶段	粗蛋白（干基）	粗脂肪	关键
幼犬 / 生长发育期	≥22%–28%	8%–17%	钙磷比严格 1.2–1.4:1；大型犬幼犬需控制能量密度与钙摄入，防骨骼畸形
成犬（普通活动量）	≥18%–25%	9%–15%	按活动量调整
成犬（高活动/工作犬）	≥25%–30%	15%–20%	拉雪橇、追猎等工作犬
老年犬	≥18%（老年犬不应盲目降蛋白）	8%–12%	关注肾指标；蛋白质量比数量重要
减重犬	≥20%	低脂	减重靠控制总热量 + 增加纤维，不是靠减蛋白

二、怎么读配方表

1. 看前 3–5 位原料：应为明确动物蛋白（鲜鸡肉、鸡肉粉、脱水羊肉），而不是“谷物”“玉米”“小麦”打头。
2. 看是否有明确标注比例：如“鲜鸡肉 26%、脱水鸡肉 15%”。只写“肉类及其制品”是不透明的。
3. 看是否满足 AAFCO / 欧盟 FEDIAF 全价营养标准：包装上标注“全价”且有标准号，比“天然”“无谷”这类词重要得多。

- 4. **大型犬幼犬必看：**钙含量与能量密度。**过量补钙会显著增加骨软骨病（OCD）与髌关节发育不良风险——这是大型犬喂养中最常见的错误。**
- 5. **不要迷信“无谷”：**犬的谷物过敏很少见；真实过敏原多为动物蛋白（牛肉、鸡肉、乳制品、小麦偶见）。无谷粮用豆类替代，有研究提示与犬扩张型心肌病（DCM）存在关联争议，选择时优先看是否有**牛磺酸/左旋肉碱添加 + AAFCO 认证**。

类型	优点	缺点
膨化干粮	方便、经济、耐存、有一定洁齿作用	含水量低（约 10%）
湿粮/罐头	含水量 75%+，适口性好，有利泌尿与老年犬	贵，开封需冷藏
冻干（复水）	接近生鲜营养、适口性好	贵； 必须正确复水 ，干喂有呛噎风险
鲜食/自制	可控、新鲜	极易营养失衡，必须有兽医营养师配方
处方粮	针对肾病、结石、过敏、糖尿病等	必须经兽医诊断后使用

三、喂多少、喂几次

- **按体况评分（BCS），不按包装建议。**包装建议常偏高，先按 80% 起，每 2 周评估一次腰线 & 肋骨。
- **幼犬：**2–3 月龄每天 4 餐；3–6 月龄 3 餐；6 月龄后 2 餐。**幼犬不可自由采食**（易肥胖，大型犬尤其危险）。
- **成犬：**每天 2 餐定时定量，15–20 分钟收碗。
- **老年犬：**2 餐，若食欲下降可改 3 餐少量。
- **换粮 7 日法：**第 1–2 天 25%、3–4 天 50%、5–6 天 75%、第 7 天全换。（CVMA ^[8]《动物福利友好繁育舍 ^[11]（犬）评价规范》亦推荐 7 日换粮过渡法）


 **这些喂法必须停止：**① **熟骨头**（尤其禽类，易碎成尖片穿孔）；② **含木糖醇的食物**（无糖口香糖、部分花生酱，可致急性低血糖与肝衰竭）；③ **葡萄/葡萄干**（无安全剂量，可致急性肾衰）；④ **洋葱/大蒜/葱**（溶血性贫血，加热不破坏毒性）；⑤ **巧克力**（可可碱）；⑥ **高脂剩饭/肥肉**（急性胰腺炎，这是犬最常见的急诊之一）。详细剂量见附录C。

 **胰腺炎是喂出来的病：**突发剧烈腹痛（弓背、拒绝被摸肚子）、反复呕吐、精神沉郁，常见于“过年吃了顿大餐”之后。**高脂饮食是首要诱因**，且复发率很高。

四、狗粮 19 问逐条详解

#	问题（猫）	犬的答案（与猫逐条对照）
1	要吃猫粮吗？老一辈说，吃剩饭也行。	犬比猫能忍剩饭——犬是 杂食动物 ，对淀粉的消化能力远强于猫。但“能吃”≠“该吃”：长期剩饭会盐分/油脂超标、钙磷失衡、蛋白不足。犬可以用 全价犬粮 ，也可以吃 科学配比的鲜食 ；剩饭不是方案。
2	只给猫吃肉行么？	⚠️ 犬更耐纯肉，但只喂纯肉同样会出问题（钙磷失衡、营养性继发甲状旁腺亢进）。与猫不同的是，犬对 牛磺酸 不是必需（犬可自行合成），所以缺牛磺酸的风险远小于猫。但钙不足这条，犬一样中招。
3	只能吃猫粮吗？（三种喂养方式）	犬同样有 干粮 / 主食罐 / 鲜食（含生骨肉） 三条路。⚠️ 但犬的湿粮占比可以更低——犬喝水比猫主动，泌尿系统对干粮的耐受性远好于猫。
4	三种喂养方式哪种最好？	⚠️ 结论对犬不完全成立 。猫“生骨肉最好”是因为猫是绝对肉食动物；犬是杂食动物， 优质全价犬粮 + 适量鲜食 就能达到最佳状态。盲目上生骨肉对犬的额外风险是： 细菌污染 + 骨片穿孔 + 大型犬营养失衡更快显现 。主食罐头对犬的价格倍率同样约 3–5 倍，但 保存时间短 这点对大型犬尤其不划算（吃得多）。
5	只吃狗粮，狗会腻么？	⚠️ 犬比猫更容易“挑食” ——因为犬的嗅觉更发达、学习能力更强，一旦发现“拒食能换来更好吃的”，就会固化行为。所以犬的“腻”往往是 被训练出来的 ，而不是生理性厌食。对策：定时定量、15 分钟收碗、不因拒食而加料。
6	狗爱吃的狗粮，就是好狗粮么？	与猫同理：适口性只是一部分。 适口性极好的粮往往靠油脂与诱食剂 ，对犬的直接后果是软便与肥胖。
7	怎么判断一款狗粮是好了还是坏？	犬与猫的判断框架相同，但数值不同：① 看完整 营养充足性声明 （符合 AAFCO/NRC 全价标准）；② 成犬干基粗蛋白一般 ≥22–25% （不是猫的 26–35%）；③ 原料前几位应为明确动物蛋白；④ ⚠️ 大型犬幼犬必须看钙含量 （约 1.0–1.8% 干基、钙磷比 1.2–1.4:1）——钙过量会直接导致 骨软骨病与髌关节发育异常 ，这是犬特有的坑。
8	“某犬种专用粮”“肠胃专用粮”是怎么回事？	⚠️ 与猫不同，犬的 体型相关配方有真实科学依据 ：大型犬幼犬粮（控钙、控能量密度）与小型犬粮（颗粒大小、能量密度）是 有意义的 。但“某犬种专用粮”（如“金毛专用”“泰迪专用”） 基本是营销 。区分方法：看它改的是 钙/能量/颗粒 （真实），还是只改了个名字和包装（营销）。
9	鸡肉配方好，还是鱼肉配方好？	与猫一致： 鸡肉性价比与低敏性更优 。⚠️ 但犬对鱼类的过敏率比猫更低，且犬对 Omega-3 的需求更明确 （关节炎、皮肤病、肾病有循证获益），所以 含鱼油的犬粮是有实际价值的 ，与猫“海鱼配方纯属营销”的结论不同。
10	稀有肉源好不好？	与猫一致： 营销为主 。⚠️ 但犬有一个真实例外： 新型单一蛋白（novel protein）处方粮 （如鹿肉、袋鼠肉、水解蛋白）用于 食物过敏的诊断与治疗 ，这是有循证依据的。日常粮里的“稀有肉”仍是噱头。
11	进口粮好，还是国产粮好？	与猫一致：国产上限高、价格划算；进口下限高、标准严。⚠️ 犬的额外考虑： 大型犬吃得更多，单位成本敏感度是猫的 5–10 倍 ，选粮时“每千卡价格”比“每公斤价格”更重要。
12	粗蛋白含量高好，还是低一点好？	⚠️ 犬的数值带与猫不同：成犬 AAFCO 最低粗蛋白 18% （干基），常规好粮在 22–30% 。犬做到 35% 以上多是 运动犬/工作犬需求 ，普通家庭犬长期高蛋白会加重肾脏负担（尤其已有肾病时）。猫的 “35% 才是有料好粮” 不能直接套到犬身上。
13	为什么宣传“无谷、无豆”狗粮？	⚠️ 犬这一条要特别小心 ：犬对谷物过敏的比例也很低；更关键的是，美国 FDA [18] 曾调查“无谷/高豆类犬粮”与犬 扩张型心肌病（DCM） 的关联，结论是“关联未证实但值得警惕”。不要为“无谷”付溢价，也不要长期只喂高豆类配方。

#	问题（猫）	犬的答案（与猫逐条对照）
14	高鲜肉占比高好还是不好？	好，但成本提高。犬同理。
15	烘焙粮好，还是膨化粮好？	营养上区别不大。犬同理。
16	推荐狗粮品牌	⚠️ 推荐的是猫粮品牌，与犬不通用。本手册不给具体品牌背书（品牌存在批次差异与商业关系）。判断标准见第 7 条：营养充足性声明 > 蛋白数值 > 营销概念。
17	推荐狗粮工厂（“厂大于牌”）	“厂大于牌”这个逻辑对犬同样成立——代工厂资质与品控确实与成品稳定性强相关。但注意：同一工厂会同时代工高端粮与低价粮，厂名只能当加分项，真正要看的是具体批次的检测报告。
18	家里有猫，猫粮和狗粮能混吃么？	⚠️ 两个方向都不行：犬吃猫粮 → 蛋白脂肪过高、且猫粮含牛磺酸与更高脂肪，犬长期吃易肥胖与胰腺炎；猫吃狗粮 → 猫会牛磺酸缺乏（致盲、心肌病）、精氨酸缺乏可在数小时内致死。必须分开喂，分开碗，分开位置。
19	更换狗粮要注意什么？	与猫同理，用 7 日过渡法。⚠️ 犬的额外风险：换粮过快是犬急性胃肠炎与胰腺炎发作的常见诱因，尤其对高脂换粮（如从普通粮换到高脂粮）要格外慢。深胸犬换粮当天还要避免剧烈运动（见第 14 章胃扭转）。



配图 犬的三条喂养路线：干粮（最主流）/ 主食罐（价格约为同级干粮的 3-5 倍，大型犬吃得多，成本更不划算）/ 鲜食（可含植物成分，是犬与猫的重要差别）。

7 生骨肉与鲜食



配图 生骨肉与鲜食：配比对才有意义，随便喂肉反而伤狗

犬的消化道比猫更能容忍杂食，但**生食的风险结构是一样的**：病原、寄生虫、配平。

一、支持方论点

- 毛发、口腔、粪便量在部分犬身上确有改善；适口性好。
- 水分含量高，对泌尿系统友好。
- 对食物过敏犬，可用单一蛋白鲜食做排查（elimination diet），这是一种**有临床价值**的用法。

二、四个必须知道的风险

风险	具体	后果
细菌污染	生鸡肉沙门氏菌、弯曲杆菌；生牛肉大肠杆菌 O157；生猪肉	犬可致胃肠炎/败血症；人（尤其孕妇、幼儿、老人）经手可感染
寄生虫	生猪肉弓形虫包裹、生淡水鱼华支睾吸虫、生野味	犬感染，部分可传人；弓形虫对孕妇危害大
营养失衡	只喂肉块/鸡胸 → 钙磷严重失衡；不加内脏 → 维生素 A/D/E 缺乏	营养性继发甲状旁腺亢进 （骨骼变软、骨折）；幼犬尤其致命
物理损伤	不当大小的生骨、熟骨	牙齿断裂、食道/肠道穿孔、窒息

💡 **AVMA 与 CDC 对生食宠物食品持保留态度**，理由是公共卫生（人畜共患病原）。这不是“外国兽医不开明”，而是立场不同：他们要为全家人的健康负责。

三、如果要做，把风险压到最低

1. 必须有兽医营养师配方（按 NRC/AAFCO 标准配平），**绝不能靠网上配方**。幼犬、大型犬幼犬尤其严格。
2. 肉源用人类食品级冷冻肉，采购后立刻分装冷冻，喂前 24 小时冷藏解冻。**不用市场散装肉、不用猪肉、不用野味**。
3. 冷冻不能杀灭所有寄生虫。家用冰箱做不到稳定灭活弓形虫；鱼类必须熟制或使用商业生食级冷冻鱼。
4. 骨头只用生的、大小合适的（禽类软骨、颈骨，带足够肉）。**熟骨一律禁止**。
5. 卫生：专用砧板刀具，热水 + 洗涤剂清洗；犬碗每餐后洗，剩食 30 分钟内收走；处理后洗手。
6. 高危人群不参与：孕妇、5 岁以下儿童、免疫功能低下者。
7. 每 6 个月粪检 + 血检；出现呕吐腹泻立即停喂就医。

✅ **更稳妥的方案**：以优质商业全价粮 / 主食罐为主，辅以合规冻干（正确复水）。如果目的是“改善毛发/适口性”，加一勺煮熟的鸡胸或三文鱼，效果已足够，风险接近于零。

⚠️ **鲜食（Cooked Fresh）是更容易做对的版本**：熟制可以杀灭病原，只要配方经过兽医营养师配平，风险远低于生食。预算允许时，这是很好的折中。

四、生骨肉 12 问逐条详解

生骨肉对犬的意义，和猫一样吗？

⚠️ 不一样。猫是**强制肉食**，所以“生肉 = 天然食谱”的说法逻辑很强；犬是**兼性杂食**，野外犬科动物会吃猎物肠道内未消化的植物内容物，所以犬的天然食谱**本来就包含一部分植物**。“犬应该只吃肉”在生物学上是错的。

只喂纯肉行不行？

同样不行。犬的钙磷失衡后果是**营养性继发甲状旁腺亢进、骨骼疼痛与骨折**；幼犬尤其严重。牛磺酸对犬不是必需，但**钙、锌、维生素 D、维生素 E** 一样不能少。

生骨肉是必须的吗？

不是。优质全价犬粮 + 适量鲜食就能达到最佳状态。犬对生食的收益证据，远弱于猫。

犬吃生肉，最大的额外风险是什么？

⚠️ ① **骨头**：犬啃骨的力量远大于猫，**熟骨头碎裂成尖片**导致食管/肠道穿孔的病例在犬中最多见。② **大型犬营养失衡显现更快**（体重基数大）。③ **细菌污染**：犬会把生肉残渣带得满屋都是（甩头、舔脸），家人暴露风险高于猫家庭。

多久驱虫一次？

吃生食的犬建议**每 3 个月**粪检 + 驱虫；且**心丝虫预防不能省**（蚊媒传播，与生食无关）。

多大可以喂生骨肉？

断奶后即可（约 6–8 周），但**幼犬期是骨骼发育关键期，钙磷比必须精确配平**，不建议家庭自行配制。

犬不吃生骨肉怎么办？

犬的“拒食”多数是行为问题：要么被零食/人食养刁了，要么质地不适。对策：**定时定量、撤走诱惑、不追着喂**。犬比猫容易纠正得多。

生骨肉贵吗？

⚠️ 对犬**更贵**——一只 25 kg 的犬每天需要约 500–700 g 肉，是猫的 5–10 倍。时间成本与存储压力也成倍增加。

生骨肉和顶级犬粮哪个更好？

同结论：**理论上生骨肉更“天然”，实际上大部分家庭自制的鲜食不如顶级全价犬粮营养全面**。

犬吃鲜食拉稀怎么办？

⚠️ 犬换鲜食后拉稀比猫更常见，尤其**高脂鲜食会诱发胰腺炎**（雪纳瑞、可卡、腊肠等品种风险更高）。出现呕吐 + 弓背腹痛，立即就医。

犬的鲜食应该怎么配？

与猫不同，犬的鲜食可以且应该包含少量植物成分（南瓜、胡萝卜、绿叶菜、少量谷物），共同点是：**必须有钙源 + 必须按 NRC/AAFCO 配平。**

一句话结论

对绝大多数家庭：**优质全价犬粮 + 每天一次可控的鲜食加餐**，在收益、风险、时间成本三者之间是最优解。不必为了“生骨肉”焦虑。

8 零食



配图 零食是训练货币，不是加餐

一、三条铁律

1. **零食热量 $\leq$ 每日总热量 10%。**训犬用零食要把当日主粮按热量扣除，否则容易肥胖。
2. **零食是训练工具**，不是“讨它开心”的日常投喂。在正确行为出现时给，才叫训练。
3. **零食不是正餐。**零食吃饱不吃主食，是挑食与营养失衡的主因。

二、零食分类

类型	评价	说明
冻干单一原料（鸡胸/鸭肉/牛肉/三文鱼）	✔️ 首选	成分干净、蛋白高、可掰成小块当训练奖励
风干肉干 / 咬胶（牛筋、牛鞭、羊耳）	✔️ 推荐（注意尺寸）	尺寸要比犬的喉咙大，防整块吞入；有监督地啃
蔬菜类（胡萝卜、黄瓜、南瓜）	✔️ 推荐	低热量，适合减重犬；切小块或蒸熟
磨牙棒 / 洁齿骨	✔️ 辅助	有一定洁齿作用；选有 VOHC 认证的产品更可靠
KONG 塞冻干/湿粮后冷冻	✔️ 强烈推荐	消耗精力 + 独处安抚的最佳工具
人吃的肉（水煮无盐）	✔️ 少量	不加任何调料；不带骨头
生皮卷（Rawhide）	⚠️ 谨慎	可能整片呛入；且多为化工处理，建议避开
鸡脖/鸭脖（生的）	⚠️ 需专业配平	属生食范畴，见第 7 章
火腿肠、肉干、人用零食	❌ 禁止	高盐、亚硝酸盐、含葱蒜调味
巧克力、葡萄、洋葱、木糖醇	❌ 剧毒	见附录C 剂量表
任何熟骨头	❌ 禁止	易碎成尖片，可致穿孔
猫咪零食	❌ 不建议	配方蛋白脂肪过高，长期易胰腺炎

🚑 犬的“送命零食”排行：① 木糖醇（无糖口香糖，30 分钟内低血糖）；② 葡萄/葡萄干（急性肾衰）；③ 巧克力（尤其黑巧与烘焙巧克力）；④ 洋葱/大蒜（毒性迟发，溶血常在数天后出现）；⑤ 澳洲坚果（后肢无力）。剂量表见附录C。

✔️ 训练零食的性价比方案：把主食冻干掰成黄豆大小，或把水煮鸡胸切丁冷冻（一次做一周量）。便宜、干净、犬都爱吃，而且方便按热量扣减主粮。

三、零食的取舍原则

沿用三条原则

- 零食是“区别于主食”的，相当于人的**肯德基**——好吃，不适合长期吃。
- 零食的作用是**拉近关系**，犬比猫更吃这一套（食物驱动是犬训练的核心）。
- 不宜喂太多。

犬的量化上限

通行建议：**零食热量 ≤ 每日总热量 10%**。对一只 20 kg 的犬（约 900 kcal/天），零食上限约 90 kcal/天，大约相当于 2–3 根磨牙棒或一小把训练零食。

⚠ 犬必须额外注意的五类零食

- **磨牙骨 / 生皮 (rawhide)**：有**窒息与肠梗阻**风险，且很多“骨头”实为压制皮，不易消化。选**可消化、尺寸匹配**的产品，全程有人看着。
- **任何熟骨头**：绝对禁止。鸡骨、猪排骨、牛排骨都会碎成尖片。
- **高脂零食**（肥肉、奶酪、油炸物、大量花生酱）：是**急性胰腺炎**的常见诱因。
- **人类零食**（薯片、饼干、巧克力、葡萄干、木糖醇口香糖）：巧克力与木糖醇对犬有明确致死剂量（见附录 C）。
- **猫用零食**：猫零食脂肪与蛋白配比按猫设计，犬长期吃会超脂。

⚠ 犬也不能吃的（与猫相同）

巧克力、葡萄/葡萄干、洋葱/大蒜/葱/韭菜、木糖醇、酒精、澳洲坚果、生面团、咖啡与浓茶。犬对这些的剂量阈值与猫不同，详见附录 C。

训练零食不是“零食”，是**工钱**。犬每次做对，立刻给、给得小、给得频繁。这是犬训练效率远高于猫的底层原因。

9 营养品

一句话：吃的是合格全价粮，绝大多数营养品都不需要。犬比猫更常被“补出问题”。

一、确实有用的场景

成分	什么时候需要	注意
Omega-3（鱼油 EPA/DHA）	关节炎、皮肤病瘙痒、慢性肾病、高甘油三酯	证据等级较高。需兽医定剂量；过量影响凝血与血小板功能，手术前需停
关节营养（葡萄糖胺/软骨素/MSM/绿唇贻贝）	大型犬、老年犬、确诊骨关节炎	属辅助，不能替代镇痛治疗；大型犬幼犬不推荐随意补（可能与骨发育相关问题）
益生菌	急性腹泻恢复期、换粮期、抗生素治疗后	选宠物专用菌株；严重腹泻且有全身症状时不能只靠益生菌
钙/磷	仅限自制饮食配平	⚠️ 吃全价粮的犬绝不要额外补钙，尤其大型犬幼犬，会显著增加骨软骨病风险
关节/髌发育问题专用处方粮	经影像确诊髌关节发育不良等	须兽医诊断后使用
益生元/纤维	便秘、肛门腺问题、体重管理	南瓜、洋车前子壳是温和选择

二、明确不建议的

- “美毛粉/营养膏/多维”当日常补：全价粮已配平，额外补可能过量。脂溶性维生素（A、D、E、K）过量会中毒；维生素 D 过量可致肾衰。
- 大蒜驱虫、生鸡蛋美毛、啤酒酵母：均为无依据或有害。大蒜对犬有毒；生蛋清含抗生物素蛋白，长期致生物素缺乏。
- 人用保健品：剂量与辅料都不适配犬，尤其含木糖醇的口服液/软糖。
- 精油类“天然护理”：茶树、尤加利、柑橘类精油对犬也有毒性（剂量低于猫），且犬舔毛会摄入。

💡 该不该买的三个问题：① 我的狗被诊断出相关疾病或缺乏了吗？② 有文献/兽医支持这个成分对这个情况有效吗？③ 剂量是给犬设计的吗？三个都是“是”，才值得买。

三、三种通用补剂 + 犬特有的两种

结论：吃全价主食，营养品意义不大 —— 对犬同样成立

吃优质全价犬粮的健康犬，绝大部分补剂都不需要。脂溶性维生素（A/D/E/K）过量同样会中毒，且犬的维生素 D 中毒阈值比猫更容易被保健品突破（很多“关节补剂”含维 D）。

推荐的三种（犬版）

- **益生菌**：急性腹泻恢复期、换粮期、抗生素治疗后。选犬专用菌株（如粪肠球菌 SF68、动物双歧杆菌）。严重腹泻伴全身症状时就医，不靠益生菌。
- **猫草 → 犬版是“可食用植物”**：犬吃草多为正常行为（也可能提示肠胃不适）。真正需要的是充足的膳食纤维（南瓜、胡萝卜、洋车前子壳）。⚠️ 犬没有猫那种“必须靠草排毛球”的需求。
- **羊奶 → 犬版仍然是“低乳糖奶”**：犬的乳糖不耐比猫轻，但仍有。幼犬首选犬用奶粉，不要用人用羊奶或牛奶替代。

⚠️ 犬需要、而猫不太需要的两类（犬特有）

- **关节营养（葡萄糖胺 / 软骨素 / 绿唇贻贝 / Omega-3）**：犬的骨关节炎、髌关节发育不良（CHD）、十字韧带断裂发生率远高于猫，尤其大型/巨型犬。证据等级中等偏上，属辅助，不替代镇痛治疗。控制体重 + 规律低冲击运动的效果优于任何补剂。
- **Omega-3（EPA/DHA）**：除关节外，对慢性肾病、皮肤病、炎症性肠病有循证获益。剂量需兽医核定（过量影响凝血）。

判断一个犬用营养品该不该买的三个问题：① 我的犬被诊断出相关问题了吗？② 有兽医/文献支持这个成分对这种情况有效吗？③ 它的剂量是给犬（且是该体型的犬）设计的吗？三个都答“是”，才值得买。

第三部分 · 健康

这五章是硬核部分。犬的急诊比猫更急（尤其中暑与胃扭转）。



配图 绝育后的恢复期：防舔、限动、控体重，三件事都不能松

一、不同体型犬的绝育月龄差异很大

对象	常见建议	主要获益	需要注意
小型犬公犬	6 月龄左右	减少标记、打斗、漫游；降低前列腺与肛门腺疾病	较早绝育与部分行为发育相关，听兽医
小型犬母犬	首次发情后（约 12 月龄）	降低乳腺肿瘤风险（发情次数越多保护越弱）、消除子宫蓄脓	避开发情期手术
大型犬公犬	12–18 月龄（骨骼闭合后）	同上	过早绝育与骨肉瘤、髌关节发育不良、前十字韧带断裂风险升高相关
大型犬母犬	首次发情后 2–3 个月，或 12–18 月龄	同上	同上；大型犬骨科问题代价高，宁可与兽医详细讨论

💡 这是一个真实的权衡：绝育降低生殖系统肿瘤与子宫蓄脓风险、改善部分行为问题；但过早绝育在大型犬身上与骨科疾病、某些肿瘤风险升高相关。结论：小型犬 6 月龄常见，大型犬建议延后并与兽医按个体评估。

二、术前准备与必问的三个问题

- **术前检查不能省：**血常规 + 生化 + 心脏听诊（中老年犬、拳师犬、杜宾等心肌病高发品种建议心脏彩超）。
麻醉风险主要来自未发现的心脏与肝肾问题。
- **禁食 8–12 小时、禁水 2–4 小时**（按医院要求）。
- **必问：**用什么麻醉（气体麻醉 + 全程监护）？有专人做麻醉监护吗？疼痛管理方案（术前镇痛 + 术后多模式镇痛）是什么？

三、术后护理

时间	做什么
当天	麻醉未清醒时不要喂食喂水；放在温暖安静、防跳跃的空间；伊丽莎白圈/手术服必须戴好
术后 1–3 天	少量多次给水给食；观察排尿（公犬术后排尿困难需立即返院）；按医嘱给止痛药
术后 7–14 天	每天检查伤口：红肿、渗液、裂开、异味 → 立即返院；严格限制跑跳、上下楼梯、与其他犬追逐
拆线后	第一周仍限制剧烈运动；逐渐恢复

⚠ 母犬/母猫子宫蓄脓是急症：发情后 1–2 个月出现多饮多尿、精神差、呕吐、腹部膨大、阴道分泌物 → **当天就医**。老年犬尤其危险，延误可致腹膜炎、败血症。

✅ 绝育后必须减量：绝育后基础代谢下降约 20%–30%，食欲反而可能增加。术后 2 周内就应把日粮下调 10%–20%，并每周称重。绝育后肥胖是犬最常见的营养问题。

四、术前术后的补充要点

犬与猫最大的不同：绝育时机要看体型

猫的体型差异小，结论能一刀切；犬从 3 kg 到 70 kg 跨度极大，**绝育时机必须按体型分档**，这是犬独有的复杂性。

⚠️ 大型/巨型犬为什么常常“建议晚一点”？

性激素参与生长板的闭合。过早绝育（尤其大型犬）与**十字韧带（前交叉韧带）断裂风险升高、髌关节发育不良、骨肉瘤风险升高**存在关联；同时，晚绝育又意味着**乳腺肿瘤保护减弱**（母犬在首次发情前绝育保护最强）。这是一个**双向权衡**，必须与兽医按品种、体型、家族史一起定。

犬的收益与风险（与猫对照）

- **母犬**：降低乳腺肿瘤（首次发情前绝育保护最强）、彻底消除**子宫蓄脓**（犬的子宫蓄脓比猫常见且致命）。风险：大型犬过早绝育与部分肿瘤/关节问题相关。
- **公犬**：减少前列腺疾病（尤其未绝育老龄犬的良性前列腺增生）、肛周腺瘤、打斗与漫游行为。⚠️ **注意**：绝育并不会“让犬变乖”——行为问题主要靠训练。
- **猫 vs 犬**：猫绝育的收益几乎是一边倒的；犬的收益则要看**体型、品种、生活方式**做加权，这是重大差异。

绝育后一定会胖吗？

⚠️ **是的，犬比猫更明显**。绝育后基础代谢下降、食欲上升，**大型犬增重后关节负担成倍增加**（体重每增加 1 kg，关节受力增加数倍）。术后必须下调日粮 10–20% 并加强监控。

价格（国内参考）

公犬 500–2000 元、母犬 1000–4000 元（按体重计，大型犬显著更贵）；一线城市、含术前检查与住院则更高。

11 驱虫与心丝虫

一、犬常见的寄生虫

类别	常见种类	感染途径	危害
体内	蛔虫、钩虫、鞭虫	污染土壤/粪便、母婴传播	消瘦腹泻；钩虫可经皮肤感染人（皮肤幼虫移行症）
体内	绦虫（犬复孔绦虫）	吞食跳蚤、食入生肉	肛门瘙痒（蹭屁股）、节片可见；可传人
体内	球虫、贾第鞭毛虫	污染水源/环境	慢性腹泻，需专用药，常规驱虫药无效
体内	心丝虫	蚊子叮咬	犬是心丝虫的最佳宿主，可致肺动脉高压、右心衰、死亡。治疗费用高且有风险，以预防为主
体外	跳蚤、蜱虫、螨（疥螨/蠕形螨/耳螨）	环境、草地、其他犬	蜱虫可传播巴贝斯虫、莱姆病；蜱媒病可致死

二、频率

项目	幼犬	成年犬
体内驱虫	每月 1 次至 6 月龄	每 3 个月 1 次；有生食/户外高风险/多犬家庭 → 每月 1 次
体外驱虫（跳蚤/蜱）	每月 1 次	春夏每月 1 次；蜱虫高发区全年每月
心丝虫预防	按地区风险由兽医开处方	华南/华东等风险区按月，全年不间断
粪检	到家即做，每 3 个月	每年 2 次
蜱媒病检测	—	每年一次（4Dx 快检含心丝虫、莱姆、埃里希体、无形体）

 **蜱虫必须完整拔除：**用尖头镊子尽量贴近皮肤夹住口器，垂直缓慢拔出，不要旋转、不要捏碎、不要涂酒精/油。拔后消毒并记录日期。被蜱叮咬后 1–3 周出现发热、精神差、尿色变深（血红蛋白尿），立即就医——蜱媒病（巴贝斯虫等）进展快。

 **心丝虫治疗远比预防危险：**确诊后需用成年虫杀虫剂，虫体死亡可能堵塞肺动脉，必须严格限制运动并住院监护。因此预防（每月一粒/一剂）是最经济的做法。

三、用药安全

- 按体重给药。幼犬生长快，每月重新称重。

- 柯利犬系（柯利、喜乐蒂、澳牧、长毛惠比特等）对伊维菌素类（伊维菌素、莫昔克丁、多拉菌素）敏感，存在 MDR1 基因缺陷，高剂量可致严重神经毒性。这类犬用药前务必告知医生品种。
- 犬用驱虫药不能给猫吃（尤其含氯菊酯的滴剂，对猫剧毒）。

四、心丝虫：犬的核心议题 ⚠️

⚠️ 心丝虫：猫与犬根本不是一个量级的问题

把心丝虫列在内驱清单里一笔带过；对犬来说，**心丝虫是全年预防的头等事项**。犬是心丝虫的**天然终末宿主**——成虫可在心脏与肺动脉内存活数年，导致心力衰竭、肺动脉高压、腔静脉综合征，可致死。传播途径是蚊子，与吃不吃生食、出不出门毫无关系。

所以，犬的“完全室内”逻辑不成立

⚠️ 猫写的“完全室内可以 1-2 年驱一次”对犬**完全不适用**：只要所在地有蚊子，**全年每月预防**是标准做法。蚊子在城市公寓同样存在。

驱虫三大块（犬）

- **体内**：蛔虫、钩虫、绦虫（**跳蚤是绦虫中间宿主**）、鞭虫。幼犬 2 周龄起每 2 周一次至 12 周龄，之后按月到 6 月龄；成犬按生活方式每 1-3 个月或每季度。
- **体外**：跳蚤、蜱虫（**蜱虫传播巴贝斯虫、莱姆病、埃立克体**——犬的蜱媒病比猫严重得多）、螨虫。春夏高发季必须做。
- **心丝虫**：**全年每月**（有蚊地区），或按兽医评估的季节方案。建议每年做一次**心丝虫抗原检测**再给药。

⚠️ 用药安全

犬用驱虫药种类多，**必须按体重精确给药**——尤其 **MDR1/ABCB1 基因缺陷犬种**（柯利犬、喜乐蒂、澳洲牧羊犬及其混血）对**伊维菌素等大环内酯类**高度敏感，常规犬用剂量即可致**神经毒性甚至死亡**。这类犬种**用药前必须告知兽医血统**，或先做基因检测。

对犬家庭的一个反问：既然犬每月心丝虫预防不能停，为什么不选一片含**心丝虫 + 肠道线虫 + 跳蚤/蜱虫**的**广谱方案**，一次解决？这正是犬驱虫比猫简单的地方。



配图 犬的驱虫是“三块拼图”：体内（蛔虫/钩虫/绦虫/鞭虫）、体外（跳蚤 + 蜱虫，蜱媒病对犬的威胁远大于猫）、心丝虫（蚊媒，全年每月，与是否出门无关）。这是猫最不能直接套用的一章。

12 疫苗



配图 核心疫苗与非核心疫苗要分开算，狂犬在中国属强制免疫

一、犬核心疫苗

类别	疫苗	说明
核心	犬瘟热 (CDV)	致死率高，可致神经症状（抽动、瘫痪）
核心	犬细小病毒 (CPV-2)	幼犬最凶的杀手之一，剧烈呕吐腹泻 + 白细胞骤降，可在 72 小时内致死
核心	犬腺病毒 2 型 (CAV-2)	防传染性肝炎与呼吸道感染
核心	犬副流感 (CPIV)	呼吸道感染
核心（法定）	狂犬	中国强制免疫，办犬证必需
核心（AAHA 2024 ^[4] 更新）	钩端螺旋体	细菌病，经鼠尿污染的水/土壤传播，可致肝肾衰竭，人畜共患；国内南方潮湿地区风险高
非核心	犬舍咳（博德特氏菌 + 副流感）	常去寄养、犬舍、犬公园的犬建议接种
非核心	莱姆病	蜱虫活跃地区可考虑
非核心	犬冠状病毒	效果争议，多数指南不常规推荐

二、WSAVA 免疫程序

阶段	时间	做什么
首针	6–8 周龄	多联疫苗第 1 针
基础免疫	每隔 2–4 周 1 针，直到 ≥16 周龄	通常共 3 针
狂犬	12 周龄后	第 1 针
幼年补强	26–52 周龄（约 6–12 月龄）	多联 + 狂犬各补 1 针
成年加强	之后每 1–3 年	可先做抗体检测（titer）决定

💡 **为什么最后一针必须 ≥16 周龄？** 母源抗体会中和疫苗，而不同个体的抗体消退时间不同。16 周龄后大部分幼犬的母源抗体已降到不干扰疫苗的水平，这一针是“兜底针”。**早于 16 周龄结束免疫程序的幼犬，建议补打一针。**

三、接种前后规矩

1. **只接种健康犬：**发热、腹泻、刚到家不足 7 天、刚驱虫不足 3 天 → 推迟。
2. **接种前先驱虫，** 寄生虫感染会影响免疫应答。
3. **接种后留院观察 30 分钟。**面部肿胀、呕吐、呼吸困难、瘫软 = 过敏，立即处理。（短头颅犬种与小型犬过敏风险相对更高）
4. **接种后 7 天内**不洗澡、不外出、不换粮、不做手术。
5. **免疫期间不做绝育，**至少间隔 7 天。

✅ **在完成基础免疫前，怎么安全地做社会化？** 答案是“抱出去”——坐在车里看世界、抱着听声音、在自家院子/干净的非公共地面活动、只接触已知健康且已完成免疫的成犬。**不要因为怕病就把幼犬关在家里 4 个月，**那样培养出的恐惧行为可能比传染病更难处理。

⚠️ **犬细小是幼犬的头号急诊：**突然精神沉郁、反复呕吐、番茄酱样/带血水样便、拒食 → **立即就医，不要等。**幼犬脱水极快，早到几小时可能就是生死。未完成免疫的幼犬**绝对不要**带到犬多的地方。

四、犬核心疫苗比猫多一针

犬的核心疫苗（WSAVA / AAHA 2024）

与猫只有“猫三联 + 狂犬”不同，犬的核心疫苗多一针：① 犬瘟热 + 腺病毒（传染性肝炎）+ 副流感 + 细小（常合称“犬四联/八联”）；② 狂犬（法定）；③ ⚠️ 钩端螺旋体——AAHA 2024 已将其列为犬核心疫苗（对应 ACVIM [5] 2023 共识），因为它是人畜共患（主人可被感染，导致发热、肝肾损伤，俗称“养狗人的流感”）。

与猫相同的三条底层逻辑

- 首针 6–8 周龄，间隔 2–4 周，一直打到 ≥16 周龄——16 周龄才是终点线，早打完等于可能白打。
- 此后每 1–3 年补强，或先做抗体检测（titer）决定。14–16 周龄完成犬核心系列约 98% 可获多年保护。
- 抗体检测可自 20 周龄起做。

非核心疫苗（按生活方式）


- 犬窝咳（支气管败血波氏杆菌 + 副流感）：常去寄养、宠物店、训练班、狗公园的犬建议接种。
- 莱姆病：蜱虫高发地区、常进草地林地的犬建议。
- 犬流感（H3N8/H3N2）：集体活动多的犬。
- 犬冠状病毒：多数指南不常规推荐。

与猫相反的一条：狂犬

⚠️ 猫建议家养猫不打狂犬；犬没有这个余地——我国犬类狂犬免疫是法定强制，办证、年检、出行、出入境全部需要免疫证明。犬还必须登记挂牌。这是犬主人无法回避的法定义务。

接种前后规矩（与猫基本一致）

1. 只接种健康犬；发热、腹泻、刚到家不足 7 天、刚驱虫不足 3 天 → 推迟。
2. 接种前先驱虫。
3. 接种后留院观察 30 分钟；面部肿胀、呕吐、呼吸困难 = 过敏，立即处理。
4. 接种后 7 天内不洗澡、不出门、不换粮、不做手术。
5. 免疫期间不做绝育（至少间隔 7 天）。
6. 记录批号与日期，写进免疫本。



配图 口腔护理：从每天一次刷牙开始，而不是等牙结石长满

牙周病是犬最常见、也最被忽视的疾病。**3岁前约80%的犬已出现不同程度的牙周问题**（AVMA / 美国兽医牙科学会数据），是犬的头号常见病。

一、发展过程与危害

食物残渣 → **牙菌斑**（24–48 小时内矿化）→ **牙结石** → **牙龈炎** → **牙周袋**（牙龈与牙根分离）→ **牙槽骨吸收、牙齿脱落**。更严重的是：**口腔细菌持续入血，加重心脏（心内膜炎）、肾脏、肝脏负担**。小型犬（泰迪、博美、吉娃娃、约克夏）尤其高发。

二、信号识别

信号	含义
口臭明显	几乎一定存在牙周问题，不是“正常狗味”
牙面黄褐色附着	牙结石
牙龈发红、刷牙出血	牙龈炎
吃干粮时偏头、掉落、只用一侧咀嚼	疼痛，可能有牙周脓肿或牙吸收病变
流口水、食欲下降、体重下降	晚期表现
面部肿胀、眼眶下方隆起	牙根脓肿/口鼻瘘，需尽快处理

家庭手段	效果
刷牙（宠物牙膏 + 犬用牙刷）	✅✅✅ 唯一真正有效。理想每天 1 次，最低每周 2-3 次
洁齿骨/磨牙棒（有 VOHC 认证）	✅ 辅助，有一定机械清洁作用
洁牙玩具（橡胶带凹凸）	✅ 轻微辅助
漱口水/饮水添加剂	⚠️ 极有限，不能替代刷牙
洁牙粮（大颗粒、特殊纤维）	✅ 轻微，仅作用于咀嚼接触面
不用麻醉的“手工刮牙石”	❌ 有害，伤牙釉质且漏掉牙龈下病灶

三、专业洁牙（洗牙）

- 1. 必须全身麻醉。犬的牙科检查需要探查牙周袋深度与拍牙片，清醒状态下无法完成。术前需血检 + 心脏评估。
- 2. 必须拍牙片。犬的牙根长、下颌骨薄，下颌臼齿的根尖脓肿可能在 X 光之外才能确诊；且小型犬有牙吸收病变高发。
- 3. 超声洁治 + 抛光：抛光不能省，否则粗糙面会更快重新结石。
- 4. 拔除无法保留的牙。犬拔牙后多数吃得更香——一颗坏牙的持续疼痛远大于缺牙。
- 5. 术后维护：洗完不刷，1-2 年结石就回来了。

✅ 让犬接受刷牙的 5 步：① 手指蘸犬用牙膏（鸡肉/花生味）让它舔；② 手指蹭牙龈外侧；③ 用指套刷；④ 用犬用长柄牙刷（外侧为主）；⑤ 逐渐延长到 30 秒。每天进步一点点，配合大量表扬。

💡 不要给犬啃冰块或硬骨头“洁牙”——这会增加牙齿断裂风险（尤其后臼齿的“断牙综合征”）。洁齿靠“刷牙 + 有认证的洁齿产品 + 定期洗牙”，不靠暴力啃咬。

四、犬的口腔问题比猫更严重 ⚠️

⚠️ 最关键的差异：犬的牙周病比猫更普遍、进展更快

猫说“3 岁以上 70–80% 有牙结石”。**犬的数据更高**：AVMA / VOHC 口径是**3 岁前约 80% 的犬已出现牙周病**。而且犬的牙石沉积速度更快（唾液 pH、饮食结构与咀嚼方式不同），大型犬的后臼齿与上颌第四前臼齿（“裂齿”）是最先出问题的地方。

⚠️ 犬有一组猫几乎没有的问题

- **口鼻瘘 (oronasal fistula)**：上颌犬齿根部牙周病可穿透到鼻腔，导致打喷嚏、流鼻血、单侧鼻分泌物——很多主人以为是“鼻炎”，其实是牙病。
- **眼窝/眼眶下脓肿**：上颌后牙根尖感染可向眼周扩散，表现为眼下方肿胀、流泪、眼球突出。
- **牙冠骨折**：犬啃硬物（牛骨、鹿角、硬橡胶玩具、笼子栏杆）导致**断裂性牙髓暴露**，极痛且会感染。**不要给犬啃任何“硬到敲不响”的东西**（指甲敲击不应发出清脆响声）。
- **牙齿磨损与断裂**：是犬最常见的牙科外伤，与“磨牙棒越硬越好”的误解直接相关。

犬的刷牙，比猫容易得多

⚠️ **这是犬比猫的优势**：犬可训练、好操作，刷外侧牙面为主。猫说“刷牙违反猫性、做不到就算了”——**这条不能照搬到犬**。犬的刷牙配合度可以训练到很高，且犬的牙周病更严重、更值得刷。

什么该做、什么别做

- **✅ 每天或每周 2–3 次刷牙**（宠物牙膏 + 软毛/指套刷）。
- **✅ VOHC 认证的洁牙咬胶/处方洁牙粮**（作用于咀嚼接触面）。
- **✅ 定期麻醉洁治 + 全口牙片**：4 岁以上每年一次评估。
- **❌ 不给硬骨、鹿角、牛蹄、硬尼龙骨**——会造成**牙冠骨折**，比牙结石严重得多。
- **❌ 不用“免麻醉手工刮牙”**——伤釉质，牙龈下病灶完全没处理，还会让主人误以为洗干净了。

犬的口腔治疗最小可行动作：**先看一眼它的上颌第四前臼齿（裂齿）外侧**。如果那里已经黄褐色堆积 + 牙龈发红，就预约一次麻醉洁治 + 牙片。

14 呕吐、拉稀、外伤与中暑

一、呕吐：先分清要不要去医院

情况	常见原因	怎么办
偶尔吐一次未消化食物，精神食欲正常	吃太快、吃太多、吃草	观察；少量多餐、慢食碗；不需禁食太久
一天内多次呕吐	胃肠炎、胰腺炎、异物、中毒	就医
呕吐物带血/咖啡渣样	溃疡、异物划伤、凝血异常	立即急诊
呕吐 + 腹部膨大坚硬 + 干呕无物 + 流涎	胃扭转（GDV）	立即急诊，分钟级急症
呕吐 + 精神沉郁 + 拒食 + 弓背	胰腺炎、异物梗阻、子宫蓄脓	立即就医
幼犬反复呕吐 + 血便	犬细小、冠状病毒、肠套叠	立即急诊

 **胃扭转（GDV）** 是犬的头号分钟级急症，深胸大型犬（大丹、德牧、标准贵宾、魏玛、金毛）高发。典型表现：腹部快速胀大、干呕但吐不出东西、大量流涎、烦躁不安、呼吸急促。胃扭转后数小时内胃壁坏死、脾脏扭转、休克死亡，不要观察、不要等，立刻送有急诊手术能力的医院。

降低风险：避免一顿大量进食、饭后 1 小时内剧烈运动、用慢食碗、必要时做预防性胃固定术（高发品种可与兽医讨论）。

二、拉稀

表现	可能原因	处置
软便但成形，精神好	换粮、零食过量、应激	换回旧粮、停零食、益生菌、观察 24–48h
水样便 1–2 次，精神尚可	急性胃肠炎	禁食 12–24 小时（不禁水），之后少量易消化食物；无改善就医
水样便多次 + 精神差/呕吐	感染性肠炎、胰腺炎、寄生虫	就医：粪检 + 血常规 + 必要时快检
血便（鲜红或番茄酱样）	细小、出血性肠炎、异物、寄生虫	立即急诊（幼犬尤其）
黑便（柏油样）	上消化道出血	立即急诊
长期间歇性软便 + 消瘦	贾第虫、球虫、食物过敏、慢性肠病	需系统检查：粪检反复 + 排除性饮食试验

 犬的“饮食排除试验”是诊断食物过敏的金标准：用单一新型蛋白或水解蛋白粮，严格 8 周（期间不能给任何其他食物与零食），再做激发试验。这一步需要兽医指导，自己做容易失败。

三、外伤：咬伤、车祸、烫伤

- 1. **咬伤**：伤口小不代表伤情轻——犬咬伤常形成“皮下隧道”，内部组织损伤远大于表面。**所有咬伤都建议就医清创 + 抗生素评估**，尤其胸腔、腹部、关节附近的咬伤。
- 2. **车祸**：即使看起来能走，也**必须拍片 + 腹部超声**排除气胸、内出血、膀胱破裂（这是最常见的“看起来没事，两小时后死亡”）。
- 3. **烫伤**：先用凉水冲 **15–20 分钟**（不要用冰），覆盖干净纱布，不要涂牙膏/酱油/油，就医。
- 4. **出血**：直接加压止血（干净纱布用力按压 3–5 分钟不松手），四肢可用绷带加压，**不要用止血带**（除非大出血且无法控制）。

四、中暑：犬的夏季头号杀手

级别	表现	处置
先兆	剧烈喘气、流涎增多、寻找阴凉、舌头变宽变红	立即停止运动 ，移到阴凉处，用凉水（非冰水）淋湿全身，尤其腹部与足垫，风扇吹
轻度	体温 39.5–40.5 °C、心率快、精神差	继续降温并立即就医
重度	体温 >40.5 °C、走路不稳、呕吐腹泻、牙龈发红或发白、抽搐、意识模糊	边降温边送医 。途中持续用凉水与风扇

 **中暑高危犬**：短头颅犬（巴哥、法斗、英斗、波士顿）、肥胖犬、双层毛厚毛犬（哈士奇、萨摩耶、阿拉斯加）、老年犬、有心脏病或气管塌陷的犬。**绝对不要**：夏天把犬单独留在车里（即使开窗、即使 10 分钟）；高温时段（11:00–16:00）遛狗；让犬在烈日下奔跑。**犬的散热效率远低于人，靠喘气散热，中暑死亡率可达 50%。**

 **判断遛狗温度的土办法**：把手背贴在柏油路面上 5 秒，如果烫得受不了，那就会烫伤犬的掌垫。夏天把遛狗时间移到清晨 **6–8 点**或晚上 **8 点后**。

五、眼睛：犬的高发眼病与猫完全不同

猫这一节只讲了“流泪就滴眼药水”。**犬的眼病谱系和猫差别很大**——猫以病毒性结膜炎（鼻支）为主，而犬的高发问题集中在**角膜、泪液、晶状体和眼压**四个位置。所以这一节是按犬重写，不是翻译。

表现	更可能是	怎么办
内眼角冒出一团红色肉质小肿物，像小樱桃	樱桃眼（第三眼睑腺脱出）	幼犬高发（比格、可卡、斗牛）。手术复位，越早做越好，长期外露会干裂、感染
眼屎多、眼白发红、角膜发干混浊、反复“上火”	干眼症（KCS，泪液分泌不足）	犬比猫常见得多。需泪液试纸确诊；多数要终身滴环孢素/他克莫司，不能自行停药——停了会迅速恶化
眯眼、怕光、流泪、角膜上有白点	角膜溃疡	立即就医做荧光素染色。绝不能用含激素眼药水，会造成角膜穿孔。短鼻犬最易发生
晶状体发白、视力下降、走路撞东西	白内障	糖尿病犬约 3/4 在确诊后 1 年内出现白内障。控制血糖是根本；手术（超声乳化）是唯一复明手段
眼球变硬凸出、瞳孔散大固定、剧痛、用头撞墙	急性青光眼	立即急诊。眼压骤升，数小时至数天即可永久失明，不能等第二天

  **三个必须急诊的眼科红旗：**① 眼球明显凸出、摸起来发硬；② 瞳孔散大且不随光变化；③ 突然失明（走路撞墙、不敢下楼）。这三条都指向急性青光眼或视神经损伤，抢救视力的窗口只有几小时到一两天。

短鼻犬（巴哥、西施、北京犬、法斗、英斗）眼病风险最高：眼球突出、角膜暴露面积大，角膜溃疡与干眼症高发。这类犬别让它把头伸出车窗（风沙划伤角膜）、别和猫玩抓脸游戏（猫爪划伤角膜是犬最常见的外伤性角膜溃疡原因）。

 **居家能做的三件事：**① 用生理盐水擦掉眼周分泌物，每只眼用不同棉片，不要来回擦；② 长毛犬（西施、马尔济斯）修剪眼周毛发，减少摩擦与泪痕；③ 不要自行买“宠物消炎眼药水”——犬的角膜溃疡发生率远高于猫，用错药后果比猫更严重。

六、两个猫没有的致命急症 ⚠️

⚠️ 犬特有急症一：胃扭转（GDV，胃扩张-扭转）——分秒必争

猫没有这一条，因为猫几乎不发生 GDV。深胸大型犬（大丹、德牧、金毛、拉布拉多、圣伯纳、魏玛、标准贵宾等）是高危群体，一旦发生，数小时内可致死。

- **诱因：**一次大量进食、进食过快、餐后剧烈运动、大量饮水后运动、应激。
- **信号：**干呕但吐不出东西（最典型）、腹部膨大且敲击呈鼓音、流口水、烦躁不安、无法安静、弓背、呼吸急促。
- **处置：**立即送医，不要在家等。GDV 是真正的分钟级急症，延误即意味着胃壁坏死与脾扭转。
- **预防：**每日 2-3 餐少量、用慢食碗、餐前餐后 1 小时避免剧烈运动、抬高食盆的作用有争议但无害。

⚠️ 犬特有急症二：中暑（热射病）——犬的散热效率极低

猫几乎不出门、不会在太阳下狂奔；犬会。犬只能靠喘气 + 少量脚垫汗腺散热，效率远低于人。短头颅犬种（法斗、英斗、巴哥、拳师）与双层毛厚毛犬种（哈士奇、萨摩耶、金毛）风险最高。

- **绝对不要**把犬单独留在车内（即使开窗、即使只有 10 分钟，车内温度可在数分钟内升至 50 °C 以上）。
- **不要在高温时段长时间遛狗：**柏油路面可烫伤脚垫（手背贴地 5 秒测试）。
- **信号：**剧烈喘气、大量流涎、牙龈鲜红→发白或发紫、走路摇晃、呕吐、意识模糊、抽搐。
- **处置：**立即移到阴凉/空调处，用常温水（不是冰水）浸湿全身，重点敷在腋下、腹股沟、脚垫，同时送医。
不要用冰水或冰块——会造成血管收缩，反而阻碍散热、加重损伤。

呕吐：犬与猫的判断框架相同

偶发一次、精神食欲正常 → 观察；一天内多次、精神差、呕血或咖啡渣样、腹部膨大疼痛 → 立即就医。⚠️ 与猫不同的两点：① 犬的异物梗阻多为玩具、袜子、玉米芯、骨片（猫多为线绳）；② 呕吐 + 腹部膨大在犬要优先怀疑 GDV，不是胃炎的“再观察看”

拉稀：与猫相同的分层 + 犬特有的两点


- **急性水样便 + 精神好：**禁食 6-12 小时（不禁水），之后少量易消化食物。
- ⚠️ **犬特有：出血性胃肠炎（HGE）**——突然大量鲜红色血便、精神迅速变差，小型犬（尤其玩具贵宾、腊肠、雪纳瑞）高发，需要立即输液。
- ⚠️ **犬特有：急性胰腺炎**——呕吐 + 弓背（腹痛）+ 拒食，常发生在吃了高脂食物后，是最容易被误判为“吃撑了”的急症。
- **幼犬：**一天内多次水样便就要看医生（脱水与低血糖进展极快），且必须排查细小病毒与冠状病毒。

外伤、抓咬伤与“被狗咬”

犬之间的咬伤表面看起来是小孔，皮下往往是撕裂空腔（尤其颈部、胸部、大腿内侧），48-72 小时内可形成脓肿或气胸。**处理：**清水冲洗 10-15 分钟 + 就医（多数需要清创、放引流、抗生素）。⚠️ **被流浪犬咬伤的人：**必须去犬伤门诊评估狂犬暴露（犬的狂犬风险高于猫）。

犬的“忍痛”信号

犬比猫更愿意表达，但依然会藏痛。要看：不愿上下楼梯/跳车、起身僵硬、频繁舔同一部位、“祈祷姿势”（前肢趴地、后躯抬高，提示腹痛）、呼吸变快、食欲下降、性格改变（易怒或躲藏）。



配图 胃扭转（GDV）：深胸大型犬的分钟级致命急症。信号是干呕但吐不出东西 + 腹部鼓胀如鼓 + 烦躁无法安静。立刻送医，不要在家等。



配图 中暑（热射病）：犬只能靠喘气散热，效率极低。车内 10 分钟即可致命；用常温水降温，绝不用冰水（冰水会让血管收缩，反而阻碍散热）。

第四部分 · 购物清单

按“必需 → 有用 → 可延后”三层买，别在第一天把预算花完。

15 新手狗家长购物清单

一、接狗前必买（缺一不可）

类别	物品	选购要点	预算参考
约束	项圈 + 狗牌	狗牌上写两个电话（最好含“有酬谢”）；幼犬期用轻便项圈	30-120 元
约束	胸背带（推荐）	相比脖圈更不伤气管；短头颅犬必须用胸背带	80-300 元
约束	牵引绳（固定长度 1.5-2 m）	新手不要用伸缩绳：它奖励“拉”、易割伤手、难控制	50-200 元
如厕	尿垫 / 训练用托盘	幼犬期必备	30-80 元/月
如厕	酶类除味清洁剂	普通清洁剂去不掉尿味信息素，犬会反复在同一处排泄	50-120 元
居住	航空箱 / 软围栏	航空箱是犬的“安全屋”与训练工具；围栏用于限制活动范围	150-600 元
居住	犬窝 + 可洗垫子	可机洗最重要；幼犬期可能被咬坏，别买太贵	80-400 元
进食	犬碗（不锈钢/陶瓷，宽口浅）+ 慢食碗	慢食碗可防吃太快与胃扭转风险	60-250 元
进食	水碗（大号）	犬饮水环境温度下每天需 40-60 ml/kg	30-100 元
玩具	啃咬玩具（KONG 类）+ 绳结 + 球	换牙期必需，能救命地减少拆家；尺寸要比喉咙大	100-400 元
训练	训练零食（冻干小块）	训练必备，可扣减主粮热量	50-150 元
安全	封窗防护网	必买，高层坠楼在幼犬期高发	按面积算
健康	宠物牙刷 + 犬用牙膏	从到家就开始适应，越早越容易	50-150 元
健康	指甲剪 + 止血粉	犬用钳式指甲剪；止血粉备用	50-120 元
健康	毛刷 / 梳子	短毛用橡胶刷，长毛用针梳 + 排梳，双层毛需换毛梳	60-200 元
健康	电子体温计 + 体重秤	体重是健康最灵敏的指标之一	80-250 元

二、可以缓一缓的

- 自动喂食器：好用但故障代价高；出差多再考虑。
- 伸缩牵引绳：不建议新手使用。
- 犬衣服：小型短毛犬冬天外出有用，其余情况多数不需要。
- 高端犬床/豪华犬屋：幼犬期会被咬坏，先买耐造便宜的。
- 推车：老年犬或术后犬有用，幼犬期鸡肋。

三、首年费用估算

项目	小型犬	中大型犬
用品一次性	1500-4000 元	2500-6000 元
首年疫苗（3 针多联 + 狂犬）	500-1200 元	700-1600 元
首年体检 + 粪检 + 传染病快检	400-1000 元	600-1500 元
绝育（含术前检查）	1500-4000 元	2500-6000 元
驱虫（全年）	600-1800 元	1200-3600 元
主粮（全年）	1800-4800 元	4800-14400 元
洗护美容（全年）	1000-2400 元	1800-6000 元
首年合计（不含突发医疗）	约 7000-19000 元	约 14000-39000 元

💡 **留一笔应急医疗金：5000-10000 元**（大型犬建议更高）。犬的急诊（胃扭转手术、异物取出、胰腺炎、骨折）动辄数千到上万元。宠物保险可作为缓冲，年费参考区间 500-2000 元，投保前重点看是否覆盖本品种高发遗传病、单次限额、等待期、免赔额。


四、装备清单里两件“猫没有”的

给了猫的入门 8 件。犬的清单里有两件猫完全没有的东西：**牵引与犬牌**——这两件不是「可选」，在多数城市是法定要求。



配图 配图对应的本手册插图

16 幼犬到家 30 天清单



配图 幼犬到家 30 天：按周推进，别错过社会化窗口

幼犬到家，最重要的是**节奏**，不是**物资**。30 天做对顺序，省掉未来三年的麻烦。

一、必须从前主人/犬舍拿到的

1. **免疫本**：疫苗批号、日期、驱虫记录。缺了它，免疫程序要重来。
2. **血统/芯片信息**（如有）：芯片号、登记证书。办犬证、找回、出境都要用。
3. **当前主粮与喂食习惯**：品牌、口味、每日次数与分量。**换粮必须 7 日过渡**。
4. **父母的常见病史**：尤其髌关节发育不良（金毛、拉布拉多、德牧）、肘关节发育不良、心脏（拳师、杜宾）、眼部遗传病、癫痫（比格、拉布拉多）、MDR1 缺陷（柯利系）。**这决定了你要重点监测什么**。
5. **犬舍/前主人的联系方式**：正规犬舍会有健康保障期约定。

💡 **CVMA** ^[8] 《动物福利友好繁育舍 ^[11]（犬）评价规范（2023版）》的几条硬指标：8 周龄以下、未断奶的犬不宜出售；出售前宜让犬适应新环境；应向买方提供喂养（含 7 日换粮过渡法）、住所、护理（芯片注册、疫苗接种、社会化、绝育）等书面信息；运输时长不宜超过 4 小时，极端天气不宜运输。**拿这几条去对照卖家，能筛掉大部分不正规繁殖场。**

二、到家 30 天日程

时间	重点	关键动作
第 1 天	安静适应	限缩在围栏；用前主人口粮；不洗澡、不带出门；夜里可能哼叫属正常
第 2-3 天	建立如厕点	固定带出（吃后 5-20 分钟、睡醒后、玩后）；成功立刻奖励
第 4-7 天	首次体检	体检 + 粪检 + 传染病快检 + 驱虫；确认免疫记录，排后续疫苗时间
第 8-14 天	社会化启动 + 生活规则	抱着出门看世界；开始基础指令（坐下、过来）；固定作息
第 15-30 天	习惯养成	按免疫程序补疫苗；练习松绳行走、独处（从 1 分钟到 30 分钟）；每周称重并记录

三、必须尽早训练的四件事

- 1. 独处训练：从“离开 10 秒 → 回来”开始，逐步延长。这是预防分离焦虑最有效、也最被忽略的一步。
- 2. 笼内训练（把航空箱变成“好地方”）：喂食在箱内、零食在箱内、逐渐关门延长。这是犬的安全屋与就诊时的保命工具。
- 3. 刷牙适应：从手指蘸牙膏让它舔开始。
- 4. 剪指甲适应：只握着爪子 + 给零食，不剪。等它完全不抗拒再剪第一个指甲。

⚠ 健康保障期要落在纸上：约定“到院体检异常如何处理”“多少天内出现传染病如何处理”。口头承诺在真出事时没有用。“星期狗”（买回 7 天内发病死亡的幼犬，多为犬瘟/细小）的规避方法：8 周龄以下坚决不接、要求看父母、坚持先体检后付款或带健康保障条款。

四、清单里最容易漏的两项

说猫家长「只有一个猫厕所、一袋猫砂也能接猫」。犬没有这个便利——因为犬的必需清单里有牵引、犬牌、训练用品三样，少任何一件都会立刻影响生活或触犯法规。

17 养狗进阶好物

一、真正提升生活质量的

物品	为什么值得	注意
KONG 类塞食玩具（冷冻）	消耗精力 + 独处安抚，是解决拆家与分离焦虑的第一工具	尺寸要合适，内容物按热量扣减主粮
长绳（5-10 m 训练绳）	在安全场地练召回与自由嗅闻，效果好于短牵绳	只在封闭安全场地使用
胸背带（H 型/免拉设计）	保护气管与颈部，尤其短头颅犬、小型犬	要合身，过松会脱出
食品级嗅闻垫 / 嗅闻球	15 分钟嗅闻 ≈ 1 小时快走（脑力消耗）	可洗，别用易吞的填充物
电子秤 + 体重记录表	体重下降 5% 是最早的疾病信号之一	每周固定时间称
犬用安全带（车载）	安全带 + 胸背带可显著降低车祸伤亡	不要抱着犬坐车
防滑地垫	老年犬、大型犬、术后犬防滑，保护关节与韧带	尤其瓷砖地面
宠物摄像头	观察独处时的行为（是否有分离焦虑）	注意隐私

二、看着很香、其实鸡肋的

- 伸缩牵引绳：训练松绳行走的阻碍，且易割伤、难控制。
- 精密复杂的“自动逗狗机”：多数犬玩两次就腻，不如人陪。
- 昂贵的犬用雨衣/鞋子（除特殊场景）：多数犬抗拒，真要防烫脚可用专用软底鞋，但需逐步适应。
- “洁齿喷雾/添加剂”：效果远低于刷牙，别为此省掉刷牙。
- 人用沐浴露给犬洗澡：人用产品 pH 不适配犬皮肤，会破坏皮肤屏障，导致皮屑与瘙痒。**用宠物专用。**

✅ 升级顺序：主食质量 → 运动与嗅闻工具（KONG、长绳、嗅闻垫）→ 牙齿护理 → 安全装备（胸背带、车载安全带）→ 监控与自动化。前两项直接决定行为与健康，最后一项只决定省事。

三、值得添置的进阶装备

本章有一条犬猫完全颠倒的结论：说「猫笼只作临时隔离、建议散养」，而犬的围笼（crate）在科学训练下是正向工具——犬天性需要「洞穴」作为安全区，围笼能降低分离焦虑。这是养犬与养猫在「空间管理」上的根本差别。

第五部分 · 常见提问

八个具体到“今天就能用”的问题。

18 怎么给狗剪指甲、挤肛门腺？

一、剪指甲：每 3–4 周一次

犬指甲过长会改变站姿与步态，长期损伤关节（尤其趾关节），还会长进肉垫造成感染。走路时能听到“哒哒”声，就是太长了。

二、先认清血线

与猫一样，犬指甲内部有粉红色的血管与神经（血线）。浅色指甲可以直接看到血线，深色指甲看不到——深色指甲每次只剪最尖端 1–2 毫米，分多次、隔几周逐步缩短。

三、五步操作法

- 1. **选时机**：遛狗后犬比较放松，或饭后困倦时。不要在它兴奋时操作。
- 2. **建立联想**：先只握爪子、按压足垫 + 给零食，重复几天再剪。
- 3. **固定姿势**：小型犬可抱在身上，一只前肢朝向你的方向；大型犬让它站立或侧躺，一人保定一人操作。
- 4. **逐个剪**：45° 方向斜切指甲尖端。一次只剪 1–2 个爪、分几次完成完全可以。
- 5. **收尾奖励**：每剪完一个爪子立刻给零食。全部完成后先抚摸，再放开。

 **剪出血了**：立即用止血粉/玉米淀粉按压 30–60 秒。不要大声叫或表现慌张，那会让犬把剪指甲与“可怕的事”永久绑定。

四、肛门腺：多数犬不需要挤

情况	处置
正常犬	不要常规去挤。犬排便时肛门腺会自然排空；频繁人为挤压会损伤腺体、诱发炎症
蹭屁股（拖地）	可能原因：肛门腺堵塞、绦虫、过敏瘙痒、腹泻。先排查绦虫与寄生虫，不要直接挤
确认是腺体堵塞	由兽医或美容师操作，手法是“由内向外、由下向上”轻压；频率通常每 1–3 个月一次
肛门旁红肿、疼痛、有脓	肛门腺炎/脓肿，需要就医（可能需引流 + 抗生素）

 **如果犬反复出现肛门腺问题**：重点查三件事——① 粪便是否长期偏软（软便无法自然挤压腺体，增加膳食纤维、南瓜或洋车前子壳可能有用）；② 是否超重；③ 是否食物过敏导致腹泻。这些是根本原因，比反复去挤更有价值。

五、剪指甲与肛门腺的补充要点

「拎后颈肉控猫」对猫已属误用，对犬更是完全不能做。犬的对应方法是用零食做脱敏训练——犬对食物的驱动力远强于猫，这套方法对犬成功率极高，所以犬的剪指甲应该当成一项训练科目，而不是一次搏斗。



配图 配图对应的本手册插图

19 夏天要给狗开空调么？

一、犬的舒适温度与散热能力

情况	建议
犬的舒适区	18–24 °C（多数犬比猫更怕热）
室温 >28 °C + 湿度高	必须降温：空调、风扇、凉垫、充足饮水；缩短户外活动
室温 <10 °C	小型短毛犬、老年犬需保暖
湿度	50%–60%；高湿会显著削弱犬的散热效率

犬只有两种散热方式：喘气（主要）和足垫出汗（极少）。这意味着犬的散热效率远低于人，中暑死亡率可达50%。短头颅犬（巴哥、法斗、英斗）因气道结构问题，散热能力更差，是最危险的一类。

中暑发展极快：从“剧烈喘气”到“抽搐、器官衰竭”可能只有 20–30 分钟。发现张口大声喘气、流涎、走路不稳，立即用凉水淋湿全身（尤其腹部与足垫）+ 风扇吹 + 送医。不要用冰水或冰块（会致外周血管收缩，反而阻碍散热）。不要覆盖湿毛巾后不通风。

二、夏天六件小事

1. 遛狗时间移到清晨 6–8 点、晚上 8 点后。中午 11:00–16:00 不要遛狗。
2. 先测地面温度：手背贴柏油路 5 秒，受不了就是会烫伤掌垫。
3. 水：犬每天需约 40–60 ml/kg，夏天更多。随身带水。（大量饮水需注意，某些犬易发胃扭转——做到“少量多次”即可）
4. 不要剃光双层毛犬（哈士奇、萨摩耶、金毛等）：底毛有隔热与防晒作用，剃光反而更易中暑与晒伤。适度梳掉死毛、修剪腹部即可。
5. 千万不要把犬单独留在车里——即使开窗、即使 10 分钟。车内温度可在 10 分钟内升至 50 °C 以上。
6. 游泳不能防中暑，且要警惕水池与泳池溺水（尤其小体型犬与不擅游泳的犬）。

💡 开空调的正确方式：设定 24–26 °C，不直吹，给犬留一个能离开风口的位置（或另一间房）。若犬长期独处，用“空调 + 风扇 + 大碗水 + 凉垫”的组合最稳妥。

三、降温与中暑预防的补充要点

这一章是犬猫差异最极端的一处。花了大量篇幅论证「猫其实比人怕热，但不开空调也能过」。犬的结论要整体前移——犬几乎只能靠喘气散热，中暑死亡率在兽医文献中可高达 30–50%。



配图 配图对应的本手册插图

20 狗狗出远门：宠物托运

一、先判断：真的必须带吗？

犬的环境适应力强于猫，但**分离焦虑与运输应激同样真实**。短途（3 天内）出行，专业上门喂养或正规寄养通常更省心。长途搬迁、长期在外，自驾带犬往往是最好选择。

二、四种方式对比

方式	优点	风险	适合
自驾（推荐）	可控、可随时休息、犬在自己熟悉的气味环境里	需用航空箱或车载安全带固定；注意不要让它探头出车窗	中短途、有家人陪同
航空托运（随行）	速度快	需提前办检疫证明、订有氧舱； 短头颅犬多数航司拒运	长途跨省、出国
航空货运	可单独运输	不在主人视线内，风险最高	万不得已
铁路/高铁托运	部分线路支持	班次受限、需提前申请、检疫要求严格	特定线路

⚠ 短头颅犬（巴哥、法斗、英斗、波士顿等）因气道结构问题，在高空低氧与高温环境下风险极高，多数航空公司明确拒运。这类犬出行强烈建议只在凉爽时段自驾。

三、必办的文件

- 动物检疫合格证明**：通常需在出发前 **3-7 天内** 到当地动物卫生监督机构/指定宠物医院办理，需带免疫证。
- 免疫证明/免疫红本**：狂犬疫苗需在有效期内（多数要求接种满 21 天以上，各地不同）。
- 宠物芯片 / 犬证**（部分线路与出入境要求）。
- 出境**：还需目的地国家的入境许可、血清抗体检测（狂犬中和抗体 ≥ 0.5 IU/ml，需提前数月准备）等。**请至少提前 3-6 个月开始准备。**

💡 检疫证有效期极短（通常 3-7 天），且各城市要求不同。务必提前致电出发地与目的地两边的动物卫生监督机构确认清单，不要按网上的旧攻略办。

四、降低应激的 10 个动作

- 提前 2 周让航空箱变成日常“好地方”**：拆门放着、里面放零食、喂食在箱内，让它自己进去睡。
- 出发前 4-6 小时停食**，1-2 小时停水，减少途中呕吐与排泄。（**心脏/糖尿病患者犬须遵医嘱**）
- 不要使用未经兽医指导的镇静药**。部分镇静药在高空可能抑制体温调节与心血管功能，**风险大于收益**。
- 箱内放一件有你气味的旧 T 恤**。
- 箱体扎带固定、门锁扣再加固**，贴上“活体动物·请勿倒置”标签与两个联系电话。

6. 准备吸水垫（不用报纸，油墨有毒）。
7. 温差防护：夏天用冰袋（包毛巾）、冬天加保温套（留通气孔）。
8. 自驾时每 2–3 小时停车：给水、排泄、短距离走动。
9. 落地后：先给安静空间休息，不要立刻带去玩。
10. 到达后 48 小时观察进食、饮水、排尿排便；超过 24 小时不排尿立即就医。

✅ CVMA ^[8]《动物福利友好繁育舍 ^[11]（犬）评价规范》明确：运输时长不宜超过 4 小时、极端天气不宜运输、运输前宜征求兽医意见确定犬是否适合运输、运输笼应能让犬自由站立、躺卧和转身。这四条可直接用于衡量任何托运方案是否合格。

五、托运的补充要点

四项费用结构对犬同样适用，但犬有两个硬门槛：① 短吻犬种多数航司明确禁运（法斗、英斗、巴哥、波士顿梗）；② 大型犬常超出货舱笼具尺寸与重量限制。这两条不是「加钱能解决」的问题。



配图 配图对应的本手册插图

21 狗碗怎么选？

一、材质

材质	评价
不锈钢（304/316）	✅ 首选。耐用、好洗、不藏菌、不怕咬。缺点轻，容易推着走（可配防滑垫）
陶瓷	✅ 推荐。重、不易移动、易清洁。缺点易摔碎
塑料	❌ 不推荐。划痕藏菌，是犬下巴痤疮（尤其短毛小型犬）的常见诱因
硅胶折叠碗	⚠️ 仅适合出行临时用

二、形状与功能的三个考虑

1. 慢食碗（防狼吞虎咽）：犬吃太快会呕吐、胀气，深胸大型犬吃太快是胃扭转（GDV）的风险因素之一。慢食碗 + 分餐是简单有效的预防手段。
2. 长耳犬（可卡、巴吉度）用窄口/锥形碗，可防止耳朵泡进食物与水里（长期潮湿会致耳道感染）。
3. 短头颅犬（巴哥、法斗）用浅口宽碗，它们的口鼻结构不适合深碗，深碗会吃得很吃力。

三、日常维护

- 每天洗碗、每天换水。犬碗是细菌培养皿，湿粮碗 20 分钟内吃不完就该收走（夏天更短）。
- 水碗数量 $\geq$ 犬数 + 1，多点分散，尤其多犬家庭，避免资源竞争引发冲突。
- 喂食区安静，不要放在人来人往的过道或洗衣机旁。
- 抬高 10–15 cm 的餐台对老年犬、大型犬的颈部与关节更友好，也能减少呕吐与胀气。（注：抬高食盆与胃扭转风险的关系仍有争议，最新研究倾向“抬高不是必要措施”，可与兽医讨论）

✅ 多犬家庭喂食铁律：分开、同时、看得见。把两只犬放在彼此看得到但接触不到的位置，同时进食，吃完各自收碗。这能极大降低食物护食与打斗。

四、抬高食盆的风险 ⚠️

本章有一条最容易被搞反的结论：建议抬高碗位 5–15 cm；而经典研究（Glickman ^[17] 等，JAVMA 2000）发现抬高进食与犬胃扭转（GDV）风险升高相关。深胸大型犬的家庭，请与自己的兽医确认后再决定要不要抬高。



配图 配图对应的本手册插图

22 如何给狗狗拍出漂亮照片



配图 给狗拍照：先让它放松，再按快门

一、光线

- 首选自然光，在窗边拍。让犬面向窗户，光从正面或 45° 侧前方打过来。
- 避开顶光与直射硬光（正午、单点吊灯），会在眼窝形成难看的黑阴影。
- 阴天与窗边散射光是最好的影棚。
- 绝对不要用闪光灯：会拍到“激光眼”，且可能惊扰犬。

二、机位

1. 蹲下，与犬视线齐平。绝大多数“狗照片难看”都是站着俯拍导致的。
2. 手机镜头靠近犬的眼睛高度，能放大眼睛、缩短身体，更可爱。
3. 眼睛放在画面上三分之一线，留出前方空间（视线留白）。
4. 用 2x 变焦拍特写，而不是凑得极近（近摄会变形且惊扰犬）。

三、让它配合的五个技巧

- 零食举在镜头正上方——犬的视线自然看向镜头。这是拍狗最有效的一招。
- 用声音（“谁呀？”、揉纸声、squeaker），只在快门前一秒用。
- 连拍。抓拍对焦最难，连拍 + 后期挑远优于单张精修。

- **拍它的自然状态：**奔跑、跳跃、歪头、打哈欠、从草地滚完起身——这些比“坐好别动”珍贵得多。
- **用长焦（或 2–3x）在远处拍，**犬不会因相机逼近而紧张。

四、后期三个动作

提亮阴影（别拉高对比）

降低高光（保留白毛/浅色毛细节）

轻微增加锐度与饱和度

白平衡偏暖（更温暖）

裁切为 4:3 或 1:1

💡 **拍视频更实用：**行为问题、疼痛信号（跛行、抽搐、呼吸费力）用视频记录给兽医看，比现场描述准确得多。**就诊前拍一段犬走路（正面+侧面）、呼吸、进食的视频，**是省钱又高效的习惯。

五、给狗拍照的补充要点

拍猫的核心是「骗出满瞳」。犬不需要这一套——犬天生会看主人、会看镜头、会配合口令。养犬的拍照难点在别处：**机位要与犬眼齐平，以及抓拍高速动作。**

23 狗狗掉毛多怎么办？



配图 掉毛不是病，但梳毛的方式决定了你家的毛量

一、先分清正常与异常

类型	特征	说明
季节性换毛	春秋两季明显增多，全身均匀，无秃斑	正常。日照变化触发
双层毛犬（哈士奇/萨摩耶/金毛）	全年掉毛量都大，换毛季“爆毛”	正常。 不要剃光 ，底毛有隔热防晒作用
局部秃斑 / 对称脱毛	成片掉，皮肤可见/发红/有皮屑	异常 ：皮肤病（癣、螨）、过敏、内分泌（甲减、库欣）
只掉一侧 / 沿背中线	对称性脱毛	异常 ，高度提示内分泌疾病，需血检
掉毛 + 剧烈瘙痒 + 红疹	常抓挠、啃咬	异常 ：过敏（跳蚤过敏性皮炎最常见）、感染

二、正常掉毛如何减少家里的毛

- 1. **每天梳毛**（双层毛犬用换毛梳/下毛梳）。这是最有效的手段，没有之一。
- 2. **营养**：优质蛋白 + 足量 **Omega-3（鱼油）**。皮肤屏障好了，掉毛与皮屑都会减少。
- 3. **不要过度洗澡**：犬建议 3-4 周一次（视品种与生活方式）；**用人用沐浴露会破坏皮肤屏障**，导致皮屑与脱毛。
- 4. **定期驱虫**：跳蚤是犬掉毛与瘙痒最常见的元凶之一，且跳蚤过敏性皮炎（FAD）只要一只跳蚤就能引发剧烈瘙痒。
- 5. **空气净化器 + 勤换床品**：犬的过敏原主要在皮屑与唾液中。

 **这些掉毛必须就医**：① 成片秃斑 + 皮肤发红/结痂/有环状脱屑（警惕犬小孢子菌/癣，可传人）；② 对称性脱毛 + 体重变化 + 多饮多尿（内分泌）；③ 剧烈瘙痒到自伤；④ 掉毛同时精神差、食欲差。

 **关于“低敏犬种”**：没有真正“不掉毛”的犬种。贵宾、比熊、雪纳瑞等属于持续生长毛（类似头发），掉毛少但**必须每 4-6 周修剪**，且增加了美容成本。过敏人群仍需评估个体差异。

三、被毛管理的补充要点

这是全书犬猫差异最强烈的一条：说「猫剃毛伤害很微小、0 应激」，而**犬剃毛基本是禁忌**——双层毛犬的毛同时起保温与防晒作用，剃掉后反而**更容易中暑**，还可能造成**永久性「剃后脱毛」**。

24 有狗家庭的植物与食物黑名单



配图 这份黑名单，建议直接贴在冰箱门上

完整剂量表见**附录C**。这里只说最需要立刻处理的。

犬的第一号食物杀手：木糖醇。它藏在无糖口香糖、无糖薄荷糖、部分花生酱、“低糖/生酮”烘焙食品、某些牙膏中。**30 分钟内可致致命低血糖，0.5 g/kg 以上可致急性肝衰竭。**一粒口香糖对 **5 kg** 的小型犬就可能是致命的。买任何“无糖”食品前，先看成分表有没有 **xylitol / 木糖醇 / 桦木糖**。

一、必须背下来的食物黑名单

食物	为什么	紧急程度
木糖醇（无糖口香糖/部分花生酱/牙膏）	胰岛素骤释 + 肝坏死	分钟级，立即就医
葡萄 / 葡萄干 / 提子	急性肾损伤，无安全剂量	立即就医
巧克力（尤其黑巧、烘焙巧克力、可可粉）	可可碱，20 mg/kg 起症状，60 mg/kg 可能抽搐	立即就医
洋葱 / 大蒜 / 葱 / 韭菜（含粉状调味、婴儿辅食）	溶血性贫血，毒性迟发数天（溶血常 3–5 天后出现），加热不破坏	立即就医
澳洲坚果（夏威夷果）	后肢无力、震颤，约 2.4 g/kg	就医
酒精 / 生面团 / 含酒精甜点	中枢抑制 + 低血糖；生面团可致胃扩张	立即就医
熟骨头（尤其禽类）	碎成尖片，可致食道/肠道穿孔	立即就医
高脂剩菜 / 肥肉 / 大量油炸	急性胰腺炎	就医（腹痛+呕吐）
牛油果（果核/果皮）	persin + 异物梗阻	就医
咖啡 / 浓茶 / 能量饮料	咖啡因	就医
夏威夷果外的其他坚果大量	高脂、部分霉变（黄曲霉毒素）	避免

二、植物黑名单（有狗家庭）

等级	植物	处置
致命/严重	苏铁（铁树，尤其种子）、夹竹桃、秋水仙、铃兰、洋地黄、紫杉、毛地黄、蓖麻	家里不要出现
严重	百合（对犬毒性低于猫但仍有害）、绿萝、龟背竹、滴水观音、万年青、白掌、水仙/郁金香球茎、杜鹃	含草酸钙或强心甘，建议物理隔离
中等	一品红、菊花/除虫菊、绣球、冬青、槲寄生	胃肠刺激
犬敏感	各类精油（茶树、尤加利、柑橘）、香薰扩香、精油驱虫项圈	剂量低于猫但仍有毒性，且犬舔毛会摄入

三、安全植物

- 狗尾草
- 小麦草/燕麦草
- 吊兰
- 波士顿蕨
- 竹芋
- 散尾葵
- 空气凤梨
- 蜘蛛抱蛋
- 棕竹
- 多肉（避开大戟科）

四、训练“放下”指令，比把家里清空更有效

1. 教“放下”：用更好的零食交换嘴里的东西（见第 4 章），永远不要硬抢。硬抢会让犬学会“吞得更快”。
2. 不要惩罚捡东西的行为，否则犬会把“叼东西”和“被骂”关联，反而学会躲起来吃。

- 3. 物理隔离仍不可少：垃圾桶加盖、药品上锁、植物上架或隔离。训练是第二道防线，环境是第一道。
- 4. 打翻或误食后：先拍照/留样，观察 30–60 分钟，出现流涎、呕吐、精神差立即就医。不要自行催吐（见附录D）。

五、犬的毒物风险补充要点

犬与猫的植物中毒清单高度重叠，但犬有几个专属的、更常见的致命项：葡萄/葡萄干、木糖醇、澳洲坚果、洋葱大蒜、巧克力。另外犬会主动、大量地啃咬植物，风险高于猫的试探性啃咬。

25 拓展阅读：行为学、病理学

如果你想把养狗从“经验”升级成“方法”，这一章给你一张书单和一套检索方法。

一、按需求选方向

你关心的问题	该看什么	从哪入手
犬为什么这样？怎么改行为？	兽医行为学	AAHA 行为管理指南；《犬的行为与训练》类教材；优先选择“正向强化（R+）”取向的内容
这个病是什么？会不会死？	小动物内科学 / 病理学	《默沙东兽医手册 [2] 》疾病条目（免费在线）；按“症状—鉴别诊断—处置”三段读
化验单上这些指标什么意思？	临床病理学	血常规（CBC）：红细胞/白细胞/血小板；生化：肝（ALT/ALP）、肾（BUN/肌酐/SDMA）、血糖、电解质
吃的东西有没有问题？	小动物营养学	WSAVA [3] 全球营养工具包；CVMA [8] 《犬猫临床营养管理指南 [7] 》系列；AAFCO/NRC 标准
中毒怎么办？	兽医毒理学	ASPCA [15] 有毒植物与食物数据库；《默沙东兽医手册》中毒章节
这个品种有什么遗传病？	犬种遗传病学	查该品种的髋/肘关节评分（OFA / 国际髋关节评分）、心脏（拳师、杜宾）、眼部（CERF）、MDR1（柯利系）

二、三个可以马上用的免费资源

- 1. MSD Veterinary Manual (msdvetmanual.com)：全球兽医临床参考书，有面向宠物主人的简化版。搜英文病名即可，比中文自媒体可靠得多。
- 2. ASPCA Animal Poison Control：有毒食物/植物数据库，可按名称检索。
- 3. CVMA 团体标准 (cvma.org.cn)：国内最新行业标准，搜“犬”可查到临床营养管理、动物福利友好繁育舍 [11] 评价规范等文件。

三、怎么读一篇医学内容（防忽悠三问）

- 1. 谁说的？ 作者有兽医资质或机构背书吗？还是“某博主的朋友说”？
- 2. 有数据吗？ 是否给出剂量、样本量、时间窗？“我家狗吃了没事”不构成证据。

3. 有没有利益？这篇文章是不是在卖某个产品？

💡 **给养狗人的一句忠告：**网络上的“老家长经验”“训犬师经验”很有价值，尤其在品种特性与训练技巧上；但任何涉及诊断、用药、绝育月龄、疫苗方案的判断，都以执业兽医面诊为准。经验帮你提问，兽医负责决策。

四、犬版书单的取舍

书单选得很准。犬版对应书单里，《Dog Sense》（犬的秘密）与《Don't Shoot the Dog》是两本必读——后者是正向强化训练的奠基之作，与本手册第 4 章的方法同源。

附录

附录A · 权威知识库速查（默沙东 / WSAVA / AAHA / CVMA / 国标）

本附录把《默沙东兽医手册 [2]》（MSD/Merck Veterinary Manual）、世界小动物兽医协会（WSAVA [3]）指南、美国动物医院协会（AAHA）疫苗指南、ACVIM 共识 [5] 声明、中国兽医协会 [8]（CVMA）团体标准与指南、国家标准与农业行业标准，以及公开的同行评议文献，翻译成「能不能照做」的话。每条都标注了出处与年份，方便你和兽医对线时把话说清楚。

💡 **本手册已做核对：**附录 A-D 的关键数据（疫苗程序、中毒剂量、生命体征、体况评分）已在 2026-10-01 逐条回查原始来源，与来源不符的已订正，明细见附录E。

💡 **使用原则：**兽医面诊 > 指南共识 > 本手册。本手册用于帮你听懂兽医在说什么、少花冤枉钱、以及在夜里 3 点知道该不该冲医院，不能替代诊断。指南之间不一致时，以你的兽医结合本地流行病学的判断为准。

本附录只讲“怎么用”；每条依据的完整出处与版本号，统一列在 附录H · 引用来源清单，正文中的 [n] 上标与之一一对应。

二、疫苗：WSAVA 共识 vs AAHA 共识

对象	核心疫苗	首针	基础免疫	加强
幼犬（WSAVA 2024）	犬瘟(CDV)、腺病毒 (CAV)、细小(CPV-2)	6-8 周龄	每隔 2-4 周 1 针，最后一针 ≥16 周龄	6-12 月龄补 1 针；此后不超过每 3 年
幼犬（AAHA 2024 [4]）	在上述基础上，把钩端螺旋体列入核心疫苗	CDV/CAV/CPV 自 6-8 周起；钩端螺旋体 ≥12 周龄起、间隔 2-4 周共 2 针	同上	同上
幼猫	猫瘟(FPV)、猫疱疹 (FHV-1)、猫杯状 (FCV)	6-8 周龄	每隔 2-4 周 1 针，最后一针 ≥16 周龄（部分指南建议至 16-20 周）	6-12 月龄补 1 针；此后每 3 年
犬猫通用	狂犬（法律强制）	12-16 周龄（按疫苗标签与地方法规）	1 针 + 1 年后加强	按地方法规（多为每 1-3 年）

- **副流感（CPiV）** 在 WSAVA 属**非核心**，但在 AAHA 的犬 DHPP 组合里通常与核心一起给——所以「四联/八联」里既有核心也有非核心，这是正常的。
- **非核心疫苗**看生活方式：常去草地 / 水域的犬建议加钩端螺旋体（AAHA 已改为核心）；常寄养 / 犬舍的犬建议加犬舍咳（Bordetella）；多猫 / 散养猫考虑猫白血病（FeLV）。**AAHA 2024 已把钩端螺旋体列为犬核心疫苗**，中国多见于南方潮湿地区，听当地兽医建议。
- **免疫期（DOI）**：WSAVA 明确核心疫苗**不应比每 3 年更频繁**，MLV 核心疫苗免疫期长达数年、可能终身；在 14-16 周龄完成犬核心系列的幼犬，约 **98%** 可获得多年甚至终身保护。**抗体检测（titer）** WSAVA 支持从 20 周龄起做（犬 CDV/CAV/CPV、猫 FPV）——先测再决定打不打，是省钱又科学的做法。
- **注意抗体检测的边界**：猫的 FCV / FHV-1 抗体水平与保护力的相关性弱于 FPV，呼吸道疫苗的保护力与免疫期本就短于猫瘟疫苗，呼吸道两项不能只靠抗体数值下结论。
- **狂犬疫苗在中国属强制免疫**，办犬证、入市、出入境都需要免疫证明（免疫红本）；2026 年起中国兽医协会已发布《犬只狂犬病免疫接种点建设与管理规范》，可在正规免疫点接种。

⚠ 接种前必须健康：发热、腹泻、刚到家不足 7 天、刚驱虫不足 3 天，都应推迟。接种后留院观察 30 分钟再走，出现面部肿胀、呕吐、呼吸困难立即返院。接种后 7 天内不洗澡、不外出、不换粮。**小体型 / 年幼犬更易出现反应**，可把疫苗分次接种、两次之间间隔 ≥2 周（AAHA 建议），但**不要自行「拆分剂量」**。

三、体况评分（BCS）：比体重更重要的指标

WSAVA 与 CVMA 均采用 **9 分制** BCS。判断方法是看 + 摸肋骨、腰线、腹部上收三条线，不用称重。**每 1 分约等于体脂变化 5%**；理想分对应的体脂率约 20%（灵缇等视觉猎犬同分体脂更低，属正常）。

评分	外观与触感	结论
1-3 分	肋骨、脊椎、髌骨明显可见，无脂肪覆盖	过瘦，需排查寄生虫 / 甲亢 / 慢性病
犬 4-5 分 / 猫 5 分	肋骨轻按可及、有薄脂肪层，腰线明显，腹部上收	理想体况 （犬 4 分适合偏瘦品种或工作犬）
犬 6-7 分 / 猫 6-7 分	肋骨需用力按才摸到，腰线不明显	超重，建议减重 10%-20%
8-9 分	肋骨摸不到，腹部下垂，背部平坦	肥胖（猫 ≥8 分即临床肥胖），需医学减重方案

💡 **肥胖已是最常见的营养性疾病**：美国 2022 年数据约 **59% 的犬、61% 的猫**超重或肥胖（APOP）。绝育后更容易发胖——绝育犬约为未绝育的 2.8 倍、绝育猫约 3.6 倍。肥胖是慢性炎症状态，会缩短寿命。

✅ **减重不是「少喂点」**：猫减重过快会诱发**肝脂变（脂肪肝）**，必须在兽医指导下按周减 1%-2% 体重，并使用处方减重粮。犬同理，目标是每周减 1%-2% 体重。

四、驱虫：频率比药重要

项目	幼年	成年（完全室内）	成年（外出 / 吃生食 / 接触其他动物）
体内驱虫（蛔虫 / 绦虫 / 钩虫）	每月 1 次至 6 月龄	每 3 个月 1 次	每月 1 次
体外驱虫（跳蚤 / 蜱 / 螨）	每月 1 次	春夏每月 1 次；秋冬可 2 个月 1 次	每月 1 次，全年不断
心丝虫预防	按地区风险，兽医处方	华南 / 华东等风险区按月	按月，全年
粪检	到家即做，之后每 3 个月	每年 1-2 次	每年 2 次

🚨 **猫用犬药是宠物中毒的常见原因之一**。猫的肝脏缺少葡萄糖醛酸转移酶，对多种药物代谢能力差：**氯菊酯（permethrin）**类犬用滴剂对猫剧毒——皮透约 **100 mg/kg** 即可造成危及生命的中毒，文献统计 286 例猫氯菊酯中毒中 96.9% 出现症状、**10.5% 死亡**，抽搐平均持续约 39 小时。**给狗用了含氯菊酯的滴剂后，72 小时内不要让猫舔到或贴身接触那只狗。**

💡 **驱虫药按体重给药**。除氯菊酯外，猫对**对乙酰氨基酚 / 布洛芬**等也很敏感，一颗人用感冒药就可能致命。

五、绝育：月龄与利弊

对象	常见建议月龄	主要获益	需要注意
公猫	6-8 月龄	减少喷尿标记、离家打斗、攻击行为	术后 24h 内观察排尿，猫尿道细，警惕梗阻
母猫	6 月龄前后 / 首次发情后	大幅降低子宫蓄脓、乳腺肿瘤风险	发情期手术出血风险略高，一般避开
公犬	中小型 6 月龄；大型犬可延至 12-18 月龄	减少前列腺疾病、会阴疝、部分行为问题	大型犬过早绝育与某些骨科 / 肿瘤风险相关，建议与兽医商量
母犬	首次发情后 2-3 个月（约 12-18 月龄）	显著降低乳腺肿瘤、子宫蓄脓	大型犬可待骨骼闭合后再做

⚠ 母犬 / 母猫子宫蓄脓是急症：发情后 1-2 个月出现多饮多尿、精神差、呕吐、腹部膨大、阴道分泌物，必须当天就医，延误可致死。

六、口腔：被严重低估的「老年病源头」

- **3 岁前，约 80% 的犬、70% 的猫已出现不同程度的牙周病**（AVMA / 美国兽医牙科学会数据），是犬猫最常见的疾病之一。牙结石→牙龈炎→牙周袋→牙齿脱落，细菌入血还会加重心脏、肾脏负担。
- **刷牙是唯一真正有效的家庭手段：**宠物专用牙膏（可吞食）+ 指套或软毛牙刷，从 3-4 月龄开始适应，理想频率每天 1 次，现实至少每周 2-3 次。洁齿咬胶、洁牙粮只是辅助，不能替代刷牙。
- **洁牙（洗牙）必须全身麻醉 + 拍牙片，「不用麻醉的洁牙」只是磨掉表面牙石，既治不了牙龈下的病，还会造成疼痛和牙面损伤。**
- **AAHA 牙科指南建议：**成年犬猫定期口腔检查与麻醉洁牙——猫与小型犬可从 1 岁起、大型犬从 2 岁起，此后每年 1 次（视牙周状况调整）。洁牙后建议拍全口牙片：约有一半的牙科病变藏在牙龈以下，肉眼看不见。

附录B · 全国宠物医院信息（24 小时急诊 · 价格 · 评价参考）

这一节回答三个问题：**半夜出事去哪、怎么判断一家医院靠不靠谱、大概要花多少钱。**价格与院区信息均来自公开渠道（医院官网 / 公示、国家标准、媒体报道），**会变，出发前务必电话确认。**

🚑 急诊黄金原则：先打电话再出发。说清三件事——**什么品种、多重、误食 / 发病多久了。**保留呕吐物 / 包装袋 / 植物残株带去。**不要自行催吐**（见附录D）。

一、全国连锁：两家主流体系

体系	旗下主要品牌	覆盖规模（公开数据）	诊疗分级	特点
新瑞鹏宠物医疗集团	美联众合、安宠医、芭比堂、瑞鹏等	100+ 城市、1000+ 家医院；19 城 180 家重点分院、17 家重点中心医院覆盖 10 城	「1+P+C」三级：中心医院 / 专科医院 / 社区医院	有全国统一调度热线；集团布局十五大专科；美联众合北京转诊中心公示 1370 项价格；也是 GB/T 45295 ^[12] -2025 与多项农业行业标准的主要起草单位
瑞派宠物医院	瑞派（含各地子品牌，如成都瑞派咪咻、维特等）	多地布局，规模公开信息较少	各地院区独立设置	公开特色学科：心脏科、眼科、口腔科、猫科、骨科与神经外科

💡 **关键认知：**24 小时营业 ≠ 任何时间都能处理所有问题。夜里值班医生的专业方向、可用的检查与手术项目都会变。「能开门」和「能救命」是两件事，一定要电话问清楚当班是否有对应专科医生。

✅ **用标准判断医院是否规范：**GB/T 45295-2025 把诊疗服务拆成 16 个环节（前台、诊室、药房、化验室、影像室、手术室、住院部、处置室等），并要求药房有药品标识、化验室有生化仪 / 血球仪 / 显微镜 / 离心机、诊室有独立通风与隔离留观区。**你可以直接问：你们的诊疗流程按 GB/T 45295-2025 执行吗？**

二、已核实院区（北京）

院区	地址	急诊	设备 / 能力	价格公示
美联众合北京转诊中心（1 级中心医院）	北京市朝阳区北苑路 168 号	24 小时	64 排 CT、MRI、C 形臂、宠物专用 ICU、彩超、眼科手术显微镜、关节镜、胃肠镜、腹腔镜；设 12 个专科	夜间急诊号 200 元/次；夜诊急诊 100 元/次；急诊 CT 700 元；普通初诊挂号 10 元；体格检查 30 元；单器官腹部超声 195 元
美联众合京西 24h 动物诊疗中心	北京市石景山区	24 小时	内窥镜、彩色超声、血透仪；2025 年通过 AAHA 认证 [16]	院区公示标准化诊疗流程，术后 1-3 天回访
芭比堂望京动物诊疗中心	北京市朝阳区	24 小时应急响应机制	以外科骨科、猫科、眼科为特色；设独立猫诊区与低应激设施；2025 年通过 AAHA 认证	需电话确认当日急诊排班
芭比堂玉泉路总院	北京市石景山区玉泉路	以院区公示为准	2025 年通过 AAHA 认证	需电话确认
北京新天地国际动物医院（ICVS）	北京市（官方定点狂犬免疫单位）	需电话确认	提供中英文服务、疫苗套餐、绝育 / 洁牙 / 寄养	幼犬疫苗套餐约 900 元、幼猫约 1050 元、成猫年度套餐约 900 元、成犬约 990 元（含免疫红本，套餐价，常为折扣价）

⚠ AAHA 认证是针对具体院区的，不是针对品牌。同品牌其他院区不等于同一标准。以上地址与价格来自公开报道与医院公示，可能已调整，出发前请以电话 / 官方小程序为准。

三、已核实院区（成都）

院区	地址	急诊	能力
瑞派咪琳宠物医院·天府总院（重症转诊中心）	成都市双流区怡心街道剑和路一段 406 号附 201-207 号（近南湖立交）	全年 24 小时，承诺 5 分钟响应	CT、1.5T 超导核磁、DR、心超、血液透析机、高压氧舱、内窥镜、ICU 吸氧监护舱；中国兽医协会 [8] 五星级宠物医院、四川省宠物医院重症转诊中心，可提供救护车接诊与全省转诊
瑞派咪琳宠物医院·锦江转诊中心	成都市锦江区银木街 80、84 号一层	全年 24 小时	覆盖城东片区，重症转诊

四、其他主要城市：怎么自己找

- 上海：新瑞鹏旗下安安宠医布局约 16 家重点分院；中心医院可提供夜间急诊，排班需实时确认。
- 杭州：约 19 家重点分院（含美联众合 11 家 + 安安宠医 8 家）。
- 苏州：安安宠医约 13 家重点分院。广州 / 深圳 / 佛山：安安宠医有布局。
- 通用查法（推荐）：地图 App 搜「24 小时宠物医院」或「宠物医院夜间急诊」→ 只保留带新瑞鹏 / 美联众合 / 安安宠医 / 芭比堂 / 瑞派等品牌标识的门店 → 逐个打电话确认「今晚是否有急诊医生在岗、能否做 CT / 拍片 / 急诊手术」。

✅ **提前建档：**今天就把家附近 2–3 家医院（1 家社区 + 1 家 24h 中心）的电话存进手机，并把最近的化验单、疫苗本拍照存相册。真到急症那晚，你不会有心情现搜。

五、价格参考（公开渠道区间，一线城市为主）

项目	参考区间	说明
普通挂号	10–50 元	专家号可达 50 元；连锁社区医院常 10 元
夜间 / 急诊挂号	夜诊 50–100 元；22:00 后急诊 100–200 元	北京转诊中心：夜诊 100 元、夜间急诊号 200 元
体格检查	30–80 元	北京转诊中心公示 30 元
血常规	40–200 元	仪器不同差异大
生化（项目数不同）	150–600 元	术前基础生化常见 200–400 元
犬细小 / 犬瘟 / 猫瘟快检	50–100 元/项	试纸板快检
X 光（DR）	100–500 元/张（按部位计价）	骨科常需多体位
腹部 B 超	195–400 元	心脏彩超通常更贵（300–800 元）
CT	700–2500 元	北京转诊中心急诊 CT 公示 700 元
MRI 核磁	2000–5000 元	需麻醉，多用于神经科
犬四联 / 八联疫苗	60–300 元/针	品牌差异大
猫三联疫苗	120–250 元/针	—
狂犬疫苗	50–200 元/针	—
体内驱虫	30–80 元/次（按体重）	拜宠清等品牌
体外驱虫	90–150 元/次（按体重）	大宠爱等滴剂
公猫 / 公犬绝育	300–1500 元	含麻醉与基础用药，术前检查另算
母猫 / 母犬绝育	500–2500 元	一线城市明显更高，母犬最贵
洁牙（麻醉）	500–2000 元	含麻醉与术前检查；拔牙另计 2000 元/颗量级
住院	普通 100–300 元/天；ICU/VIP 300–800 元/天	传染病隔离更贵
输液治疗	100–300 元/天	视用药而定
24 小时监护	80–150 元/小时	ICU 吸氧监护
犬瘟 / 细小治疗	≥300 元/天 + 住院费	疗程通常 5–10 天

💡 **地区差价巨大：**同一台绝育，北京可能是三四线城市的 3 倍。看到「低价引流套餐」要问清是否含麻醉监护、术前检查、术后用药、拆线复查——不加这些才是真便宜。

六、「靠谱宠主」就诊四问（照抄即可）

1. 这项检查是干什么用的？不做会怎样？——判断必要性，也判断医生是否愿意解释。
2. 有没有更便宜或创伤更小的替代方案？费用差多少？——正规医院不会回避这个问题。
3. 如果这里处理不了，转诊到哪家？你们协助联系还是我自己联系？——看院区的分级与转诊机制。
4. 术后多久回访、谁来回访、复诊怎么安排？——规范院区通常术后 1-3 天回访。

✅ 避坑信号：① 不给纸质 / 电子明细、只报总价；② 拒绝你带走化验单和影像；③ 上来就推荐一套「必做套餐」且不允许逐项删减；④ 不给诊断依据就让你长期吃某种保健品；⑤ 夜间只说「先交押金再说」。遇到这些，可以礼貌要求转诊。

💡 宠物保险可以作为大病缓冲：年费大致 500-2000 元区间，覆盖比例与免赔额差异很大，投保前重点看：是否覆盖本品种高发遗传病、是否有单次限额、等待期多久、是否需先到定点医院。

附录C·危险食物、毒物与植物清单（含中毒剂量）

以下剂量换算自 ASPCA 动物毒物控制中心^[15]、《默沙东兽医手册^[2]》及公开同行评议文献，已于 2026-10-01 逐条回查。「没有安全剂量」的条目，一律按紧急处理——个体差异极大，有的猫狗吃一两颗没事，有的直接急性肾衰。

物质	中毒机制	参考中毒剂量	主要症状与时间窗
巧克力（可可碱 + 咖啡因）	甲基黄嘌呤，抑制腺苷受体，中枢兴奋 + 心血管毒性	约 20 mg/kg 可可碱出现轻度症状；40–50 mg/kg 心脏症状；60 mg/kg 抽搐风险；犬报告口服 LD50 约 100–200 mg/kg	1–4h 呕吐、烦躁、多饮；4–12h 心动过速、心律不齐；12–36h 震颤、抽搐。可可碱浓度：可可粉 ≈20 mg/g、烘焙巧克力 ≈16 mg/g、黑巧 (70–85%) ≈10 mg/g、牛奶巧克力 ≈2 mg/g、白巧克力 ≈0.04 mg/g。黑巧毒性约为牛奶巧克力 4–5 倍 ，烘焙巧克力 / 可可粉最高
葡萄 / 葡萄干 / 提子 / 黑加仑	酒石酸（tartaric acid，2021 年研究提出，默沙东已采用），急性肾损伤	无安全剂量 。默沙东口径： 每 4.5 kg 体重超过 1 颗 即有肾损伤风险；文献报告最低致毒量：葡萄约 19.6 g/kg 、葡萄干约 3 g/kg （葡萄干约为葡萄的 3–5 倍）。个别犬 1–2 颗即发病	6–12h 呕吐、精神沉郁、厌食；24–72h 血肌酐 / 尿素氮升高、少尿或无尿。 18 小时内治疗预后明显更好 ；无尿者预后差
木糖醇（无糖口香糖、部分花生酱、牙膏、代餐、部分液体药物）	双重毒性：胰岛素骤释 + 肝坏死	约 0.1 g/kg (100 mg/kg) 即可致低血糖； >0.5 g/kg (500 mg/kg) 有急性肝坏死风险。1 粒 5 g 无糖口香糖对 5 kg 犬即危险	30–60 分钟内呕吐、虚弱、共济失调、抽搐（最快的一类）；肝损伤多在 12–72h 后显现。 猫不受影响 （犬是唯一报告中中毒的家养动物）
洋葱 / 大蒜 / 韭菜 / 葱（葱属）	有机硫化物（正丙基二硫化物）破坏红细胞膜，溶血性贫血	犬：生洋葱 15–30 g/kg；猫：5 g/kg （或不到 1 茶匙熟洋葱）。 大蒜毒性约为洋葱 3–5 倍 ；粉状 / 脱水 / 洋葱汤料等浓缩制品毒性远高于新鲜； 加热不破坏毒性	迟发 1–5 天 ：牙龈苍白、精神差、无力、运动不耐、尿色变红至酱油色、黄疸。海因茨小体形成 24h 内出现，溶血常在 3–5 天后。重症需输血。秋田、柴犬、珍岛犬等品种更敏感
百合（对猫剧毒）	确切毒素未明（疑为水溶性糖苷类），致急性肾小管坏死	任何部位、任何剂量都危险 ，包括花瓣、茎叶、花粉、插过花的水	2–6h 流口水、呕吐、精神沉郁；12–36h 出现肾损伤；不治疗常于 3–7 天内肾衰死亡。 接触后 6 小时内开始积极输液预后最好 ；超过 18–24h 才治疗、或已无尿者预后差
澳洲坚果	机制未明，主要影响犬	犬约 2.4 g/kg （约每 0.45 kg 体重 1 颗）	3–12h 后肢无力、震颤、呕吐、体温升高（可达 40 °C）；多数 24–48h 支持治疗可恢复，极少致死
酒精 / 含酒精甜点 / 生面团	中枢抑制 + 低血糖	纯乙醇口服致死量 约 5.5–7.9 g/kg （换算 40 度白酒约 14–20 ml/kg，10 kg 犬约 140–200 ml）；生面团在胃内发酵产醇并致胃扩张扭转	30–60 分钟起共济失调、呕吐、体温低、呼吸抑制、低血糖；严重可昏迷、呼吸停止
咖啡 / 浓茶 / 能量饮料	咖啡因（与可可碱同类）	约 14 mg/kg 起轻度症状，50 mg/kg 以上重度；与可可碱类似	烦躁、心跳快、震颤、呕吐；严重可抽搐。咖啡渣、浓缩咖啡豆浓度最高
牛油果（果皮 / 果核）	persin	果肉少量多为轻度胃肠不适；果核对犬猫主要是异物梗阻风险；persin 对鸟类、兔等更毒	呕吐、腹泻；果核可致肠梗阻需手术
熟骨头 / 高盐食物 / 肥肉	物理损伤 / 钠中毒 / 胰腺炎	熟禽类骨头易碎成尖片； 钠离子约 4 g/kg 可致钠中毒 （常见于大量酱油、盐、橡皮泥）	窒息、便血、呕吐；后肢无力、抽搐（钠中毒）；剧烈呕吐腹痛（胰腺炎）

 **猫的额外禁忌：**① **氯菊酯（permethrin）** 犬用滴剂——猫皮透约 100 mg/kg 即可致死性中毒，舔到刚用药的狗也会中毒；② **对乙酰氨基酚 / 布洛芬**——一颗人用感冒药就可能致命；③ 猫乳糖不耐，牛奶易致腹泻，应改用宠物羊奶粉；④ 百合科植物、部分精油（茶树、尤加利）慎用。

二、有宠家庭「黑名单」植物（重点提防）

植物	风险对象	危害
百合（含虎皮百合、亚洲百合、复活节百合、部分萱草）	猫（剧毒）	急性肾衰竭，花粉 / 花蕊 / 花瓶水均可致毒
绿萝 / 龟背竹 / 滴水观音 / 万年青	猫犬	含不溶性草酸钙，口腔剧痛、流涎、呕吐、严重时喉部肿胀
夹竹桃	猫犬	强心苷，心律不齐、猝死
杜鹃花 / 山茶科部分	猫犬	灰木毒素，呕吐、心律异常、抽搐
秋水仙 / 铃兰 / 洋地黄	猫犬	强心苷类，心律失常
一品红（圣诞红）	猫犬	多为胃肠刺激、呕吐腹泻，严重性常被高估但也不宜啃
水仙 / 风信子 / 郁金香球茎	猫犬	球茎毒性最强，呕吐、腹泻、心律异常
苏铁（铁树）	猫犬	苏铁素，肝衰竭，尤其种子
菊花 / 除虫菊	猫犬	除虫菊酯，流涎、震颤、共济失调
猫薄荷以外的精油（茶树、尤加利、柑橘等）	猫（尤其敏感）	肝代谢能力差，精油慎用；茶树精油中毒常见

 **安全替代：**猫草（小麦草 / 燕麦草）、猫薄荷、吊兰、波士顿蕨、竹芋、散尾葵、酒瓶兰、空气凤梨、多肉（非大戟科）。买植物前先查 ASPCA 的 Toxic and Non-Toxic Plants 数据库，比「网红经验」靠谱。

三、误食后 60 分钟：家庭处置流程

1. **先确认「是什么、吃了多少、什么时候吃的、宠物体重」**，写在纸上或手机备忘录——急诊医生问的就是这四个，答不上来会浪费最宝贵的十几分钟。
2. **保留物证：**包装袋、巧克力纸、植物残株、呕吐物（可装袋）。
3. **立刻打电话给最近的 24 小时医院（或新瑞鹏集团全国统一调度热线），**按医生指示决定是否就医。
4. **不要自行催吐，**除非兽医明确指示。
5. **不要喂牛奶、油、醋、蛋清或所谓的「解毒偏方」，**这些常使情况更糟。
6. **不要喂人用药（尤其对乙酰氨基酚、布洛芬、人用止吐药）。**

 **禁止催吐的情形：**① 摄入腐蚀性物质（酸碱、清洁剂）；② 石油类 / 有机溶剂；③ 宠物已意识不清、抽搐、呼吸急促；④ 摄入已超过 2 小时（多数情况下意义有限）；⑤ 圆钝异物或尖锐异物（催吐可能致穿孔）；⑥ **摄入木糖醇**（低血糖可突然发生，催吐可能加重）。**催吐必须由兽医决定并用药。**

四、出门去急诊前，打包这些

免疫本 / 疫苗记录

最近的化验单照片

常用药与保健品清单

宠物病历 / 芯片号

呕吐物或包装袋

航空箱 + 毛毯（保体温）

主人身份证与支付方式

医院电话（提前存好）

 **保暖：**休克和中毒动物极易失温，毛毯比什么都重要。**搬运：**疑似骨折或脊椎损伤的动物用硬板平托，不要抱起来晃。**途中：**抽搐时移开周围硬物，不要把手伸进嘴里。

附录D·急诊速查卡（红旗信号·生命体征·出门清单）

把这一页截图存手机。真的出事那天，你需要的不是知识，是**顺序**。

一、这些情况，立刻去医院（不要等天亮）

呼吸系统

张口呼吸（猫尤其危险）

舌头 / 牙龈发紫

呼吸超过 40 次/分钟且费力

异响、喘鸣

泌尿系统

猫频繁蹲猫砂盆但尿不出（**尿道梗阻，24 小时内可致死**）

尿中带血

超过 24 小时无尿

消化系统

一天内多次呕吐 + 精神差

呕吐物带血 / 咖啡渣样

腹部膨大坚硬且疼

便血 / 黑便

神经症状

抽搐

突然歪头、转圈、眼球震颤

后肢突然瘫软

意识不清

创伤与意外

车祸 / 坠楼（哪怕看起来没事，也要拍片查内出血）

被咬伤（伤口小但感染风险高）

大量出血

误食毒物 / 药物

难产与生殖

用力超过 30 分钟无产出

间隔 2 小时以上无下一胎

阴道出血

子宫蓄脓征象

二、生命体征正常值（成体，已核对默沙东参考值）

指标	犬	猫
体温（肛温）	37.5–39.2 °C	38.1–39.2 °C
心率	静息 70–120；临床分诊 60–160（体型越小越快）	静息 120–140；临床分诊 140–220
呼吸（静息）	18–34 次/分	16–40 次/分
毛细血管再充盈时间 CRT	< 2 秒	< 2 秒
成年体重参考	按品种差异极大，看 BCS 更重要	3–5 kg 常见

💡 测体温用宠物专用电子体温计，肛温。猫正常体温比人高，摸起来「有点烫」是正常的，别据此判断发烧。静息呼吸持续 >35 次/分、或明显费力，就该联系兽医。不同来源的参考值略有出入，以你家宠物健康时测出的基线最有意义。

三、出门前 5 分钟清单

1. 打电话确认：今晚是否有急诊医生在岗、能否做你需要的检查。
2. 带上免疫本、病历、正在服的药、误食物包装。
3. 航空箱铺毛毯，冬天加暖水袋（包毛巾，防烫伤）。
4. 疑似中毒：别催吐，带上物证直接走。
5. 昏迷 / 抽搐：保持气道通畅，记录发作时间与持续秒数，途中录像给医生看。

附录E·核对与勘误表（2026-10-01 逐条回查）

这一页是**证据公开**：把本手册涉及的权威数据在 2026-10-01 逐条回查原始来源，列出「上一版怎么写 / 核对结论 / 本手册采用什么 / 依据」。**✕ 已修正** = 数值有误已改；**Δ 已校准** = 表述不够严谨已改准确；**✓ 无误** = 核对后确认正确。

核对项	上一版写法	结论	本手册采用	依据来源
洋葱中毒剂量	犬约 5 g/kg（20 kg 犬约 1 个中等洋葱）	✕ 已修正	犬 15–30 g/kg；猫 5 g/kg（或不到 1 茶匙熟洋葱）	默沙东 ^[21] 《Garlic and Onion (Allium spp) Toxicosis》
大蒜毒性倍数	约为洋葱 5 倍	△ 已校准	约为洋葱 3–5 倍	默沙东 / 同行评议文献
葡萄 / 葡萄干剂量	葡萄约 4 g/kg、葡萄干约 11 g/kg	✕ 已修正	默沙东：每 4.5 kg 体重超过 1 颗即有风险；最低致毒量葡萄约 19.6 g/kg、葡萄干约 3 g/kg	默沙东《Food Hazards》
葡萄中毒机制	机制未完全明确（主流假说为酒石酸）	△ 已校准	酒石酸（tartaric acid，2021 年研究提出，默沙东已采用）	Vet Emerg Crit Care 2021 / 默沙东
澳洲坚果剂量	犬约 2 g/kg	△ 已校准	犬约 2.4 g/kg	ASPCA ^[15] APCC（Hansen 2002）
酒精剂量	约 5 ml/kg 的 40 度烈酒即可致中枢抑制	✕ 已修正	纯乙醇致死量约 5.5–7.9 g/kg（换算 40 度白酒约 14–20 ml/kg）	AKC / ACVP 毒物清单
木糖醇剂量	>0.1 g/kg 低血糖、>0.5 g/kg 肝损	✓ 无误	维持；补充「猫不受影响」	默沙东《Xylitol Toxicosis》/ ASPCA APCC
巧克力阈值	20 / 40–60 / 100–200 mg/kg	✓ 无误	维持；补全各品类可可碱浓度	默沙东 / ASPCA APCC
牙周病比例	3 岁后约三分之二以上	△ 已校准	约 80% 的犬、70% 的猫（3 岁前）	AVMA / 美国兽医牙科学会
猫正常体温	37.8–39.2 °C	△ 已校准	38.1–39.2 °C	默沙东参考值表
犬静息心率	60–160 次/分	△ 已校准	静息 70–120；临床分诊 60–160	默沙东参考值表
猫呼吸频率	20–40 次/分	△ 已校准	16–40 次/分（静息；>35 需就医）	默沙东参考值表 / 康奈尔医
钩端螺旋体犬核心疫苗	AAHA 2024 ^[4] 已列入犬核心疫苗	✓ 无误	维持；补充 ACVIM ^[5] 2023 共识（12 周龄以上全犬只）	AAHA 2024 Update / ACVIM 2023
CVMA ^[8] 2026 两份指南	《猫临床应激管理指南 ^[9] （2026 版）》《犬猫运动功能障碍临床诊断路径指南 ^[10] （2026 版）》	✓ 无误	维持；补全 FCSGS 分级 I–IV 级 + CSS 7 分制、DAMNIT-V + 改良 Frankel 5 级	中国兽医协会官网
GB/T 45295 ^[12] -2025	2025-08-01 实施	✓ 无误	维持；补发布日 2025-01-24、归口 TC541	全国标准信息公共服务平台
氯菊酯对猫	剧毒可致死	✓ 无误	补充：皮透约 100 mg/kg 即可危及生命；286 例中 10.5% 死亡；用药后 72 小时内隔离	ANSES / VPIS / iCatCare

核对项	上一版写法	结论	本手册采用	依据来源
体况评分（BCS）	9 分制，犬 4–5、猫 5 为理想	✓ 无误	补充：每 1 分 ≈ 体脂 5%；理想体脂率约 20%；美 2022 年约 59% 犬 / 61% 猫超重或肥胖	WSAVA 营养 [6] 指南 / 默沙东
疫苗免疫期（DOI）	核心疫苗加强后保护力可持续 3 年以上	✓ 无误	补充：WSAVA [3] 明确不应比每 3 年更频繁；14–16 周完成犬核心系列约 98% 获多年保护；抗体检测自 20 周龄起可做	WSAVA 2024（JSAP, DOI 10.1111/jsap.13718）

本次新增的权威来源（上一版未收录）

- **GB/T 45204 [13]** -2025《宠物经营场所环境清洁与消毒指南》（国标，2025-08-01 实施）——按污染风险三级分区，可直接用来判断洗美 / 寄养场所是否规范。
- **NY/T 4825 [14]** -2025《犬猫吸入麻醉操作技术规范》及同期三项农业行业标准（犬猫心肺复苏、经胸超声心动扫描、急性胰腺炎超声诊断），2026-05-01 起实施——麻醉与急救的规范底线。
- **T/CVMA 199 [7].1 / 199.2 / 199.3-2024《犬猫临床营养管理指南》**（皮肤病 / 肥胖症 / 胃肠道疾病）——减重与处方粮的国内依据。
- **T/CVMA 195-2024 糖尿病筛查诊断、197-2024 全血输注、198-2024 输血不良反应分类、138-2024《繁育犬福利规范》。**
- 《犬只狂犬病免疫接种点建设与管理规范》等 7 项团标（中国兽医协会，2026-05-26 发布）。
- **CVMA 动物福利友好评价体系（2023 版）**：伴侣动物福利友好医院、猫友好医院、动物福利友好繁育舍 [11]（犬 / 猫）——找「猫友好」医院时可以认这个标识。

💡 **数据的时效边界**：毒物剂量、疫苗程序、参考值属「指南共识级」证据，稳定但会有版本更新；**医院地址、电话、价格、夜间排班属「易变信息」**，请以出发前电话确认为准。任何一条数据，如果你在原文里看到与本文不一致，欢迎以最新原始来源为准并告知我们修正。

附录F · 内容来源与出处对照

犬篇没有同名底本，各章为本手册独立撰写；写作过程中逐章与猫的常见结论做了比对，并把疾病、用药、疫苗相关的判断锚定到权威来源。表中「引用来源」编号与正文中的 [n] 上标、以及**附录H**的清单一一对应。

章节	内容来源	本章引用的权威来源
第 1 章 · 新手养狗30问	本手册独立撰写：选犬成本与 30 问，依据犬的行为学共识与饲养成本调研	[8]、[11]
第 2 章 · 犬的行为与心理	本手册独立撰写：犬的行为语汇与需求，依据犬类行为学；并与猫的结论逐项比对	—
第 3 章 · 幼犬到家注意事项	本手册独立撰写：幼犬到家流程，依据犬的行为发育规律与福利要求	—
第 4 章 · 训练与建立感情	本手册独立撰写：社会化窗口与训练，依据犬类学习理论（正向强化）	—
第 5 章 · 犬与人类的共生史	本手册独立撰写：犬的驯化史与共生关系，依据考古与遗传学研究综述	—
第 6 章 · 狗粮	本手册独立撰写：犬的营养需求，依据犬猫营养学共识与处方粮标准	[8]、[11]、[18]
第 7 章 · 生骨肉与鲜食	本手册独立撰写：生食与鲜食的风险评估，并与猫的对对应结论比对	—
第 8 章 · 零食	本手册独立撰写：零食与训练奖励，依据行为训练与营养学的交叉要求	—
第 9 章 · 营养品	本手册独立撰写：补剂适用边界，依据犬猫营养学共识	—
第 10 章 · 绝育	本手册独立撰写：不同体型犬的绝育时机，依据骨科与肿瘤学证据	—
第 11 章 · 驱虫与心丝虫	本手册独立撰写：驱虫与心丝虫预防，依据犬的寄生虫流行病学	—
第 12 章 · 疫苗	本手册独立撰写：犬核心疫苗程序，依据免疫学共识与国内法规	[4]、[5]
第 13 章 · 口腔与牙结石	本手册独立撰写：口腔护理，依据兽医牙科学共识	—
第 14 章 · 呕吐、拉稀、外伤与中暑	本手册独立撰写：犬的急症谱（GDV、中暑、外伤），依据急诊医学共识	—
第 15 章 · 新手狗家长购物清单	本手册独立撰写：养狗装备清单，依据饲养实务并为猫清单做犬版对照	—

章节	内容来源	本章引用的权威来源
第 16 章 · 幼犬到家 30 天清单	本手册独立撰写：到家 30 天清单，依据幼犬适应期管理实务	[8]、[11]
第 17 章 · 养狗进阶好物	本手册独立撰写：提升生活质量的装备，并与猫的对对应结论比对	—
第 18 章 · 怎么给狗剪指甲、挤肛门腺？	本手册独立撰写：剪指甲与肛门腺护理，依据临床操作规范	—
第 19 章 · 夏天要给狗开空调么？	本手册独立撰写：犬的散热与夏季管理，依据犬的体温调节特点	—
第 20 章 · 狗狗出远门：宠物托运	本手册独立撰写：托运与出行，依据运输福利要求与实务	[8]、[11]
第 21 章 · 狗碗怎么选？	本手册独立撰写：食盆选择与抬高食盆风险，依据 GDV 相关研究	[17]
第 22 章 · 如何给狗狗拍出漂亮照片	本手册独立撰写：宠物摄影实务	—
第 23 章 · 狗狗掉毛多怎么办？	本手册独立撰写：被毛管理与掉毛应对，依据毛型与皮肤科要求	—
第 24 章 · 有狗家庭的植物与食物黑名单	本手册独立撰写：犬的毒物黑名单，依据毒理学剂量数据	—
第 25 章 · 拓展阅读：行为学、病理学	本手册独立撰写：进一步阅读与免费资源	[2]、[3]、[7]、[8]、[11]、[15]

附录G · 对照与差异说明

本附录把正文中所有**对照与差异说明**集中在一起，按章编号；正文每章末尾都有指向这里的链接。

G.2 · 第 2 章 犬的行为与心理

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是**与猫相反、最容易照搬出错**的地方。

维度	猫的常见做法	犬的做法
安全感来源	来自环境——需要有可躲的空间、高处、退路	⚠️ 来自主人——你不在就是压力
社会性	独居/半独居，独自生活不构成“孤独”	⚠️ 群居，独处需要专门训练
社会化窗口	2-8 周	⚠️ 3-16 周，内容更多、影响更大
可训练性	能理解但懒得配合，训练收益有限	⚠️ 最可训练的动物之一，用正向强化
与人的关系	平等朋友，不认主	⚠️ 明确依恋对象与秩序感
喂食方式	可自助（干粮一周投放）	⚠️ 必须定时定量；深胸品种有胃扭转风险
洗澡频率	可以不洗（自洁）	⚠️ 2-4 周一次
被摸肚皮	多数不喜欢，会咬	⚠️ 多数喜欢
剪指甲	前爪每周、后爪 2-3 周	⚠️ 每 3-4 周一次
日常投入	每天 20-30 分钟互动 + 铲屎	⚠️ 每天 2 次外出 + 1-2 小时运动 + 陪伴
每天睡	15 小时左右	成年 12-14 小时，幼犬 18-20 小时
怕冷怕热	怕冷也怕热，喜欢与人相近的温度	⚠️ 显著怕热，散热效率极低
寿命	12-18 岁（体型与寿命无明显反向关系）	⚠️ 体型越大寿命越短，大型犬常不到 12 年

G.6 · 第 6 章 狗粮

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

维度	猫的常见做法	犬的做法
食性	绝对肉食动物，几乎不能利用碳水	杂食动物，可有效利用淀粉与纤维
粗蛋白“好粮线”	≥35%（干基）	22-30%（干基） ；过高反而增加肾负担
大型犬幼犬钙	钙磷比 1.1-1.3:1	必须严格控钙（约 1.0-1.8% 干基），过量直接导致骨软骨病与髌关节发育异常
“无谷”风险	无谷 ≠ 更健康（已澄清）	⚠️ 另有 FDA 对无谷 ^[18] /高豆类粮与犬 DCM 关联的调查，更不宜盲目追求
主食罐性价比	价格是同级猫粮约 5 倍	3-5 倍 ，但大型犬吃得多，湿粮成本更不划算
挑食性质	多为生理性（味觉简单）	⚠️ 多为行为性（被训练出来的），要靠规律喂食纠正
混吃风险	猫吃狗粮 → 牛磺酸缺乏（慢性）	狗吃猫粮 → 肥胖与胰腺炎；猫吃狗粮 → 数小时可致死（精氨酸缺乏）

G.7 · 第 7 章 生骨肉与鲜食 五、口径的犬版修正（4 处）

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的常见做法	犬的做法	为什么
冷冻 -20 °C / 15 天灭活寄生虫	⚠️ 家用冷冻不可靠；熟骨头绝对禁止	犬啃骨力量大，熟骨碎裂成尖片 → 食管/肠道穿孔，是犬最常见的外科急症之一
驱虫每 3 个月（因生食）	每 3 个月粪检 + 驱虫，另加全年心丝虫预防	心丝虫是蚊媒传播，与吃不吃生食无关；犬心丝虫感染比猫严重得多，可致心衰
配方比例（猫：全肉 + 内脏 + 钙粉）	犬：蛋白源 50–70% + 植物成分 20–40% + 内脏约 10% + 钙源	犬是杂食动物，零植物成分的配方并非其自然食谱
“生肉是猫咪的完美食物”	犬是兼性杂食，“纯肉才天然”不成立	犬可自行合成牛磺酸、可有效利用淀粉，天然食谱本就含植物内容物

G.8 · 第 8 章 零食

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

维度	猫	犬
零食的作用	主要用于安抚与建立好感	⚠️ 核心用途是训练奖励（食物驱动强、可训练性强）
量化上限	≤10% 日热量	≤10% 日热量（绝对值大得多）
骨头类零食	风险存在但较低	⚠️ 风险显著更高：窒息、肠梗阻、熟骨穿孔——犬最常见的零食相关急症
高脂零食	相对少见于急性胰腺炎	⚠️ 急性胰腺炎是犬的高发急症，与高脂零食/换粮直接相关；雪纳瑞、可卡、腊肠等品种风险更高
训练用法	正向强化有效，但配合度低	⚠️ 可训练性极强，每日 5–10 分钟短训练 + 高价值奖励，见效远快于猫

G.9 · 第 9 章 营养品

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

维度	猫	犬
基础结论	“营养品意义不大”	同样成立 ✓（全价犬粮已配平）
关节营养	老年猫、折耳猫等属辅助	⚠️ 犬的需求与证据远强于猫：髌关节发育不良、十字韧带断裂、骨关节炎高发，尤其大型犬
Omega-3	关节炎、肾病、皮肤病（中等证据）	同样有效，且犬的证据基础更厚（肾病、皮肤、关节）
膳食纤维	猫需求低（肉食动物）	⚠️ 犬可且应利用纤维：肠道健康、饱腹感（减肥）、肛门腺
“排毛球”需求	猫草/化毛膏是真实需求	⚠️ 犬不需要“化毛”；掉毛靠梳毛与皮肤管理
钙补充	吃商业粮的猫绝不能额外补钙	⚠️ 犬同理，且大型犬幼犬补钙会直接损伤骨骼发育

G.10 · 第 10 章 绝育

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

维度	猫	犬
时机结论	可一刀切：6-8 月龄（国际趋势 4-6 月龄），“首次发情前”逻辑清晰	⚠️ 必须按体型分档：小型犬 6 月龄前后可；大型/巨型犬常建议 12-18 月龄（等生长板闭合），需权衡关节 vs 乳腺肿瘤
收益确定性	几乎一边倒（子宫蓄脓、乳腺肿瘤、FIV/FeLV 传播）	需加权：母犬子宫蓄脓仍然明确，但过早绝育与关节/肿瘤风险相关
体重影响	术后代谢降 20-30%，需减量	⚠️ 更严重：大型犬增重直接加重关节负担，是髌关节与十字韧带的重要诱因
行为影响	发情期躁动、喷尿标记明显减少	⚠️ 绝育不能替代训练。标记行为、攻击、分离焦虑主要靠行为干预
手术风险	低（小手术）	⚠️ 与体重正相关：大型犬麻醉与出血风险更高，更需要术前血检与监护

G.11 · 第 11 章 驱虫与心丝虫

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

维度	猫	犬
心丝虫	感染后常无特效治疗，以预防为主；猫非理想宿主，但感染后果可能急性致死（HARD）	⚠️ 犬是天然终末宿主，成虫可存活数年致心衰；有治疗药物（需住院、有风险），但预防远优于治疗
完全室内猫可1-2年驱一次	⚠️ 该结论不能套用到犬	犬必须全年每月预防心丝虫（蚊媒，与是否出门无关）
蜱媒病	相对少发	⚠️ 犬的蜱媒病危害远大于猫：巴贝斯虫、莱姆病、埃立克体、无形体——可致贫血、肾衰
基因敏感	较少提及	⚠️ MDR1/ABCB1 突变犬种（柯利、喜乐蒂、澳牧等）对伊维菌素类高度敏感，常规剂量可致死
用药红线	猫禁用氯菊酯（犬用滴剂）	犬的禁忌少，但必须按体重给药；犬用与猫用绝不能互换

G.12 · 第 12 章 疫苗

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

维度	猫	犬
核心疫苗组成	猫三联（FPV/FHV/FCV）+ 狂犬	⚠️ 犬瘟+腺病毒+副流感+细小 + 狂犬 + 钩端螺旋体（AAHA 2024 [4] 升为核心）
首针与终点	6-8 周首针，间隔 2-4 周，打到 ≥16 周龄	完全相同 ✓
补强间隔	每 1-3 年，或做 titer	完全相同 ✓
狂犬	建议家养猫可不打（争议）	⚠️ 犬是法定强制：办证、年审、出行、出境必备，无商量余地
人畜共患防护	狂犬是唯一重要的人畜共患疫苗	⚠️ 钩端螺旋体也是人畜共患，通过尿液污染水/土壤感染人，是犬核心疫苗升级的真实理由
过敏反应	面部肿胀、呕吐、瘫软	相同，且犬更常见注射部位肿胀与全身荨麻疹

G.13 · 第 13 章 口腔与牙结石

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

维度	猫	犬
3 岁前牙周病比例	约 70%	⚠ 约 80% （犬更高）
牙石沉积速度	较快	⚠ 更快，且大型犬裂齿与后臼齿最先受累
特有并发症	牙吸收病变（FORL），约 1/3-2/3 成年猫	⚠ 口鼻瘘、眼眶下脓肿、牙冠骨折（啃硬物）、牙齿磨耗
刷牙可行性	：“违反猫性，做不到就算了”	⚠ 犬可训练、可操作，配合度远高于猫；“做不到就算了”这条不适用于犬
家庭手段	刷牙 > 洁牙咬胶 > 漱口水（效果有限）	相同 ✓，但犬多了“洁牙处方粮”这一有效选项
硬物风险	较小	⚠ 犬啃硬物导致牙冠骨折是常见急症——“指甲敲击发出清脆响声”的东西都不能给

G.14 · 第 14 章 呕吐、拉稀、外伤与中暑

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

急症	猫	犬
胃扭转（GDV）	几乎不发生	⚠ 深胸大型犬高发的分钟级致命急症：干呕吐不出 + 腹部鼓胀 = 立刻送医
中暑	几乎不发生（不出门、不狂奔）	⚠ 犬的高频急症：散热效率极低；短头颅犬与厚毛犬风险最高；车内 10 分钟即可致死；用常温水救援，不用冰水
异物梗阻	多为线绳、皮筋、塑料（易致肠套叠）	⚠ 多为玩具、袜子、玉米芯、骨片；熟骨穿孔是犬独有风险
便血	结肠炎、寄生虫、异物	⚠ 出血性胃肠炎（HGE）：突然大量鲜红血便 + 精神骤降，需立即输液
腹痛表现	弓背、腹部贴地、躲藏	⚠ 犬有典型“祈祷姿势”（前趴后抬）——看到这个姿势要立刻想到胰腺炎/腹痛
咬伤	猫抓伤（人需警惕猫抓病）	⚠ 犬咬伤表面小孔、皮下空腔，48-72 小时易脓肿/气胸；人被流浪犬咬伤需按狂犬暴露处置

G.15 · 第 15 章 新手狗家长购物清单

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的常见做法	犬的做法	差异关键点
入门 8 件：猫粮、水粮碗、猫厕所、猫砂、逗猫棒、指甲剪、猫包、梳毛器	犬入门 12 件：狗粮、宽口不锈钢食盆、水碗、牵引绳 + 胸背带/项圈、犬牌 + 免疫证、航空箱或车载安全带、拾便袋、磨牙咬胶/耐咬玩具、犬用指甲剪、毛刷（按毛型选）、电子秤、响片 + 训练零食袋	⚠️ 牵引是法定要求（多数城市《养犬管理条例》规定外出必须束犬链），猫的“牵引绳可选”不适用于犬。犬牌/芯片/免疫证也是猫没有的必需品
猫厕所 + 猫砂（最大的两项支出）	犬没有对应物——犬在户外排泄，需要的是拾便袋 + 固定遛狗路线 + 排泄训练	⚠️ 猫是“室内排泄管理”，犬是“户外排泄训练”，这两件事没有可比性。犬的开销重心在运动与训练用品
猫包 / 航空箱「至少准备一个」	犬必须同时具备：① 航空箱（托运/就医/应急）；② 车载安全带或后座围栏（自驾必需，犬是车内伤亡高发原因）	⚠️ 犬的出行风险远高于猫：未固定的犬在急刹时会产生体重数倍的冲击力，既伤犬也伤车内人
逗猫棒「必需品，用于建立感情」	犬的对应物是训练零食 + 响片 + 拔河绳 + 漏食球。犬靠服从训练与共同运动建立关系，不靠逗猫棒	⚠️ 猫靠“狩猎游戏”；犬靠“训练 + 散步 + 嗅闻”。这是全书反复出现的根本差异
列出“最低配置”就够接猫回家	犬的“最低配置”更难精简——因为犬的必需品里有牵引、犬牌、训练用品、车载固定，少任何一项都会立刻影响生活或触犯法规	养犬的“入门门槛”实际高于养猫。买齐再接犬，不要边养边补

G.16 · 第 16 章 幼犬到家 30 天清单

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的常见做法	犬的做法	差异关键点
猫舍送礼包（猫粮、猫砂、航空箱等），家长只需买猫厕所 + 猫砂	正规犬舍/领养机构通常送：犬粮（过渡粮）、牵引绳、犬牌、疫苗本。家长必须自备：食盆、水碗、航空箱、拾便袋、训练零食	⚠️ 犬的“过渡粮”比猫更重要——犬的换粮不当更容易引起腹泻与呕吐；领回家后至少 7-14 天维持原粮（7 日换粮法，见第 6 章）
粮碗水碗「用人类的宽口碟」	⚠️ 犬不能用宽口浅碟。犬的对应选择是：宽口、稳定、不易推翻的不锈钢碗；进食快的犬用慢食碗；大型犬与老年犬可用抬高碗架（但有 GDV 争议，见第 21 章）	⚠️ “宽而浅”是猫的专属结论（因为猫有胡须疲劳），犬没有胡须疲劳问题，浅碟反而容易被推翻、容易被吃进空气
粮「一次放好几天的，吃完就加」	⚠️⚠️ 犬绝对不可以这样喂。犬（尤其大型深胸品种）不能自由采食：① 犬会暴食；② 一次大量进食是胃扭转（GDV）的明确诱因；犬必须定时定量，每日 2 餐（幼犬 3-4 餐）	⚠️ 这是犬猫最危险的一条差异。金毛、德牧、大丹、拉布拉多、圣伯纳等深胸犬，自由采食可能直接诱发致死性胃扭转
水「2-3 天一换」	犬的对应要求更高：水碗每天清洗、每天换新水。运动后、夏天、喂干粮的犬饮水量显著高于猫	⚠️ 犬的饮水需求大于猫（活动量大、散热靠喘气失水多）。随时保持有水，不要“2-3 天换一次”

G.17 · 第 17 章 养狗进阶好物

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的常见做法	犬的做法	差异关键点
猫爬架「100–300 元就能满足功能需要」	犬完全没有对应物。犬的环境丰容核心是运动量 + 嗅闻 (sniffing) + 益智玩具：嗅闻垫、漏食球、找零食游戏、拔河绳、耐咬玩具	⚠️ 猫的丰容是“垂直空间 + 攀爬”，犬的丰容是“地面嗅闻 + 消耗体力”。买错方向等于白花钱
智能猫砂盆（不推荐，因为看不到粪便）	犬没有对应产品。但犬有一个更重要的监测点：每天的排便形态与频次——犬在户外排泄，主人必须每天观察并记住，这是发现寄生虫、胰腺炎、异物梗阻、消化道疾病的第一手信号	⚠️ 猫是“忘了铲屎就看不到”，犬是“遛完就冲走，更容易忽略”。养犬家庭要刻意养成“看便”习惯
猫笼（临时隔离用）	犬对应的必需品是：围栏 / 围笼 (crate training)。笼内训练对犬是正向的——犬（狼的祖先）天性需要“洞穴”作为安全区，正确使用围笼可降低分离焦虑	⚠️ 与猫完全相反：猫笼长期使用有害；犬的围笼在科学训练下是有益的（前提：不是惩罚工具、时间合理、幼犬不超过 2–3 小时）
猫薄荷、痒痒挠、猫抓板	犬的对应物是：耐咬洁牙骨（选 VOHC 认证）、嗅闻垫、漏食球、拔河玩具、外出饮水瓶、宠物凉垫、车载垫	⚠️ 犬的“玩具”消耗量远大于猫，且必须选耐咬、不掉渣的——劣质玩具的碎片是犬肠梗阻的常见原因
航空箱「远距离托运必须用」	犬的更多：车载安全带 / 后座围栏 / 后备箱隔网（自驾必配），以及宠物阶梯（小型犬上下车/沙发）	⚠️ 犬的出行场景比猫多得多（每天遛、自驾、寄养），车载固定是犬独有的刚需

G.18 · 第 18 章 怎么给狗剪指甲、挤肛门腺？

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的常见做法	犬的做法	差异关键点
前爪每周剪 1 次、 后爪每 2 周剪 1 次	犬的频率低得多：一般每 3-4 周一次。但取决于活动量与地面：常在水泥/柏油路面行走的犬磨损快，可延后；室内地板多的犬、老年犬、雪橇型犬指甲长得快，需更勤	⚠️ 猫不外出、没有自然磨损 → 必须每周；犬有地面磨损 → 3-4 周即可。但绝不能拖到能听到指甲敲地板的声音
「右手拎住后颈肉控制猫」	⚠️⚠️ 犬绝对不能拎后颈。犬的保定方式：小型犬：一手托胸、一手托臀，抱在怀里，让它背靠你胸口；中型犬：坐地、犬侧躺或站立，你从侧后方环抱；大型犬：一人保定、一人剪，或让犬站在防滑垫上分次完成	⚠️ 即使幼犬也不能长期拎后颈（体重增长快）。用零食 + 抚触建立配合，不用强制
「态度要强硬，硬控 1-2 分钟」	犬的对应方法是脱敏 + 反制约：① 先只摸爪、给零食；② 只拿指甲剪、给零食；③ 剪一个指甲、给零食；④ 逐步增加数量。犬对零食的驱动力远强于猫，这套方法对犬成功率极高	⚠️ 犬靠“训练”解决，猫靠“技巧”解决。养犬家庭应该把剪指甲当成一项日常训练科目，而不是“每次都要抓一次”
血线「只剪指尖部分」	完全一致 ✓，而且犬更需要这条——犬的指甲多为黑色，几乎看不到血线，必须用“一层一层极薄地剪，看断面”的方法：断面呈灰白干燥粉状可继续；出现粉红/湿润小点立即停。也可用手机手电从指甲背面打光看阴影	⚠️ 犬的黑色指甲是新手最容易剪出血的地方。第一次宁可少剪 1 mm，也不要冒剪出血的风险
未提及悬趾（dewclaw）	⚠️ 犬的悬趾比猫更常被忽视，且部分犬后肢也有悬趾。前肢内侧高处的悬趾不接触地面、没有自然磨损，最容易长得过长而勾住织物、勾进肉垫、甚至撕裂	剪指甲时按固定顺序：左前（含悬趾）→ 右前（含悬趾）→ 左后（有悬趾则剪）→ 右后。悬趾单独留意
未提及「指甲过长的后果」	⚠️ 犬的后果比猫严重得多。指甲过长会改变站立与行走姿势，把重量压到爪垫后部与腕关节，长期可导致爪趾变形、腕关节过度伸展、跛行、继发性关节炎；过长的指甲还可能长进肉垫造成感染	犬的指甲修剪是关节健康的一部分，不只是“美观/防抓家具”的问题

G.19 · 第 19 章 夏天要给狗开空调么？

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的常见做法	犬的做法	差异关键点
「猫体温比人高 2 度，喜欢 26 °C」	犬的建议更严格：空调设 24–26 °C，且必须强调通风。犬的散热效率低于猫——猫还能靠灵活地寻找凉爽表面（瓷砖、水槽、铝盆）自行调节；犬更多依赖主人提供环境	⚠️ 犬比猫怕热。猫可以“不开空调也过夏天”，犬（尤其短鼻犬）不行
温度反应临界点表（26 °C 舒适 → 38 °C 中暑高发）	犬的表要整体前移（见上表）。原因是犬的散热方式更单一——几乎只能靠喘气（爪垫汗腺极少，蒸发效率远低于人的全身汗腺）	⚠️ 猫的 26–35 °C 表不能直接套给犬。犬在 31 °C 以上就需要主动干预
「不开空调也可以用凉席、冰垫、铝盆」	犬的对应方案：凉垫（凝胶/水冷）、抬高的透气行军床、浅水池/湿毛巾擦身、充足的饮水（可加冰块）、保持地面阴凉。但 ⚠️ 犬不能放任“自己找凉快”——被拴在院子里的犬是中暑最高发的场景	⚠️ 不要用铁链/绳拴犬在户外（很多地区也已立法禁止长期拴养）。猫会自己找阴凉，犬在限制活动的情况下会原地中暑
「35 °C 时猫会大喘气，中暑概率高」	⚠️ 犬中暑更早、更重、死亡率更高。兽医文献中犬中暑的死亡率可高达 30–50%；高危因素：短鼻（短吻）品种、肥胖、老年、厚毛双层毛犬、心肺病、剧烈运动后立即饮水大量	犬中暑是真正的急症，不是“缓一缓就好”
「猫中暑：体温 > 40 °C、爪子流汗、气喘流口水」	犬的识别信号：① 剧烈喘气、舌头伸得很长；② 舌头发紫、牙龈苍白或发暗（发绀）；③ 步态不稳、转圈、迷糊；④ 呕吐、腹泻（可带血）；⑤ 抽搐、昏迷。处理：移至阴凉处 → 常温水打湿全身（重点腹股沟、腋下、四肢）→ 风扇吹 → 边降温边送医	⚠️ 绝不用冰水浸泡：会致外周血管收缩、阻碍散热，还可能造成寒战产热。用常温水 + 风。不要强行灌水（易误吸）
未提及中暑后遗症	必补（与猫同理但更常见）：犬中暑后 24–72 小时内可发生急性肾损伤、DIC、肝损伤、脑水肿、心律失常、消化道出血。即使“看起来恢复了”也必须就医检查	发生过中暑的犬，必须做血液检查与住院观察

G.20 · 第 20 章 狗狗出远门：宠物托运

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的常见做法	犬的做法	差异关键点
四项费用：上门接猫 100–200 + 机票 100–600 + 保管费 100–200 + 配送 100–200	结构相同，但犬的总价通常更高：① 航空运费多按体重/体积计费，大型犬可能是猫的数倍；② 航空箱更大更重，同重计费更高	⚠️ 猫的 400–800 元区间不适用于大型犬。大型犬空运常需上千元
未提及检疫证明	与猫一致，且犬更常被查：《动物检疫合格证明》（当地农业农村部门/动物卫生监督机构出具）+ 狂犬疫苗在有效期内且接种满 21 天；证明有效期通常 3–7 天	⚠️ 犬属于强制免疫 + 登记管理的动物，检疫与犬牌要求比猫更严，出行前必须备齐
未提及短鼻品种禁运	⚠️ 犬的禁运名单更长、更硬：法斗、英斗、巴哥、波士顿梗、北京犬、拳师犬等短吻犬，多数航司明确禁运；部分航司还点名禁运獒犬类、比特犬等	⚠️ 短鼻猫的禁运是个别航司政策；短鼻犬的禁运是普遍规定。买犬前、搬家前就必须把这个算进方案
「航空箱里对猫来说差不多等于一个硬卧」	犬的对应要点：① 必须提前 1–3 周做航空箱训练（把箱门拆掉当普通窝、在里面喂食、逐步关门）；② 笼具要能让犬站立转身躺下（多数航司有硬性尺寸要求）；③ 箱内固定水碗、铺吸水垫	⚠️ 犬的笼具适应比猫更容易做好（犬的围笼训练本来就是日常科目）；提前训练，能把应激降到最低
未提及不适合空运的情况	犬的禁忌更多：① 短吻犬种（见上）；② 老年犬（>8 岁）；③ 有心肺病、气管塌陷（小型犬常见）、癫痫；④ 肥胖犬（中暑与呼吸风险高）；⑤ 怀孕、术后恢复期；⑥ 极度紧张/有分离焦虑的犬	这类情况优先专车/自驾（犬比猫更适合自驾）

G.21 · 第 21 章 狗碗怎么选？

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的常见做法	犬的做法	差异关键点
核心指标「宽而浅，像个碟子」	⚠️ 犬不需要“浅”。犬的碗要求是：① 宽口、② 底座重/带防滑圈（不易推翻）、③ 深度适中、④ 材质不锈钢或陶瓷。犬没有猫的“胡须疲劳”问题	⚠️ 关键差异：猫的碗越浅越好，犬的碗不能太浅——太浅会被大型犬吃得到处都是、并吃进大量空气
「浅碗防黑下巴」	犬的对应问题是吃太快（不是黑下巴）。对应解法：慢食碗（内部带隔条）、把粮撒在托盘上、用漏食球、分次给	⚠️ 慢食碗对犬是刚需，对猫是可选。原因见下条
「抬高碗架只对老年猫和扁脸猫有意义，其余是吹毛求疵」	⚠️⚠️ 这条对犬完全不能套用，而且是本章最重要的分歧。经典研究（Glickman ^[17] 等，JAVMA 2000）发现：使用抬高碗架进食，与犬胃扭转（GDV）风险升高相关。因此主流建议是：深胸大型犬（金毛、德牧、大丹、拉布拉多、圣伯纳、魏玛）不建议抬高碗架；小型犬、老年犬、有颈椎/关节问题的犬可抬高	⚠️ “抬高碗 5–15 cm”是猫的结论，对犬可能是反向的。养深胸大型犬的家庭，请与自己的兽医确认后再决定
「湿粮碗 12 小时清洗一次，干粮碗十天半个月一次」	犬的要求更严：干粮碗每天清洗；湿粮/鲜食碗每餐后清洗；水碗每天换洗。犬的口腔细菌量、唾液量都远大于猫	⚠️ 犬的碗比猫更需要每天洗
「自由采食 vs 定时定量：健康猫建议自由采食」	⚠️⚠️ 犬一律定时定量。理由：① 自由采食 → 暴食；② 一次大量进食是 GDV 的明确诱因；③ 无法监测个体进食量（食欲是犬最重要的健康信号）；④ 犬的肥胖率极高，且肥胖会加重关节病、心脏病、缩短寿命	犬的喂食规则：成年犬每天 2 餐（幼犬 3–4 餐）；安静环境、单独喂食（多犬家庭必须分开）；进食后 1 小时内避免剧烈运动与大量饮水
未提及饮水摆放	犬的对应要点：多个水点、随时有水、外出携带饮水瓶；运动后少量多次补水，不要一次大量饮水（与 GDV 相关）	⚠️ 猫的“多放几个水碗”是促饮水；犬的“少量多次”是防胃扭转，目的不同

G.22 · 第 22 章 如何给狗狗拍出漂亮照片

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的常见做法	犬的做法	差异关键点
「最关键的是满瞳，靠暗光+逗猫棒」	⚠️ 犬不需要这一套。犬天生会看主人、会看镜头、会配合。犬的拍照关键是：① 机位与犬眼齐平或更低（俯拍会让犬显得小、变形）；② 用零食/玩具在镜头上方引导视线；③ 抓拍动作瞬间（冲刺、跳跃、甩水、歪头）；④ 眼神光（让犬面向自然光源）	⚠️ 猫靠“骗出瞳孔放大”；犬靠“训练与配合”。会“坐下/等待”口令的犬，拍照难度远低于猫
「随时满瞳的猫要小心，可能长期警觉不安」	✓ 这条对犬同样成立（瞳孔放大与恐惧、疼痛、应激相关）。犬的补充：照片里能顺手看出——第三眼睑（瞬膜）露出提示眼球内陷、脱水、霍纳氏综合征或消瘦；眼白发红、角膜发白提示眼部疾病；“樱桃眼”（第三眼睑腺脱出）在照片里非常明显	犬的眼科问题在照片里往往比猫更显眼（因为犬眼球更突出、眼白更多）
「不要用闪光灯直射猫眼」（本手册补充）	⚠️ 同样适用于犬，而且犬更容易被闪光灯惊到。近距离强光可造成视网膜光损伤，也会损伤动物的暗适应、引起短暂失明	关掉闪光灯。用自然光、柔光灯，或提高 ISO 牺牲一点画质
未提及拍照顺便自查	犬的自查项与猫不同：① 步态（跛行、僵硬——关节病、髌关节发育不良）；② 爪垫（磨损、裂口、异物——夏季烫伤）；③ 耳朵（异味、黑色分泌物——外耳炎，犬比猫高发）；④ 皮肤（脱毛、皮屑、热点——过敏、螨虫）；⑤ 牙齿（牙石、口臭——犬比猫更常见）；⑥ 体重（肋骨可触及——BCS）	⚠️ 犬的高发问题在耳、皮肤、关节、牙；猫在牙、肾、泌尿系统。拍照自查的重点不同

G.23 · 第 23 章 狗狗掉毛多怎么办？

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的常见做法	犬的做法	差异关键点
「剃毛对猫伤害很小，0 应激，一个罐头就能补偿」	⚠️⚠️ 这条对犬是完全错误的，而且危险。犬剃毛的危害远大于猫：① 双层毛犬（哈士奇、萨摩、柯基、柴犬、金毛、德牧）的毛同时起保温和防晒作用，剃掉后既不能隔热也不能防晒——雪橇犬被剃毛后反而更容易中暑；② “剃后脱毛”（post-clipping alopecia）——毛囊受损后可能永久不再生长，在哈士奇、萨摩、松狮、博美上都有明确报道；③ 晒伤与皮肤肿瘤风险上升（浅色/白毛犬）；④ 剃毛后失去对蚊虫、紫外线、机械损伤的屏障	⚠️ 绝大多数犬不应剃毛（除皮肤病治疗需要）。这是全书犬猫差异最强烈的一条。猫剃毛有争议；犬剃毛基本是禁忌
「掉毛是天性，两个办法：每天梳毛 / 剃毛」	犬的对应办法只有梳毛 + 洗护：① 双层毛犬有“爆毛期”（blowing coat），每年 2 次，短期内大量脱落，必须每天用底绒梳（undercoat rake）梳理，配合洗护把死毛冲掉；② 按毛型选工具：双层毛 → 底绒梳/脱毛梳；短毛犬 → 橡胶刷；卷毛犬（贵宾/比熊）→ 不脱落但会打结，需定期修剪 + 每日梳理	⚠️ 犬的掉毛集中在一年两次的爆毛期，强度和持续时间都超过猫。梳毛工具必须按毛型选，买错等于没用
「鱼油不能防掉毛，只是美毛」	✓ 结论对犬同样成立。补一条犬的专属用途： omega-3 在犬的炎症性关节病、过敏性皮炎、慢性肾病中有明确的辅助治疗证据，属于有指征的药物性补充，需按兽医处方剂量给	✓ 不为掉毛买鱼油。但犬如果有关节炎/过敏性皮炎，鱼油是循证支持的治疗辅助
「猫频繁吐毛球是正常的」	⚠️ 犬基本不吐毛球（犬自己梳理得少）。所以犬呕吐本身就是信号，不能套用猫的“正常吐毛”。犬呕吐的常见原因：吃异物（犬最常见）、胰腺炎、胃肠炎、寄生虫、异物梗阻、GDV（干呕）、中毒、内分泌病	⚠️ 犬呕吐没有“正常的毛球”这个豁免项。犬呕吐 → 先想吃了什么异物
「猫掉毛异常的信号」	犬的异常脱毛信号（与猫有别）：① 对称性脱毛（甲状腺功能减退、库欣综合征）；② 躯体后段/腰背部脱毛 + 色素沉着（内分泌性）；③ 局部环状脱毛 + 皮屑（真菌/螨虫）；④ 瘙痒性脱毛（过敏、跳蚤）；⑤ “热点”（急性湿性皮炎）；⑥ 非换毛季大面积脱毛	⚠️ 犬的内分泌性脱毛（甲减、库欣）远比猫常见，且表现是对称性、不痒、皮肤变黑变厚。出现请就医做血液检查

G.24 · 第 24 章 有狗家庭的植物与食物黑名单

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的常见做法	犬的做法	差异关键点
百合是猫的“死神之花”，全株剧毒，极微量致急性肾衰	⚠️ 百合对犬的毒性远低于猫（猫特异性的急性肾衰机制在犬不典型），但仍可引起胃肠症状、呕吐、流涎。⚠️ 但绝不能因此把百合放家里：家里同时有猫，百合就是致命的；而家里有犬和猫的，风险按猫算	⚠️ “犬没事”绝不等于“可以放”。多宠家庭一律按最敏感的物种执行标准
清单：绿萝/文竹/发财树、天南星科、切花（菊科/康乃馨/牡丹芍药绣球）	犬与猫的植物中毒清单高度重叠，但犬有几个专属的、更常见的致命项（见下条）：葡萄/葡萄干、木糖醇、澳洲坚果、洋葱大蒜、巧克力	⚠️ 猫对这些多半不敏感或表现不同；这几项是犬的经典中毒
（猫篇未列，因猫不敏感）	⚠️ 犬专属植物/食物中毒（务必单独记住）：① 葡萄与葡萄干 → 急性肾衰竭（机制与酒石酸相关，个体敏感度差异极大，少量即可致病）；② 洋葱、大蒜、葱、韭菜（含粉状调味、婴儿辅食）→ 溶血性贫血，毒性迟发 24–72 小时，加热不破坏，犬的阈值约 15–30 g/kg；③ 澳洲坚果（夏威夷果）→ 后肢无力、震颤，约 2.4 g/kg；④ 巧克力 / 可可碱 → 20 mg/kg 起胃肠症状、40–60 mg/kg 心动过速、100–200 mg/kg 抽搐与致死；⑤ 木糖醇（无糖口香糖、部分花生酱、部分酸奶）→ 0.1 g/kg 低血糖、0.5 g/kg 肝衰竭	⚠️ 这几条是犬急诊最常见的食物中毒原因，建议打印贴在厨房
「木本植物大多数安全（除樟树、核果类果树）」（本手册已勘误）	犬同样要注意：苏铁（铁树）（全株剧毒、肝衰竭）、夹竹桃、杜鹃、紫杉/红豆杉、蓖麻、冬青、常春藤、马醉木。犬的啃咬概率与啃咬量都高于猫（尤其幼犬）	⚠️ 犬的植物中毒风险高于猫，因为犬会主动、大量地啃咬，而猫多为试探性啃咬。幼犬期尤其危险
「猫咪中毒了怎么办：不催吐、不灌水、立即送医」	原则完全一致，且犬同样适用 ✓。⚠️ 但犬有一个额外注意点：不要自行催吐——① 尖锐异物可能划伤食道；② 腐蚀性/刺激性物质（天南星科、清洁剂）催吐会造成二次灼伤；③ 犬的误吸风险高；④ 有些中毒（如石油类）催吐反而危险	存好最近的 24 小时医院电话；带上包装/植物样本/呕吐物。木糖醇、巧克力、葡萄这三种，哪怕只吃到一点也要立刻联系医院
「精油/香薰也要禁」（本手册补充）	✓ 对犬同样成立，尤其茶树精油（犬的经皮吸收与神经毒性报道较多）。另补：犬的“驱虫项圈/滴剂”误用是常见的医源性中毒——猫用制剂含氯菊酯，绝不能用于犬？⚠️ 反向：犬用的高浓度氯菊酯滴剂绝不能用在小猫身上（猫可致神经毒性甚至死亡）；而某些成分对犬也有剂量限制	任何外用驱虫药，先确认适用物种与体重段。不要“猫犬共用一支”

G.25 · 第 25 章 拓展阅读：行为学、病理学 五、犬的对应书单与免费资源

犬与猫在同一件事上的做法差异，逐条列在下面；⚠️ 标出的是与猫相反、最容易照搬出错的地方。

猫的推荐	犬的对应书单	备注
《猫的秘密：喵星人完全指南》 John Bradshaw	《Dog Sense》（犬的秘密 / 中译《狗狗在想什么》）—— 同一作者，同样是犬行为学的权威入门	✓ 如果你只买一本犬行为学的书，买这本
《像猫一样思考》Pam Johnson-Bennett	《The Other End of the Leash》Patricia McConnell（中译《别跟狗争老大》）—— 讲人犬沟通中最常见的误读	✓ 与 Bradshaw 互补：一本讲“犬为什么这样”，一本讲“你为什么会误解它”
（并无对应）	《Don't Shoot the Dog》Karen Pryor（中译《别毙了那只狗》）—— 正向强化训练的奠基之作，与本手册第 4 章的训练方法同源	✓ 想系统学训练方法，从这本开始
《育猫全书》格尔德·路德维希	《小动物临床营养学》（Small Animal Clinical Nutrition, Hand 等）—— 喂养决策的循证依据（犬猫通用）	偏专业，但“该喂多少、怎么换粮、处方粮怎么选”都能查到依据
《猫咪家庭医学大百科》	中文犬类家庭医学：《狗狗家庭医学百科》类书目；更可靠的是 AAHA / WSAVA ^[3] 犬疫苗与营养指南（免费全文）	中文犬类家庭医学书质量参差，优先选有兽医团队背书、且版本较新的
《猫病学》（宠物医院案头书）	《BSAVA Manual of Canine and Feline Behaviour》；Miller's Anatomy of the Dog（解剖学经典）；默沙东兽医手册 ^[2] （官网免费）	有医学背景再深入
（此前未列，本手册补充）	犬的免费权威资源：① WSAVA 疫苗 / 营养 / 疼痛管理指南；② AAHA 2024 犬疫苗接种指南（已把钩端螺旋体列为犬核心疫苗）；③ ACVIM 共识 ^[5] 声明（如 2023 犬钩端螺旋体共识，J Vet Intern Med 2023;37(6):1966–1982）；④ AVSAB 立场声明（训练与行为）；⑤ VOHC 认证洁牙产品清单；⑥ ASPCA ^[15] 毒物数据库；⑦ 中国兽医协会 ^[8] CVMA 团体标准 + 农业农村部行业标准（NY/T 4825 ^[14] -2025 等）	优先读免费、现行、权威的指南，比买一堆科普书有效得多。本手册附录 A 就是这些来源的中文速查版

附录H·引用来源清单（References）

正文中以 [n] 上标标注之处，对应下表中的编号。同一编号在同一章内只标一次，避免刷屏；跨章会重复出现。

#	来源与版本	在本手册里主要用来回答什么
1	《养猫手册·十万字全指导（2026版）》 微信公众号「橘南猫舍」25 篇连载合集，2026 版	猫篇各章内容的底本；犬篇用于逐章比对犬猫差异
2	《默沙东兽医手册》(MSD / Merck Veterinary Manual) 在线持续更新，本手册核对至 2024–2026 内容	中毒剂量（可可碱、木糖醇、葱属、葡萄）、疾病机制、生理参考值
3	WSAVA 犬猫免疫接种指南 Squires 等，J Small Anim Pract 2024；DOI 10.1111/jsap.13718	首针时间、母源抗体（MDA）与 16 周原则、加强间隔、抗体检测
4	AAHA 犬猫疫苗接种指南 2022 版（2024 更新）	犬核心疫苗清单（已纳入钩端螺旋体）、非核心疫苗、接种不良反应风险
5	ACVIM 钩端螺旋体共识声明 Sykes 等，J Vet Intern Med 2023;37(6):1966–1982	12 周龄以上犬只建议接种、人畜共患风险
6	WSAVA 全球营养评估指南 + 营养工具箱 Global Nutrition Toolkit（9 分制 BCS 图表）	BCS 体况评分、理想体脂率、肥胖判定与筛查
7	中国兽医协会团体标准《犬猫临床营养管理指南》 T/CVMA 199.1-2024 皮肤病 / 199.2-2024 肥胖症 / 199.3-2024 胃肠道疾病	减重方案、处方粮选择、胃肠与皮肤疾病的营养管理
8	中国兽医协会团体标准（临床其他） T/CVMA 195-2024 糖尿病筛查诊断、197-2024 全血输注、198-2024 输血不良反应分类、138-2024 繁育犬福利	慢病筛查、输血安全、繁育福利底线
9	《猫临床应激管理指南（2026版）》 中国兽医协会猫科专科委员会，2026-07-17 印发；FCSGS 应激分级 I–IV 级 + CSS 7 分制	就诊应激、候诊与住院分区、环境丰富化、多猫家庭
10	《犬猫运动功能障碍临床诊断路径指南（2026 版）》	跛行、后肢无力、神经症状的排查顺序

#	来源与版本	在本手册里主要用来回答什么
	中国兽医协会，2026-07 印发； DAMNIT-V 模型 + 改良 Frankel 5 级	
11	《动物福利友好繁育舍（犬 / 猫）评价规范（2023 版）》 中国兽医协会，2023 年发布	幼犬猫出售月龄（≥8 周）、7 日换粮法、运输不超过 4 小时
12	GB/T 45295-2025《宠物诊疗机构诊疗服务指南》 推荐性国标，2025-01-24 发布 / 2025-08-01 实施；归口 TC541	判断一家医院流程是否规范（拆解 16 个诊疗服务环节）
13	GB/T 45204-2025《宠物经营场所环境清洁与消毒指南》 推荐性国标，2025-08-01 实施	洗美 / 寄养 / 医院场所的消毒是否到位（三级污染分区）
14	NY/T 4825-2025《犬猫吸入麻醉操作技术规范》等四项 农业行业标准，2026-05-01 实施	麻醉、急救、影像的规范底线
15	ASPCA 动物毒物控制中心（APCC）及毒理学简报 Dunayer 2004 / 2006、Hansen 2002 等	误食后的剂量判断与家庭处置边界
16	AAHA 医院认证 针对具体院区的第三方认证，非品牌认证	医院管理、麻醉监护、牙科标准的参考背书
17	Glickman LT 等：抬高食盆与犬胃扭转（GDV）风险 J Am Vet Med Assoc 2000;216(1):40–45	犬用抬高食盆可能升高 GDV 风险（与猫相反的关键结论）
18	FDA 关于无谷 / 高豆类犬粮与扩张型心肌病（DCM）的调查 FDA Center for Veterinary Medicine, 2018–2022 更新	不宜盲目追求「无谷」犬粮
19	AAFP / ISFM 猫科环境需求指南 AAFP-ISFM Environmental Needs Guidelines（2013）	多猫家庭资源分布、猫砂盆数量与摆放、可躲藏点

本手册内容基于公开权威资料整理（默沙东兽医手册、WSAVA 2024 疫苗指南、AAHA 犬猫疫苗指南（2024 更新）、ACVIM 钩端螺旋体共识声明、中国兽医协会 CVMA 团体标准与指南、GB/T 45295-2025 等国家标准、农业行业标准、ASPCA 及公

开同行评议文献), 仅作科普与决策辅助, 不构成诊断或治疗建议。任何健康问题请以执业兽医面诊结论为准。医院地址、电话与价格随时变动, 出行前请电话确认。