CLINICA POSILLIPO

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA

CUP - 0815751618

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTO IL DOCUMENTO

PREPARAZIONE PER LA COLONSCOPIA

PRESCRIZIONE PER IL PAZIENTE: **PLENVU** (1 CONFEZIONE)

Un'adeguata preparazione intestinale è un pre-requisito indispensabile per una colonscopia di qualità. E' stato infatti dimostrato che una scarsa preparazione intestinale diminuisce la capacità di individuare lesioni precancerose, (polipi- adenomi), aumenta il numero di procedure incomplete, i tempi necessari all'esecuzione dell'esame e i rischi legati alla procedura stessa.

Tre giorni prima dell'esame iniziare una dieta a basso contenuto di fibre

Bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno

IN CASO DI ESAME PRENOTATO AL MATTINO (entro le ore 14.00)

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:

Colazione: the o orzo o caffè, fette biscottate, marmellata
Pranzo: pastina in brodo vegetale colato, succo di frutta
Cena: camomilla, thè, succo di frutta
ORE 19.00: sciogliere mescolando bene, la **Dose 1** in mezzo litro di acqua e bere la preparazione lentamente, a piccoli sorsi, in 45 minuti. Successivamente alla assunzione della Dose 1 , bere almeno mezzo litro di acqua o liquidi chiari (thè, camomilla, tisane) in 45 minuti. Bere altri liquidi chiari se sente lo stimolo della sete.

IL GIORNO DELL'ESAME:

4 ORE PRIMA DELL'APPUNTAMENTO
Bere un bicchiere di acqua o liquidi chiari (thè, camomilla, tisane) e sciogliere la **Dose 2** (composta da 2 bustine incollate tra loro) in mezzo litro di acqua e bere la preparazione lentamente, a piccoli sorsi, in 45 minuti. Successivamente all'assunzione della Dose2 , bere almeno mezzo litro di acqua o liquidi chiari (thè, camomilla, tisane) in 45 minuti. Bere altri liquidi chiari se sente lo stimolo della sete.

2 ore prima dell'esame interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

ATTENZIONE: NON INVERTIRE LA SEQUENZA DELLE DOSI.

IN CASO DI ESAME PRENOTATO AL POMERIGGIO (dopo le ore 14.00)

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:
Colazione: leggera, senza latte.
Pranzo: leggero (pastina in brodo) succo di frutta senza polpa.
Cena: camomilla, the, succo di frutta
IL GIORNO DELL'ESAME:
ORE 7.00 sciogliere mescolando bene la **Dose 1** in mezzo litro di acqua e bere la preparazione lentamente, a piccoli sorsi, in 45 minuti. Successivamente alla assunzione della Dose 1, bere almeno mezzo litro di acqua o liquidi chiari (thè, camomilla, tisane) in 45 minuti. Bere altri liquidi chiari se sente lo stimolo della sete.

ORE 10.00 Bere un bicchiere di acqua o liquidi chiari (thè, camomilla, tisane) e sciogliere, mescolando bene, la **Dose 2** (composta da 2 bustine incollate tra loro) in mezzo litro di acqua e bere la preparazione lentamente, a piccoli sorsi, in 45 minuti. Successivamente alla assunzione della Dose2, bere almeno mezzo litro di acqua o liquidi chiari (thè, camomilla, tisane) in 45 minuti. Bere altri liquidi chiari se sente lo stimolo della sete.
2 ore prima dell'esame interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

ATTENZIONE: NON INVERTIRE LA SEQUENZA DELLE DOSI.

Praticare qualche giorno prima dell'esame endoscopico i seguenti esami di laboratorio:**EMOCROMO, PT, PTT, INR**.

QUALI FARMACI SI POSSONO ASSUMERE?
A giudizio del Medico Curante, i farmaci possono essere assunti anche la mattina stessa dell'esame ad **eccezione** di:

- **Terapia con Ferro** per bocca: deve essere sospeso almeno 3 giorni prima dell'esame.
- **Terapia anti aggregante: (Ticlodipina, Clopidogrel**) è necessaria una valutazione del proprio MMG o Specialista Cardiologo per la sospensione del farmaco 7 giorni prima dell'esame. In caso di doppia terapia antiaggregante verificare la possibilità di sospensione di almeno una delle due (mantenere se possibile ASA). Si consiglia sospendere **Cardioaspirina (ASA)** 5 giorni prima della procedura.
- **(Eliquis Terapia con i Nuovi Anticoagulanti Orali (NAO), Pradaxa, Lixiana, Xarelto**): è necessario rivolgersi al proprio MMG o Specialista Cardiologo per la sospensione del farmaco, almeno 48 ora prima dell'esame.
- **Terapia con Anticoagulanti orali (Coumadin, Sintrom**): è necessario rivolgersi al proprio MMG o Specialista Cardiologo per la loro sospensione (in assenza di controindicazioni) 5 giorni prima dell'esame e per valutare terapia sostitutiva (eparina con ultima somministrazione almeno 12 ore prima della procedura). Indispensabile disporre di dosaggio di INR (<1.5) e P.T. prima dell'esame.

In caso di stipsi ostinata si raccomanda una dieta senza scorie nei 5 gg. precedenti la procedura e la assunzione di ***Movicol buste*** 1 busta alla sera in un bicchiere di acqua per 5 gg.
Il paziente sottoposto a sedazione /anestesia dovrà **astenersi dalla guida di autoveicoli** per le successive 12 ore e **potrà lasciare l'ambulatorio solo se accompagnato**.

Nel caso in cui fosse impossibilitato ad effettuare la visita o l'esame, si prega avvisare l'Ufficio prenotazioni
N.B. Si ricorda di non portare con sè effetti personali di valore. In caso contrario, pertanto, Lei si assume la responsabilità della corretta custodia, sollevando la Struttura da ogni responsabilità in caso di smarrimento. La custodia dei beni personali preziosi da parte della Struttura può avvenire solo su esplicita richiesta dell'utente, in assenza di familiari, accompagnatori o tutori, o nel caso in cui il paziente sia impossibilitato a farsene cari