

# Fauna de Operadores Lineales:

**Luis A. Núñez**

*Escuela de Física, Facultad de Ciencias,  
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia*



22 de septiembre de 2025

- 1 Diferenciación de operadores
- 2 Espacio nulo e imagen de un operador
- 3 Operadores biyectivos, inversos y adjuntos
- 4 El detalle de los adjuntos
- 5 Hermíticos y Unitarios
- 6 Recapitulando
- 7 Para la discusión

- Si  $\mathbb{A}(t)$ , depende de una variable arbitraria  $t$ , entonces

$$\frac{d\mathbb{A}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbb{A}(t + \Delta t) - \mathbb{A}(t)}{\Delta t} .$$

- Si  $\mathbb{A}(t)$ , depende de una variable arbitraria  $t$ , entonces

$$\frac{d\mathbb{A}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbb{A}(t + \Delta t) - \mathbb{A}(t)}{\Delta t}.$$

- Para el caso inmediato  $\mathbb{A}(t) = \mathbb{A}t$ , tendremos

$$\begin{aligned}\frac{de^{\mathbb{A}t}}{dt} |v\rangle &= \frac{d}{dt} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathbb{A}t)^n}{n!} \right] |v\rangle = \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dt} \left( \frac{(\mathbb{A}t)^n}{n!} \right) \right] |v\rangle \\ \frac{de^{\mathbb{A}t}}{dt} |v\rangle &= \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nt^{n-1} \mathbb{A}^n}{n!} \right] |v\rangle = \underbrace{\left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{n-1} \mathbb{A}^{n-1}}{(n-1)!} \right]}_{e^{\mathbb{A}t}} \mathbb{A} |v\rangle\end{aligned}$$

- Si  $\mathbb{A}(t)$ , depende de una variable arbitraria  $t$ , entonces

$$\frac{d\mathbb{A}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbb{A}(t + \Delta t) - \mathbb{A}(t)}{\Delta t}.$$

- Para el caso inmediato  $\mathbb{A}(t) = \mathbb{A}t$ , tendremos

$$\begin{aligned} \frac{de^{\mathbb{A}t}}{dt} |v\rangle &= \frac{d}{dt} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathbb{A}t)^n}{n!} \right] |v\rangle = \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dt} \left( \frac{(\mathbb{A}t)^n}{n!} \right) \right] |v\rangle \\ \frac{de^{\mathbb{A}t}}{dt} |v\rangle &= \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nt^{n-1} \mathbb{A}^n}{n!} \right] |v\rangle = \underbrace{\left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{n-1} \mathbb{A}^{n-1}}{(n-1)!} \right]}_{e^{\mathbb{A}t}} \mathbb{A} |v\rangle \end{aligned}$$

- Es fácil demostrar que  $[F(\mathbb{A}), \mathbb{A}] = 0$

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \frac{\mathbb{A}^n}{n!} \right) \mathbb{A} \equiv \mathbb{A} \left( \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \frac{\mathbb{A}^n}{n!} \right)$$

- Si  $\mathbb{A}(t)$ , depende de una variable arbitraria  $t$ , entonces

$$\frac{d\mathbb{A}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbb{A}(t + \Delta t) - \mathbb{A}(t)}{\Delta t}.$$

- Para el caso inmediato  $\mathbb{A}(t) = \mathbb{A}t$ , tendremos

$$\begin{aligned} \frac{de^{\mathbb{A}t}}{dt} |v\rangle &= \frac{d}{dt} \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\mathbb{A}t)^n}{n!} \right] |v\rangle = \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dt} \left( \frac{(\mathbb{A}t)^n}{n!} \right) \right] |v\rangle \\ \frac{de^{\mathbb{A}t}}{dt} |v\rangle &= \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nt^{n-1} \mathbb{A}^n}{n!} \right] |v\rangle = \underbrace{\left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{n-1} \mathbb{A}^{n-1}}{(n-1)!} \right]}_{e^{\mathbb{A}t}} \mathbb{A} |v\rangle \end{aligned}$$

- Es fácil demostrar que  $[F(\mathbb{A}), \mathbb{A}] = 0$

$$\left( \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \frac{\mathbb{A}^n}{n!} \right) \mathbb{A} \equiv \mathbb{A} \left( \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \frac{\mathbb{A}^n}{n!} \right)$$

- Pero  $[\mathbb{A}, F(\mathbb{B})] \stackrel{?}{=} [\mathbb{A}, \mathbb{B}] \frac{dF(\mathbb{B})}{d\mathbb{B}}.$

$$[A, F(B)] \stackrel{?}{=} [A, B] \frac{dF(B)}{dB},$$

- Probamos primero que: si  $[A, C] = [B, C] = 0$ , con  $C = [A, B] \Rightarrow [A, B^n] = AB^n - B^nA = n[A, B]B^{n-1}$ .

Entonces

$$AB^n - B^nA = \underbrace{ABB \cdots B}_n - \underbrace{BB \cdots BA}_n$$

$$AB^n - B^nA = (C + BA) \underbrace{BB \cdots B}_{n-1} - \underbrace{BB \cdots BA}_n$$

$$AB^n - B^nA = CB^{n-1} + B(C + BA) \underbrace{BB \cdots B}_{n-2} - \underbrace{BB \cdots BA}_n$$

$$AB^n - B^nA = 2CB^{n-1} + B^2(C + BA) \underbrace{BB \cdots B}_{n-3} - \underbrace{BB \cdots BA}_n$$

$$AB^n - B^nA = nCB^{n-1} = n[A, B]B^{n-1}$$

$$[A, F(B)] \stackrel{?}{=} [A, B] \frac{dF(B)}{dB},$$

- Probamos primero que: si  $[A, C] = [B, C] = 0$ , con  $C = [A, B] \Rightarrow [A, B^n] = AB^n - B^nA = n[A, B]B^{n-1}$ .

Entonces

$$AB^n - B^nA = \underbrace{ABB \cdots B}_n - \underbrace{BB \cdots BA}_n$$

$$AB^n - B^nA = (C + BA) \underbrace{BB \cdots B}_{n-1} - \underbrace{BB \cdots BA}_n$$

$$AB^n - B^nA = CB^{n-1} + B(C + BA) \underbrace{BB \cdots B}_{n-2} - \underbrace{BB \cdots BA}_n$$

$$AB^n - B^nA = 2CB^{n-1} + B^2(C + BA) \underbrace{BB \cdots B}_{n-3} - \underbrace{BB \cdots BA}_n$$

$$AB^n - B^nA = nCB^{n-1} = n[A, B]B^{n-1}$$

- Con lo cual  $[A, F(B)] = \left[ A, \sum_{n=0}^{\infty} f_n \frac{B^n}{n!} \right]$ , es decir

$$[A, F(B)] = [A, B] \sum_{n=0}^{\infty} f_n \frac{nB^{n-1}}{n!} = [A, B] \frac{dF(B)}{dB}$$



- $|\nu\rangle \in \mathbf{V}_1 / \mathbb{A} |\nu\rangle = |0\rangle$ , se denomina espacio nulo, núcleo o *kernel* (núcleo en alemán) de la transformación  $\mathbb{A}$  y lo denotaremos como  $\aleph(\mathbb{A})$ , es decir  $\aleph(\mathbb{A}) = \{|\nu\rangle \in \mathbf{V}_1 \wedge \mathbb{A} |\nu\rangle = |0\rangle\}$ .

- $|v\rangle \in \mathbf{V}_1 / \mathbb{A}|v\rangle = |0\rangle$ , se denomina espacio nulo, núcleo o *kernel* (núcleo en alemán) de la transformación  $\mathbb{A}$  y lo denotaremos como  $\aleph(\mathbb{A})$ , es decir  $\aleph(\mathbb{A}) = \{|v\rangle \in \mathbf{V}_1 \wedge \mathbb{A}|v\rangle = |0\rangle\}$ .
- Definiremos la imagen (rango o recorrido) de  $\mathbb{A}$ , a  $\mathbb{A}\{\mathbf{V}\} = \{|v'\rangle \in \mathbf{V}_2 \wedge \mathbb{A}|v\rangle = |v'\rangle\}$ ,

- $|v\rangle \in \mathbf{V}_1 / \mathbb{A} |v\rangle = |0\rangle$ , se denomina espacio nulo, núcleo o *kernel* (núcleo en alemán) de la transformación  $\mathbb{A}$  y lo denotaremos como  $\aleph(\mathbb{A})$ , es decir  $\aleph(\mathbb{A}) = \{|v\rangle \in \mathbf{V}_1 \wedge \mathbb{A} |v\rangle = |0\rangle\}$ .
- Definiremos la imagen (rango o recorrido) de  $\mathbb{A}$ , a  $\mathbb{A}\{\mathbf{V}\} = \{|v'\rangle \in \mathbf{V}_2 \wedge \mathbb{A} |v\rangle = |v'\rangle\}$ ,
- Si  $\mathbf{V}$  es de dimensión  $n$ :  $\dim[\aleph(\mathbb{A})] + \dim[\mathbb{A}\{\mathbf{V}\}] = \dim[\mathbf{V}]$ ,

- **Operadores biyectivos:** Se dice que  $\mathbb{A} : \mathbf{V}_1 \rightarrow \mathbf{V}_2$  es biyectiva (uno a uno o biunívoco) si dados  $|v_1\rangle, |v_2\rangle \in \mathbf{V}_1$ ,  $\wedge |v'\rangle \in \mathbf{V}_2$ , se tiene que:  $\mathbb{A}|v_1\rangle = |v'\rangle \wedge \mathbb{A}|v_2\rangle = |v'\rangle \Rightarrow |v_1\rangle = |v_2\rangle$ , es decir, será biyectiva si  $\mathbb{A}$  transforma vectores distintos de  $\mathbf{V}_1$  en vectores distintos de  $\mathbf{V}_2$ .

- **Operadores biyectivos:** Se dice que  $\mathbb{A} : \mathbf{V}_1 \rightarrow \mathbf{V}_2$  es biyectiva (uno a uno o biunívoco) si dados  $|v_1\rangle, |v_2\rangle \in \mathbf{V}_1$ ,  $\wedge |v'\rangle \in \mathbf{V}_2$ , se tiene que:  $\mathbb{A}|v_1\rangle = |v'\rangle \wedge \mathbb{A}|v_2\rangle = |v'\rangle \Rightarrow |v_1\rangle = |v_2\rangle$ , es decir, será biyectiva si  $\mathbb{A}$  transforma vectores distintos de  $\mathbf{V}_1$  en vectores distintos de  $\mathbf{V}_2$ .
- **Operadores Inversos:** Las transformaciones lineales biyectivas posibilitan definir inversa. Diremos que  $\mathbb{A}^{-1} : \mathbf{V}_2 \rightarrow \mathbf{V}_1$  es el inverso de  $\mathbb{A}$ , si  $\mathbb{A}^{-1}\mathbb{A} = \mathbb{I} = \mathbb{A}\mathbb{A}^{-1}$ .
- **Operadores adjuntos:** Si  $\mathbb{A} : \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{W}$  de tal forma que  $\mathbb{A}|v\rangle = |v'\rangle$ , Definiremos  $\mathbb{A}^\dagger : \mathbf{V}^* \rightarrow \mathbf{W}^*$ , de tal forma que  $\langle v'| = \langle v| \mathbb{A}^\dagger$ , donde  $\mathbf{V}^*$  y  $\mathbf{W}^*$  son los duales de  $\mathbf{V}$  y  $\mathbf{W}$ , respectivamente. Entonces  $\mathbb{A}^\dagger$  es el adjunto de  $\mathbb{A}$ . Es decir:  
$$|v\rangle \iff \langle v| \Rightarrow |v'\rangle = \mathbb{A}|v\rangle \iff \langle v'| = \langle v| \mathbb{A}^\dagger.$$
- Entonces, a partir de la definición de producto interno tendremos:  
$$\langle \tilde{x}|y\rangle = \langle y|\tilde{x}\rangle^* \quad \forall \quad |\tilde{x}\rangle = \mathbb{A}|x\rangle, |y\rangle \in \mathbf{V} \Rightarrow$$
$$\langle x|\mathbb{A}^\dagger|y\rangle = \langle y|\mathbb{A}|x\rangle^* \quad \forall \quad |x\rangle, |y\rangle \in \mathbf{V}.$$

- Esta última relación  $\langle x | \mathbb{A}^\dagger | y \rangle = \langle y | \mathbb{A} | x \rangle^* \quad \forall |x\rangle, |y\rangle \in \mathbf{V}$ , nos permite asociar  $\mathbb{A}^\dagger$  con  $\mathbb{A}$ ,

- Esta última relación  $\langle x | A^\dagger | y \rangle = \langle y | A | x \rangle^* \quad \forall |x\rangle, |y\rangle \in \mathbf{V}$ , nos permite asociar  $A^\dagger$  con  $A$ ,
- y además deducir las propiedades de los adjuntos:  $(A^\dagger)^\dagger = A$ ,  $(\lambda A)^\dagger = \lambda^* A^\dagger$ ,  $(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger$ ,  $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$  y consecuentemente,  $[A, B]^\dagger = -[A^\dagger, B^\dagger] = [B^\dagger, A^\dagger]$ .

- Esta última relación  $\langle x | A^\dagger | y \rangle = \langle y | A | x \rangle^* \quad \forall |x\rangle, |y\rangle \in \mathbf{V}$ , nos permite asociar  $A^\dagger$  con  $A$ ,
- y además deducir las propiedades de los adjuntos:  $(A^\dagger)^\dagger = A$ ,  $(\lambda A)^\dagger = \lambda^* A^\dagger$ ,  $(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger$ ,  $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$  y consecuentemente,  $[A, B]^\dagger = -[A^\dagger, B^\dagger] = [B^\dagger, A^\dagger]$ .
- En conclusión, para obtener el adjunto de una expresión se debe proceder de la siguiente manera:
  - Cambiar constantes por sus complejas conjugadas  $\lambda \mapsto \lambda^*$ .
  - Cambiar los *kets* por sus *bras* asociados y viceversa (*bras* por *kets*):  $|v\rangle \mapsto \langle v|$ .
  - Cambiar operadores lineales por sus adjuntos  $A \mapsto A^\dagger$ .
  - Invertir el orden de los factores:  $(|v\rangle \langle w|)^\dagger = |w\rangle \langle v|$ .



- **Operadores Hermíticos:** Un operador será hermítico (o autoadjunto) si:  $\mathbb{A}^\dagger = \mathbb{A}$ , esto implica  $\langle x | \mathbb{A}^\dagger | y \rangle \equiv \langle x | \mathbb{A} | y \rangle = \langle y | \mathbb{A} | x \rangle^*$ .  
Estos operadores juegan el rol de los números reales en el sentido de que son “iguales a su propio complejo conjugado”.

- **Operadores Hermíticos:** Un operador será hermítico (o autoadjunto) si:  $\mathbb{A}^\dagger = \mathbb{A}$ , esto implica  $\langle x | \mathbb{A}^\dagger | y \rangle \equiv \langle x | \mathbb{A} | y \rangle = \langle y | \mathbb{A} | x \rangle^*$ . Estos operadores juegan el rol de los números reales en el sentido de que son “iguales a su propio complejo conjugado”.
- **Operadores Unitarios:** Un operador será unitario si su inversa es igual a su adjunto:  $\mathbb{U}^{-1} = \mathbb{U}^\dagger \Rightarrow \mathbb{U}^\dagger \mathbb{U} = \mathbb{U} \mathbb{U}^\dagger = \mathbb{I}$ . Podemos decir varias cosas:
  - Las transformaciones unitarias dejan invariante al producto interno:  
 $\langle \tilde{y} | \tilde{x} \rangle = \langle y | \mathbb{U}^\dagger \mathbb{U} | x \rangle = \langle y | x \rangle$
  - El producto de dos operadores unitarios también es unitario:  
 $(\mathbb{U}\mathbb{V})^\dagger (\mathbb{U}\mathbb{V}) = \mathbb{V}^\dagger \underbrace{\mathbb{U}^\dagger \mathbb{U}}_{\mathbb{I}} \mathbb{V} = \mathbb{V}^\dagger \mathbb{V} = \mathbb{I}$

- **Operadores Hermíticos:** Un operador será hermítico (o autoadjunto) si:  $\mathbb{A}^\dagger = \mathbb{A}$ , esto implica  $\langle x | \mathbb{A}^\dagger | y \rangle \equiv \langle x | \mathbb{A} | y \rangle = \langle y | \mathbb{A} | x \rangle^*$ .  
Estos operadores juegan el rol de los números reales en el sentido de que son “iguales a su propio complejo conjugado”.
- **Operadores Unitarios:** Un operador será unitario si su inversa es igual a su adjunto:  $\mathbb{U}^{-1} = \mathbb{U}^\dagger \Rightarrow \mathbb{U}^\dagger \mathbb{U} = \mathbb{U} \mathbb{U}^\dagger = \mathbb{I}$ . Podemos decir varias cosas:
  - Las transformaciones unitarias dejan invariante al producto interno:  
 $\langle \tilde{y} | \tilde{x} \rangle = \langle y | \mathbb{U}^\dagger \mathbb{U} | x \rangle = \langle y | x \rangle$
  - El producto de dos operadores unitarios también es unitario:  
 $(\mathbb{U}\mathbb{V})^\dagger (\mathbb{U}\mathbb{V}) = \mathbb{V}^\dagger \underbrace{\mathbb{U}^\dagger \mathbb{U}}_{\mathbb{I}} \mathbb{V} = \mathbb{V}^\dagger \mathbb{V} = \mathbb{I}$
  - Los operadores unitarios aplican una base ortogonal en otra:  
 $\langle \tilde{e}^i | \tilde{e}_j \rangle = \langle \tilde{e}^i | \mathbb{U} | e_j \rangle = \langle e^i | \mathbb{U}^\dagger \mathbb{U} | e_j \rangle = \langle e^i | e_j \rangle = \delta_j^i$ .

- Funciones de operadores  $F(\mathbb{A})|v\rangle = \left[ \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \frac{\mathbb{A}^n}{n!} \right] |v\rangle$

- Funciones de operadores  $F(\mathbb{A})|v\rangle = \left[ \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \frac{\mathbb{A}^n}{n!} \right] |v\rangle$
- Diferenciación de operadores  $[\mathbb{A}, F(\mathbb{B})] = [\mathbb{A}, \mathbb{B}] \frac{dF(\mathbb{B})}{d\mathbb{B}},$

- Funciones de operadores  $F(\mathbb{A})|\nu\rangle = \left[ \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \frac{\mathbb{A}^n}{n!} \right] |\nu\rangle$
- Diferenciación de operadores  $[\mathbb{A}, F(\mathbb{B})] = [\mathbb{A}, \mathbb{B}] \frac{dF(\mathbb{B})}{d\mathbb{B}}$ ,
- Espacios nulos  $\mathfrak{N}(\mathbb{A}) = \{|\nu\rangle \in \mathbf{V}_1 \wedge \mathbb{A}|\nu\rangle = |0\rangle\}$ , e imagen  $\mathbb{A}\{\mathbf{V}\} = \{|\nu'\rangle \in \mathbf{V}_2 \wedge \mathbb{A}|\nu\rangle = |\nu'\rangle\}$ . Estos conceptos están relacionados por  $\dim[\mathfrak{N}(\mathbb{A})] + \dim[\mathbb{A}\{\mathbf{V}\}] = \dim[\mathbf{V}]$ .

- Funciones de operadores  $F(\mathbb{A})|\nu\rangle = \left[ \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \frac{\mathbb{A}^n}{n!} \right] |\nu\rangle$
- Diferenciación de operadores  $[\mathbb{A}, F(\mathbb{B})] = [\mathbb{A}, \mathbb{B}] \frac{dF(\mathbb{B})}{d\mathbb{B}}$ ,
- Espacios nulos  $\mathfrak{N}(\mathbb{A}) = \{|\nu\rangle \in \mathbf{V}_1 \wedge \mathbb{A}|\nu\rangle = |0\rangle\}$ , e imagen  $\mathbb{A}\{\mathbf{V}\} = \{|\nu'\rangle \in \mathbf{V}_2 \wedge \mathbb{A}|\nu\rangle = |\nu'\rangle\}$ . Estos conceptos están relacionados por  $\dim[\mathfrak{N}(\mathbb{A})] + \dim[\mathbb{A}\{\mathbf{V}\}] = \dim[\mathbf{V}]$ .
- Operadores biyectivos, inversos y adjuntos
  - **Biyectivo:**  $\mathbb{A}|\nu_1\rangle = |\nu'\rangle \wedge \mathbb{A}|\nu_2\rangle = |\nu'\rangle \Rightarrow |\nu_1\rangle = |\nu_2\rangle$ ,
  - **Inversos:** Si  $\mathbb{A}^{-1}: \mathbf{V}_2 \rightarrow \mathbf{V}_1$  inverso de  $\mathbb{A}$ , si  $\mathbb{A}^{-1}\mathbb{A} = \mathbb{I} = \mathbb{A}\mathbb{A}^{-1}$ .
  - **Adjuntos:** Si  $\mathbb{A}|\nu\rangle = |\nu'\rangle$ , su adjunto  $\langle\nu'| = \langle\nu|\mathbb{A}^\dagger$ . A partir de la definición de producto interno:  $\langle\tilde{x}|\nu\rangle = \langle\nu|\tilde{x}\rangle^* \forall |\tilde{x}\rangle = \mathbb{A}|x\rangle \Rightarrow \langle x|\mathbb{A}^\dagger|\nu\rangle = \langle\nu|\mathbb{A}|x\rangle^* \forall |x\rangle, |\nu\rangle \in \mathbf{V}$ .

- Funciones de operadores  $F(\mathbb{A})|v\rangle = \left[ \sum_{n=0}^{\infty} f^{(n)}(0) \frac{\mathbb{A}^n}{n!} \right] |v\rangle$
- Diferenciación de operadores  $[\mathbb{A}, F(\mathbb{B})] = [\mathbb{A}, \mathbb{B}] \frac{dF(\mathbb{B})}{d\mathbb{B}}$ ,
- Espacios nulos  $\mathfrak{N}(\mathbb{A}) = \{|v\rangle \in \mathbf{V}_1 \mid \mathbb{A}|v\rangle = |0\rangle\}$ , e imagen  $\mathbb{A}\{\mathbf{V}\} = \{|v'\rangle \in \mathbf{V}_2 \mid \mathbb{A}|v\rangle = |v'\rangle\}$ . Estos conceptos están relacionados por  $\dim[\mathfrak{N}(\mathbb{A})] + \dim[\mathbb{A}\{\mathbf{V}\}] = \dim[\mathbf{V}]$ .
- Operadores biyectivos, inversos y adjuntos
  - **Biyectivo:**  $\mathbb{A}|v_1\rangle = |v'\rangle \wedge \mathbb{A}|v_2\rangle = |v'\rangle \Rightarrow |v_1\rangle = |v_2\rangle$ ,
  - **Inversos:** Si  $\mathbb{A}^{-1}: \mathbf{V}_2 \rightarrow \mathbf{V}_1$  inverso de  $\mathbb{A}$ , si  $\mathbb{A}^{-1}\mathbb{A} = \mathbb{I} = \mathbb{A}\mathbb{A}^{-1}$ .
  - **Adjuntos:** Si  $\mathbb{A}|v\rangle = |v'\rangle$ , su adjunto  $\langle v'| = \langle v| \mathbb{A}^\dagger$ . A partir de la definición de producto interno:  $\langle \tilde{x} | y \rangle = \langle y | \tilde{x} \rangle^* \quad \forall \quad |\tilde{x}\rangle = \mathbb{A}|x\rangle \Rightarrow \langle x | \mathbb{A}^\dagger | y \rangle = \langle y | \mathbb{A} | x \rangle^* \quad \forall \quad |x\rangle, |y\rangle \in \mathbf{V}$ .
- Operadores Hermíticos y Unitarios
  - **Hermíticos:**  $\mathbb{A}^\dagger = \mathbb{A} \Rightarrow \langle x | \mathbb{A}^\dagger | y \rangle \equiv \langle x | \mathbb{A} | y \rangle = \langle y | \mathbb{A} | x \rangle^*$ .
  - **Unitarios:**  $\mathbb{U}^{-1} = \mathbb{U}^\dagger \Rightarrow \mathbb{U}^\dagger \mathbb{U} = \mathbb{U} \mathbb{U}^\dagger = \mathbb{I}$ . Las transformaciones unitarias dejan invariante al producto interno



- 1 En sus palabras defina:
  - 1 Núcleo y Rango de un operador. ¿Cómo se relacionan estos conceptos y cuál es su importancia? Mencione alguna aplicación
  - 2 Operadores Biyectivos, Adjunto, Hermítico y Unitarios. ¿Cuál es la trascendencia de estos conceptos?
- 2 Muestre que  $[A, B]^{\dagger} = -[A^{\dagger}, B^{\dagger}] = [B^{\dagger}, A^{\dagger}]$ .
- 3 Pruebe las siguientes afirmaciones::
  - 1  $(P^{\dagger})^{-1} = (P^{-1})^{\dagger}$ .
  - 2  $(PQ)^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$
  - 3 Si  $[P, Q] = 0$ , entonces  $P(Q)^{-1} = (Q)^{-1}P$
- 4 Muestre que las transformaciones unitarias preservan la norma de los vectores
- 5 Sean  $A$  y  $B$  dos operadores hermíticos. Definimos un operador unitario como:  $U = A + iB$ . Muestre que  $[A, B] = 0$  y que  $A^2 + B^2 = I$ .  
Donde  $i$  representa el número imaginario e  $I$  el operador identidad