

เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยง การคัดแยกความเสี่ยงขณะรอคลอด

ภาวะ/โรค	Mild	Moderate	Severe
Preeclampsia			
1.อาการทางคลินิก	1.วินิจฉัย PIH เมื่อ GA 20 wks 2.ไม่มีอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัว	บ่นปวดศีรษะเล็กน้อย ทนได้	1.ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ 2.Pulmonary edema
2.V/S	BP $\geq$ 140 mmHg	1.SBP $\geq$ 150 mmHg 2.DBP $\geq$ 100 mmHg	1.SBP $\geq$ 160 mmHg 2.DBP $\geq$ 110 mmHg
3.Lab	Proteinuria 1+	Proteinuria 1-2 ⁺	มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1.Proteinuria 2-3 ⁺ 2. serum creatinine เพิ่มขึ้น>1.1 mg/dl 3. เกล็ดเลือดต่ำ < 100,000 /ul
Antepartum hemorrhage เป็นภาวะเลือดออกทางช่องคลอด ในสตรีตั้งครรภ์ตั้งแต่ 26 wks-จนถึงก่อนการคลอด ให้นึกถึง ภาวะ 1.Abruptio Placenta 2. Placenta previa 3.Rupture uterus 4.Rupture Vasa previa นับเป็นภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ระดับ Severe			
อาการทางคลินิก 1.Abruptio Placenta			1.1.เลือดออกทางช่องคลอด 1.2.ปวดท้องหรือปวดหลัง 1.3.มดลูกหดตัวถี่ 1.4.กดเจ็บที่มดลูก 1.5 Fetal distress (เกณฑ์ปกติ 110-160 bpm)

2. Placenta previa			1.เลือดออกทางช่องคลอด 2.มักไม่เจ็บครรภ์ 3.ทารกอยู่ในท่าผิดปกติ เช่น ท่าก้น ท่าขวาง 4.FHS อยู่ในเกณฑ์ปกติ (เกณฑ์ปกติ 110-160 bpm)
3. Rupture uterus			1.มดลูกหดรั้งตลอดเวลา (Duration> Interval) 2.กดเจ็บบริเวณเหนือหัวหน้า 2.หน้าท้องแบ่งเป็นสองลอน Bandl's ring
4. Rupture Vasa previa			1.เลือดออกทางช่องคลอด พร้อมกับฉีกน้ำแตก 2.Fetal distress (เกณฑ์ปกติ 110-160 bpm)

อ้างอิงจาก คู่มือการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงฯเขตสุขภาพที่ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) หน้า 14-17