

Numerical Linear Algebra Homework Project 3: Eigenvalues and Eigenvectors

Catalano Giuseppe, Cerrato Nunzia

Problem 1

(1)

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} a_{11} & \mathbf{x}^T \\ \hline \mathbf{x} & \hat{A}_1 \end{array} \right] \quad (1)$$

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{x} + \text{sgn}(x_1)\|\mathbf{x}\|_2\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} -1 - \sqrt{2} \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\hat{R}_1 = \mathbb{1}_3 - \frac{2}{\|\mathbf{u}_1\|_2^2}\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T \quad (3)$$

$$R_1 = \left[\begin{array}{c|c} 1 & \mathbf{0}^T \\ \hline \mathbf{0} & \hat{R}_1 \end{array} \right] \quad (4)$$

$$R_1 A = \left[\begin{array}{c|c} a_{11} & \mathbf{x}^T \\ \hline -\text{sgn}(x_1)\|\mathbf{x}\|_2 & \hat{R}_1 \hat{A}_1 \\ 0 & \\ 0 & \end{array} \right] \quad (5)$$

$$\hat{A}_1 = [(\hat{A}_1)_1, (\hat{A}_1)_2, (\hat{A}_1)_3] \quad (6)$$

$$\hat{R}_1 \hat{A}_1 = [(\hat{R}_1 \hat{A}_1)_1, (\hat{R}_1 \hat{A}_1)_2, (\hat{R}_1 \hat{A}_1)_3] \quad (7)$$

$$(\hat{R}_1 \hat{A}_1)_i = (\hat{A}_1)_i - \frac{2}{\|\mathbf{u}_1\|_2^2}\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T(\hat{A}_1)_i \quad (8)$$

$$R_1 A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ \sqrt{2} & -2\sqrt{2} & -2\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & -2\sqrt{2} & 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$R_1 A R_1 = \left[\begin{array}{c|ccc} a_{11} & \|\mathbf{x}\|_2 & 0 & 0 \\ \hline \|\mathbf{x}\|_2 & & & \\ 0 & & \hat{R}_1 \hat{A}_1 \hat{R}_1 & \\ 0 & & & \end{array} \right] \quad (10)$$

$$\left[(\hat{R}_1 \hat{A}_1 \hat{R}_1) \right]_i = \left[(\hat{R}_1 \hat{A}_1) \right]_i - \frac{2}{\|\mathbf{u}_1\|_2^2} \mathbf{u}_1 \mathbf{u}_1^T \left[(\hat{R}_1 \hat{A}_1) \right]_i \quad (11)$$

$$R_1 A R_1 = \begin{bmatrix} 4 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 4 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\hat{R}_1 \hat{A}_1 \hat{R}_1 = \begin{bmatrix} 4 & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 4 & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\hat{R}_1 \hat{A}_1 \hat{R}_1)_{11} & \mathbf{y}^T \\ \mathbf{y} & \hat{A}_2 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{y} + \text{sgn}(y_1) \|\mathbf{y}\|_2 \mathbf{e}_1^{(2)} = \sqrt{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$\hat{R}_2 = \mathbb{1}_2 - \frac{2}{\|\mathbf{u}_2\|_2^2} \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T \quad (15)$$

$$(\hat{R}_2 \hat{A}_2)_i = (\hat{A}_2)_i - \frac{2}{\|\mathbf{u}_2\|_2^2} \mathbf{u}_2 \mathbf{u}_2^T (\hat{A}_2)_i \quad (16)$$

$$\hat{R}_2 \hat{A}_2 = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$\hat{R}_2 \hat{A}_2 \hat{R}_2 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$R_2 R_1 A R_1 R_2 = \begin{bmatrix} 4 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ \sqrt{2} & 4 & -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -\sqrt{2} & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad (19)$$