7 មធ្យមស្ថិតិ

វត្ថុបំណង

- ❑ គណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត
- ❑ គណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមតារាងនៃប្រែកង់កើន ។

1. មធ្យម

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេកត់ត្រាចំនួនភ្ញៀវដែលបានចូលមកកាត់សក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ។

ថ្ងៃ	ចន្ទ	អង្គារ	ពុធ	ព្រហស្បតិ៍	សុក្រ	សៅរ៍	អាទិត្យ
ចំនួនភ្ញៀវ	18	12	30	26	38	42	48

យើងសង្កេតឃើញថា ភ្ញៀវដែលបានចូលមកកាត់សក់មានចំនួនមិនស្មើគ្នាទេ ។ បើគេយកចំនួនភ្ញៀវសរុបមកចែកឱ្យ 7 ថ្ងៃ

$$\frac{18 + 12 + 30 + 26 + 38 + 42 + 48}{7} = 30.5 \text{ ។}$$

គេបង្គត់ចំនួននោះដោយ 30 ក្នុងករណីនេះម្ចាស់ហាងតែងតែប្រាប់គេថាហាងខ្ញុំមានភ្ញៀវជាមធ្យមចំនួន 30 នាក់ គេតាង $\bar{x}$ ជាមធ្យមនៃទិន្នន័យ $\bar{x} = 30$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេស្រង់ចំនួនភ្ញៀវដែលបានជិះរថយន្តឈ្នួលចំនួន 30 ថ្ងៃ ដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖

20	16	18	10	20	16	18	20	14	16
10	16	20	18	12	12	10	18	16	20
14	16	17	20	12	14	18	20	16	14

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com

គេផ្តុំទិន្នន័យនីមួយៗ ទៅតាមចំនួនដងហៅថាប្រេកង់ គេបានតារាងខាងក្រោម

គេអាចគណនាចំនួនភ្ញៀវជាមធ្យមដែលបានជិះរថយន្ត

$\bar{x} = \frac{481}{30} = 16.03$

គេបង្គត់ចំនួន $\bar{x} = 16$

ចំនួនភ្ញៀវ x	ប្រេកង់ f	ផលគុណ $x\,f$
10	3	30
12	3	36
14	4	56
16	7	112
17	1	17
18	5	90
20	7	140
សរុប	30	481

- បើគេតាង x ជាចំនួនភ្ញៀវនោះ

  $x_1 = 10$, $x_2 = 12$, ...

- បើគេតាង f ជាចំនួនប្រេកង់នោះ

  $f_1 = 3$, $f_2 = 3$, ...

- បើគេតាង $x\,f$ ជាផលគុណនោះ

  $x_1\,f_1 = 10 \times 3 = 30$

  $x_2\,f_2 = 12 \times 3 = 36$ ។

ក្នុងករណីនេះ $\bar{x} = \frac{x_1\,f_1 + x_2\,f_2 + x_3\,f_3 + x_4\,f_4 + x_5\,f_5 + x_6\,f_6 + x_7\,f_7}{f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5 + f_6 + f_7}$

$= \frac{30 + 36 + 56 + 112 + 17 + 90 + 140}{3 + 3 + 4 + 7 + 1 + 5 + 7} = 16.03$ ។

ជាទូទៅ : មធ្យមកំណត់ $\bar{x} = \frac{x_1\,f_1 + x_2\,f_2 + \ldots + x_n\,f_n}{f_1 + f_2 + \ldots + f_n}$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : សុខបានប្រឡងលើមុខវិជ្ជាទាំង 9 ដោយទទួលបានពិន្ទុមធ្យម 78 ។ ដោយដឹងថាពិន្ទុលំអិតទៅតាមមុខវិជ្ជារួមមាន 90 95 75 80 85 65 70 60 ហើយនៅសល់ពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាមានមួយទៀតដែលសុខពុំបានចាំ ។ ចូរកំណត់រកពិន្ទុដែលភ្លេចនោះ ។

ចម្លើយ : តាង x ជាពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាដែលភ្លេច

យើងបាន $\frac{90 + 95 + 75 + 80 + 85 + 65 + 70 + 60 + x}{9} = 78$

$\frac{620 + x}{9} = 78$, $620 + x = 702$, $x = 82$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : គេឱ្យសិស្សពីរថ្នាក់ដែលមានចំនួនសិស្ស 25 នាក់ ស្មើគ្នាដើម្បីប្រឡងមុខវិជ្ជាដូចគ្នាដោយទទួលបានពិន្ទុដូចខាងក្រោម ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ថ្នាក់ A

ពិន្ទុ x	ប្រេកង់ f	$x\,f$
2	4	8
3	8	24
5	6	30
7	2	14
8	2	16
9	3	27
សរុប	25	119

ថ្នាក់ B

ពិន្ទុ x	ប្រេកង់ f	$x\,f$
3	2	6
4	8	32
5	10	50
6	4	24
9	1	9
សរុប	25	121

ចូរប្រៀបធៀបមធ្យមពិន្ទុនៃថ្នាក់ទាំងពីរ ។

ចម្លើយ : $\bar{X}_A = \frac{119}{25} = 4.76$ $\bar{X}_B = \frac{121}{25} = 4.84$

នាំឱ្យ $\bar{X}_B > \bar{X}_A$ បញ្ជាក់ថាពិន្ទុមធ្យមនៃថ្នាក់ B ខ្ពស់ជាងថ្នាក់ A ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរគណនាមធ្យមនៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ។

x	0	1	2	3	4
y	3	6	5	2	2

2. មេដ្យាន

មានករណីខ្លះ មធ្យមមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីតាងឱ្យទិន្នន័យទេ ។

ឧទាហរណ៍ : ចំពោះទិន្នន័យ 4 2 5 2 6 16 4 20 6

គណនាមធ្យម $\bar{X} = \frac{4+2+5+2+6+16+4+20+6}{9} = 7.2$ ។

បើគេរៀបតួនៃទិន្នន័យពីតូចទៅធំ

							$\bar{X}$	
2	2	4	4	5	6	6	16	20

គេសង្កេតឃើញថា មានទិន្នន័យប្រាំពីរតួដែលតូចជាងមធ្យម $\bar{X}$ ហើយមានតែទិន្នន័យពីរតួប៉ុណ្ណោះដែលធំជាង $\bar{X}$ ក្នុងករណីនេះគេអាចជ្រើសរើសទិន្នន័យ 5 ដែលមានទីតាំងឋិតនៅកណ្តាលនៃទិន្នន័យ ដើម្បីធ្វើជាតំណាងហៅថា **មេដ្យាន** ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh krou.kh

គេតាងមេដ្យានដោយ m_e , $m_e = 5$

តម្លៃ 5 ជាតួទី 5 ក្នុងចំណោមតួទាំង 9

ទីតាំងនេះបានដោយ $\frac{9+1}{2} = 5$ ។

ដូចនេះ បើ n ជាចំនួនតួនៃទិន្នន័យនោះមេដ្យានត្រូវបិតនៅទីតាំង $\frac{n+1}{2}$ ។ មានករណីខ្លះគេក៏អាចកំណត់មេដ្យាននៃទិន្នន័យដែលមានចំនួនតួដូចជា : 4 4 5 7 8 9

មេដ្យានត្រូវបិតនៅចន្លោះ 5 និង 7 ។

ហេតុនេះ $m_e = \frac{5+7}{2} = 6$ ។

> ***ជាទូទៅ :*** បើទិន្នន័យមួយមាន n តួ មេដ្យាននៃទិន្នន័យមួយដែលបានរៀបតាមលំដាប់មានទីតាំងបិតនៅតួទី $\frac{n+1}{2}$ ។
>
> - បើ n ជាចំនួនសេស មេដ្យានជាតម្លៃនៃតួកណ្តាល
> - បើ n ជាចំនួនគូ មេដ្យានជាមធ្យមនៃតម្លៃកណ្តាលទាំងពីរ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : តាមតារាងទិន្នន័យនៃឧទាហរណ៍ 2 រកមេដ្យាននៃចំនួនភ្ញៀវដែលបានជិះរថយន្ត ។

ចម្លើយ : ដើម្បីរកមេដ្យានគេត្រូវកំណត់ទីតាំងរបស់វា ។ ដោយទិន្នន័យមានចំនួនតួ $n = 30$ ទីតាំងនៃមេដ្យានគឺ $\frac{30+1}{2} = 15.5$ មានន័យថាមេដ្យានត្រូវបិតនៅចន្លោះតួទី 15 និងតួទី 16 ។

តាមតារាង

តួទី $10 = 3 + 3 + 4$ ទើបតែស្មើនឹង 14

ដូចនេះ គេបន្តរកតួទី 15 និងតួទី 16

ឃើញថា $x_{15} = 16 : x_{16} = 16$ ។

ដូចនេះមេដ្យាន $m_e = \frac{16+16}{2} = 16$ ។

ចំនួនភ្ញៀវ x	ប្រេកង់ f	$x\ f$
10	3	30
12	3	36
14	4	56
16	7	112
17	1	17
18	5	90
20	7	140
សរុប	30	481

ប្រតិបត្តិ : ចូររកមេដ្យាននៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ (ឯកតាគិតជាពាន់រៀល)

ប្រាក់បៀវត្សន៍	200	300	350	700	840	950
ប្រេកង់	6	2	2	1	1	1

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/

3. ម៉ូត

ឧទាហរណ៍ : ខាងក្រោមនេះជាចំនួនទូរទស្សន៍ ដែលបានលក់ដាច់តាមថ្ងៃនីមួយៗ ។

1	3	3	3	4	4	1	2	2	2
5	4	4	2	2	2	2	1	4	4
3	2	3	2	2	3	2	3	2	3

គេផ្តុំទិន្នន័យនីមួយៗទៅតាមប្រេកង់រួច សង់តារាងប្រេកង់ ដើម្បីរកចំនួនទូរទស្សន៍ដែលបានលក់ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ ។ គេគណនា $\bar{X} = \frac{80}{30} = 2.6$ ដោយចំនួនទូរទស្សន៍ត្រូវតែជាចំនួនគត់ ។

ចំនួនទូរទស្សន៍ x	ប្រេកង់ y	$x\,f$
1	3	3
2	12	24
3	8	24
4	6	24
5	1	5
សរុប	30	80

ដូចនេះគេមិនអាចយក $\bar{X} = 2.6$ តាងឱ្យទិន្នន័យបានទេ ក្នុងករណីនេះគេត្រូវជ្រើសរើសយកទិន្នន័យណាដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ ។

តាមតារាងនៃទិន្នន័យមួយថ្ងៃលក់បានទូរទស្សន៍ 2 គ្រឿងមានប្រេកង់ធំជាងគេ ហេតុនេះ 2 ជាតំណាងឱ្យទិន្នន័យហៅថា **ម៉ូត** ។

> ***ជាទូទៅ :*** នៅក្នុងទិន្នន័យមួយម៉ូតជាតម្លៃនៃទិន្នន័យដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ ។

លំហាត់គំរូ : តើទិន្នន័យមួយណាដែលគួរប្រើមធ្យម មេដ្យានឬម៉ូត ?

ក. ស្បែកជើងដែលលក់ដាច់ជាងគេមានទំហំលេខ $9\frac{1}{2}$ ។

ខ. វិក្កយបត្រភ្លើងក្នុងមួយខែជាមធ្យម 150 000 រៀល ។

គ. ពាក់កណ្តាលនៃបុគ្គលិកទទួលបានប្រាក់ខែ 420 000 រៀល ។

ចម្លើយ :

ក. គេប្រើម៉ូតតាងឱ្យទំហំលេខនៃស្បែកជើង $m_o = 9\frac{1}{2}$ ។

ខ. គេប្រើមធ្យមតាងឱ្យការចំណាយលើថ្លៃភ្លើង $\bar{X} = 150\ 000$ រៀល ។

គ. គេប្រើមេដ្យានតាងឱ្យប្រាក់ខែបុគ្គលិក $m_e = 420\ 000$ រៀល ។

ប្រតិបត្តិ : ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម ។

10 8 13 12 7

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

4. ការកំណត់មធ្យមស្ថិតិតាមតារាងប្រេកង់កើន

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃពិន្ទុសិស្សមួយថ្នាក់

ពិន្ទុ x	ប្រេកង់ f	$x\,f$	ប្រេកង់កើន
1	4	4	4
2	5	10	9
3	2	6	11
4	10	40	21
5	15	75	36
6	8	48	44
7	4	28	48
9	2	18	50
សរុប	50	229	223

តារាងនេះផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឱ្យគេគណនាមធ្យមស្ថិតិ

ការកំណត់មធ្យម : $\bar{x} = \dfrac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \ldots\ldots + x_n f_n}{f_1 + f_2 + \ldots\ldots + f_n}$

តាមជួរឈរទី 3 : ផលបូកនៃ $x\,f = 229$

តាមជួរឈរទី 4 : ផលបូកប្រេកង់ $f = 50$

$$\bar{x} = \frac{229}{50} = 4.58$$

ការកំណត់មេដ្យាន :

មេដ្យានមានទីតាំងឋិតនៅចំកណ្តាលនៃទិន្នន័យ ក្នុងករណីនេះគេអាចប្រើជួរឈរទី 4 មានន័យថា មេដ្យានឋិតនៅទីតាំង $\dfrac{50+1}{2} = 25.5$ តាមតារាងទីតាំងទី 21 ត្រូវនឹងពិន្ទុ 4 ។ ដូចនេះទីតាំងទី 25.5 ត្រូវនឹងពិន្ទុ 5 , $m_e = 5$ ។

ការកំណត់ម៉ូត : ទិន្នន័យដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេគឺ 5 ដូចនេះ $m_o = 5$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលពិន្ទុនៃសិស្សមួយថ្នាក់

ម៉ាសជា kg	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
ប្រេកង់	2	6	5	10	8	6	3

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/

- **ការកំណត់ម៉ូត :** ថ្នាក់ដែលមានប្រេកង់ធំជាថ្នាក់ 60-70 មានន័យថាមនុស្សភាគច្រើនមានម៉ាសចន្លោះពី 60 ទៅ 70kg ។
- **ការកំណត់មធ្យម** $\bar{x}$ **:** គេត្រូវរកតម្លៃដែលតាងឱ្យថ្នាក់នីមួយៗ ជាមធ្យមនៃតួចុងទាំងពីរនៃថ្នាក់ ហៅថា ផ្ទឹតនៃថ្នាក់ ។

ផ្ទឹតនៃថ្នាក់ទី 1 : $\frac{30+40}{2} = 35$, ផ្ទឹតនៃថ្នាក់ទី 2 : $\frac{40+50}{2} = 45$ $\bar{x} = \frac{2\ 660}{40} = 66.5$ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត គេក៏ត្រូវសង់ប្រេកង់កើន ដើម្បីងាយស្រួយក្នុងការកំណត់មេដ្យាន

ថ្នាក់នៃម៉ាស	ប្រេកង់ f	ផ្ទឹតនៃថ្នាក់ x	$x\ f$	ប្រេកង់កើន
30-40	2	35	70	2
40-50	6	45	270	8
50-60	5	55	275	13
60-70	10	65	650	23
70-80	8	75	600	31
80-90	6	85	510	37
90-100	3	95	285	40
	40		2660	

- **ការកំណត់មេដ្យាន :**

ប្រើជួរឈរទី 5 : មេដ្យានមានទីតាំង $\frac{40+1}{2} = 20.5$ ហេតុនេះមេដ្យានចំថ្នាក់ 60-70

លំហាត់គំរូ : ក្នុងការបំពេញសំណួរ សិស្សខ្លះអាចបញ្ចប់លឿន ហើយខ្លះទៀតយឺត ។ ខាងក្រោមនេះជារយៈពេលគិតជានាទី x ដែលសិស្សបានបំពេញសំណួរ

ថ្នាក់នៃពេល (គិតជានាទី)	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
ប្រេកង់ f	2	5	10	12	3

ចូរកំណត់ មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត ។

ចម្លើយ : តាមតារាងនេះអ្នកដែលអាចប្រើពេលពី 10 ហើយតិចជាង 15 នាទី ដើម្បីបញ្ចប់សំណួរមានតែ 2 នាក់ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

រកផ្ទឹតនៃថ្នាក់នីមួយៗ

$\frac{10+15}{2} = 12.5$, $\frac{15+20}{2} = 17.5$, $\frac{20+25}{2} = 22.5$, $\frac{25+30}{2} = 27.5$, $\frac{30+35}{2} = 32.5$

ថ្នាក់នៃពេល	ប្រេកង់ f	ផ្ទឹតនៃថ្នាក់ x	$x\,f$	ប្រេកង់កើន
10-15	2	12.5	25	2
15-20	5	17.5	87.5	7
20-25	10	22.5	225	17
25-30	12	27.5	330	29
30-35	3	32.5	97.5	32
			765	

ការកំណត់មធ្យម : $\bar{x} = \frac{765}{32} = 23.9$

ការកំណត់ម៉ូត : 25-30 ជាម៉ូត ព្រោះមានប្រេកង់ 12 ធំជាងគេ

ការកំណត់មេដ្យាន : មេដ្យានមានទីតាំង $\frac{32+1}{2} = 16.5$ ។

ដូចនេះ ថ្នាក់ 20-25 ជាមេដ្យាន ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យ ។

ថ្នាក់	21-28	28-35	35-42	42-49	49-56	56-63	63-70
ប្រេកង់	3	7	12	15	12	7	3

? លំហាត់

1. គេធ្វើការសិក្សាលើចំនួនសិស្សទៅតាមកម្រិតថ្នាក់ ហើយទទួលបានទិន្នន័យដូចខាងក្រោម ។

ថ្នាក់	ចំនួនសិស្ស
ថ្នាក់មត្តេយ្យ	20 20 21 21
ថ្នាក់ទី 1	22 23 22 23
ថ្នាក់ទី 2	20 19 21 20
ថ្នាក់ទី 3	22 23 23 23
ថ្នាក់ទី 4	27 27 26
ថ្នាក់ទី 5	20 19 22 20
ថ្នាក់ទី 6	23 24 24 24

ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃចំនួនសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

2. មនុស្សមួយក្រុមសាកល្បងហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ចុះម៉ាសគិតជា kg ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖


4	6	2	10	8	5	1	4
8	10	5	4	3	7	2	4
6	8	7	4	5	3	6	4

គណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត ។

3. ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម ។

x	16	18	19	20	21	30
f	1	4	9	3	2	1

4. ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម ។



5. ទិន្នន័យខាងក្រោមជាចំនួនកូនរបស់បុគ្គលិកនៃរោងចក្រមួយ

0	0	0	1	3	3	1	1	1	3	0	0	4	3	3	1	1	0	5	6	2	2
3	2	2	4	1	6	5	6	0	1	1	2	3	5	1	3	2	1	1	1	1	2
1	3	3	4	1	1	0	3	1	1	1	3	3	6	0	0	3	4	1	3	2	3
0	2	4	1	3	4	1	5	6	3 ។												

ក. ចូរបង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់ធៀបកើនជាភាគរយ ។

ខ. ចូរគណនាមេដ្យាន ។

6. តារាងខាងក្រោមនេះ ជាបំណែងចែកសីតុណ្ហភាពតាមខែនីមួយៗ ។

ខែ	មករា	កុម្ភៈ	មីនា	មេសា	ឧសភា	មិថុនា	កក្កដា	សីហា	កញ្ញា	តុលា	វិច្ឆិកា	ធ្នូ
^oC	14°	14°	23°	32°	35°	30°	30°	29°	25°	22°	18°	15°

ក. ចូរគណនាម៉ូត ។

ខ. ចូរគណនាសីតុណ្ហភាពមធ្យម ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh krou...

7. នៅឆមាសទី 1 សុខប្រឡង 8 មុខវិជ្ជាទទួលបានមធ្យមភាគពិន្ទុ 89 ។ តើនៅឆមាសទី 2 នេះសុខត្រូវប្រឹងបង្កើនពិន្ទុប៉ុន្មានទៀតទើបធានាឱ្យមធ្យមភាគពិន្ទុរបស់គេស្មើនឹង 90 ។

8. ក្នុងការពិសោធបណ្តុះកូនប៉េងប៉ោះ ដោយប្រើជីគីមីអស់រយៈពេល មួយសប្តាហ៍គេទទួលបានលទ្ធផលនៃបម្រែបម្រួល កម្ពស់កូនប៉េងប៉ោះដូចតារាងខាងក្រោម ៖

កម្ពស់ (mm)	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
ចំនួនកូនប៉េងប៉ោះ	3	15	72	15	91	35	8

ក. ចូរបង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន និងប្រេកង់ថយ ។

ខ. ចូររកចំនួនកូនប៉េងប៉ោះដែលមានកម្ពស់យ៉ាងតិច 20mm និង 35mm ។

គ. ចូររកម៉ូត មេដ្យាន និងកម្ពស់មធ្យមនៃកូនប៉េងប៉ោះ ។ ចូរប្រៀបធៀបមេដ្យាននិងមធ្យម ។

9. តារាងខាងក្រោមជាបរិមាណទឹកដោះគោម្សៅ ដែលទារកបៅអស់ក្នុងមួយថ្ងៃ ។

ទឹកដោះគោម្សៅគិតជា g	40 – 45	45 – 50	50 – 55	55 – 60	60 – 65	65 – 70	70 – 75	75 – 80	80 – 85	85 – 90
ចំនួនក្មេង	8	11	31	61	54	58	43	25	17	7

ក. ចូររកចំនួនទារកដែលបៅទឹកដោះគោក្នុងមួយថ្ងៃ ។

ខ. តើក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាមធ្យមទារកម្នាក់បៅទឹកដោះគោម្សៅអស់ប៉ុន្មានក្រាម ?

គ. ចូរគណនាម៉ូត ។

ឃ. ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយតាមក្រាប ។

10. ក្រោយពីវាស់កម្ពស់សិស្សនៃវិទ្យាល័យមួយ គេបានលទ្ធផលដូចតារាងខាងក្រោម ៖

កម្ពស់ cm	145 – 150	150 – 155	155 – 160	160 – 165	165 – 170	170 – 175	175 – 180
ចំនួនសិស្ស	31	95	131	272	120	77	48

ក. ចូរបង្កើតតារាងប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ។

ខ. ចូរសង់ក្រាប នៃពហុកោណប្រេកង់កើន ។

គ. ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយនៅលើក្រាប ។

facebook.com/moeys youtube.com/moeys www.grou.moeys.gov.kh