

CONSIDERE LA SERIE DE LETES_t, CUYO MODELO ESTÁ DADO POR

$$(1 - 0.388B^4) \nabla T(\text{LETES}_t) = (1 - 0.481B^2) \hat{a}_t$$

$$\text{CON } \hat{\sigma}_a = 1109.7 \text{ Y } T(\text{LETES}_t) = \frac{\text{LETES}_t}{1000} ;$$

DEJAMOLANDO

$$\nabla T(\text{LETES}_t) - 0.388 \nabla T(\text{LETES}_{t-4}) = \hat{a}_t - 0.481 \hat{a}_{t-2}$$

$$T(\text{LETES}_t) - T(\text{LETES}_{t-1}) - 0.388(T(\text{LETES}_{t-4}) - T(\text{LETES}_{t-5})) \\ = \hat{a}_t - 0.481 \hat{a}_{t-2}$$

$$\hat{a}_t = T(\text{LETES}_t) - T(\text{LETES}_{t-1}) - 0.388 T(\text{LETES}_{t-4}) + 0.388 T(\text{LETES}_{t-5}) \\ + 0.481 \hat{a}_{t-2}$$

CONSIDEREMOS COMO VALORES INICIALES $\hat{a}_{18} = 0$, $\hat{a}_{19} = 0$,

DESPUÉS DE APLICAR EL MÉTODO DE APROXIMACIÓN DE RESIDUOS

SE OBTIENE $\hat{a}_{60} = -799$ Y CON ESTE VALOR CALCULAMOS

LA ACTUALIZACIÓN DEL PRONÓSTICO

$$\begin{aligned} \hat{T}(\text{LETES}_{t=60})(1) &= \hat{T}(\text{LETES}_{t=59})(2) - \hat{y}_1 \hat{a}_{60} \\ &= 7941.57 - (-1)(-7799.8) \\ &= 7941.57 - (-1)(-799) = 7941.57 - 799 \\ &= 7141.16 \end{aligned}$$

De même on a

$$\hat{T}(Z_{t+1})(h) = \hat{T}(Z_t)(h+1) - \hat{\gamma}_h \hat{Q}_{t+1} ; \quad h \geq 1 \quad \dots (2)$$