

MATRIZ CLÍNICA — ETAPA 2

Pesos clínicos dos sintomas — Método ÚTERA

1. EIXO ESTROGÊNICO

Sintoma	Peso
Fluxo intenso	3
Coágulos	4
Cólica forte	3
Dor mamária	3
Edema/retenção	2
Enxaqueca cíclica	2
Irritabilidade pré-menstrual	1
Acne cíclica	1
Intestino preso na fase lútea	2
Sensação de inchaço corporal	1

Lógica clínica

- Coágulos e fluxo intenso têm maior especificidade estrogênica
 - Edema e irritabilidade isoladamente são inespecíficos
 - Dor mamária associada a fluxo intenso aumenta relevância clínica
-

2. EIXO PROGESTERONA

Sintoma	Peso
Insônia na fase lútea	3
Ansiedade pré-menstrual	2
Irritabilidade	2
Compulsão por doces	2
Piora importante do humor	3
Spotting pré-menstrual	4
Baixa energia pré-menstrual	2
Sensibilidade emocional aumentada	2
Sono fragmentado	3
Pior tolerância ao estresse	2

Lógica clínica

- Spotting pré-menstrual é altamente sugestivo
- Insônia lútea recorrente tem alto valor clínico
- Humor isoladamente não deve disparar alerta forte

3. EIXO GLICÊMICO

Sintoma	Peso
Irritabilidade em jejum	3
Tremores/ansiedade em jejum	4
Desejo intenso por doces	3
Compulsão no final do dia	3
Sonolência após refeições	3
Queda de energia entre refeições	3

Calorões associados a jejum	2
Piora do treino	2
Fome noturna	3
Inflamação após excesso de carboidrato	2

Lógica clínica

- Tremor em jejum é muito sugestivo
 - Compulsão isolada é menos específica
 - Associação entre jejum + irritabilidade + doce aumenta força do eixo
-

4. EIXO ADRENAL

Sintoma	Peso
Acordar cansada	3
Insônia	3
Despertares noturnos	4
Agitação com cansaço	4
Ansiedade	2
Irritabilidade	2
Compulsão noturna	2
Baixa recuperação pós-treino	3
Dor corporal frequente	2
Energia instável	3
Sensação de alerta constante	3

Lógica clínica

- Agitação + cansaço simultâneos têm grande relevância

- Despertar noturno recorrente pesa muito
 - Irritabilidade isolada não é suficiente
-

5. EIXO INTESTINAL / ESTROBOLOMA

Sintoma	Peso
Constipação	3
Intestino solto	2
Alternância intestinal	4
Gases	2
Distensão abdominal	3
Acne persistente	2
Cólica menstrual	2
Fluxo intenso	2
Dor mamária	2
Piora hormonal quando intestino trava	4
Digestão lenta	3

Lógica clínica

- Alternância intestinal tem alta relevância funcional
 - Relação intestino ↔ sintomas hormonais aumenta peso
 - Distensão recorrente é mais relevante que gases isolados
-

6. EIXO INFLAMATÓRIO

Sintoma	Peso
Cólica intensa	3

Enxaqueca	3
Dor articular	3
Edema	2
Acne inflamatória	3
Fluxo intenso	2
Coágulos	2
Fadiga importante	3
Recuperação muscular ruim	2
Corpo dolorido	3

Lógica clínica

- Dor articular + fadiga aumentam suspeita inflamatória
 - Acne inflamatória persistente tem peso importante
 - Coágulo isolado não define eixo inflamatório
-

7. EIXO ANDROGÊNICO

Sintoma	Peso
Acne mandibular	4
Oleosidade excessiva	3
Queda de cabelo	4
Irregularidade menstrual	3
Ciclos anovulatórios	4
Dificuldade de perceber ovulação	2
Pouco muco cervical fértil	2
Aumento de pelos	4

Piora de pele na ovulação/lútea 2

Compulsão associada à RI 1

Lógica clínica

- Acne mandibular é altamente sugestiva
 - Hirsutismo e anovulação têm peso muito alto
 - Muco cervical sozinho tem pouca especificidade
-

8. EIXO PERIMENOPAUSA / TRANSIÇÃO HORMONAL

Sintoma	Peso
Ciclos irregulares	3
Ciclos espaçando progressivamente	4
Amenorreia temporária	4
Fluxo imprevisível	3
Mudança importante do fluxo	3
Calorões	4
Suor noturno	4
Insônia	3
Irritabilidade	2
Dor articular	3
Fadiga	2
Piora de enxaqueca	2
Oscilação emocional	2
Mudança metabólica inexplicável	3

Lógica clínica

- Calorões e suor noturno têm alta especificidade
 - Espaçamento progressivo dos ciclos é altamente relevante
 - Irregularidade isolada não fecha padrão peri
-

PRINCÍPIOS DOS PESOS

- Sintomas inespecíficos nunca devem dominar o score
- Sintomas recorrentes devem ganhar mais peso futuramente
- Associação entre sintomas aumenta relevância clínica
- O sistema deve priorizar padrões ao longo do tempo
- Fases do ciclo modificam interpretação dos sintomas
- O objetivo é leitura funcional, não diagnóstico médico