

GUIA 6 DE 8 · MATERIAL DE APOIO



Mordedores Naturais

15 opções naturais e seguras para aliviar o desconforto da erupção dos dentinhos, e os sinais que ajudam a reconhecer a fase de teething.

15

opções

0-24m

faixa coberta

nutrimae.app

Sinais normais de teething

A erupção dos dentinhos costuma começar entre 4 e 7 meses, mas varia bastante — alguns bebês nascem com dente, outros só por volta de 1 ano.

- ☐ Salivação bem acima do normal
- ☐ Gengiva inchada ou avermelhada em um ponto específico
- ☐ Vontade de morder tudo que encontra pela frente
- ☐ Irritabilidade, principalmente à noite
- ☐ Leve aumento de temperatura (sem chegar a febre)
- ☐ Sono mais agitado que o habitual
- ☐ Recusa parcial de alimentos por desconforto na boca

Quando NÃO é só teething

Febre alta (acima de 38°C) — teething não costuma causar febre alta, procure o pediatra · diarreia ou vômitos — também não costumam ser causados por teething, investigue outra causa · feridas abertas, sangramento ou pus na gengiva — pare de usar mordedores e procure avaliação.

Sempre supervisione o uso

⚠️ Regra de segurança

Supervisione o bebê enquanto ele usa qualquer mordedor, do início ao fim — nunca deixe sozinho, mesmo por poucos segundos, mesmo com itens considerados seguros.

1 15 opções, uma por uma



Maçã gelada

a partir de 4m

Fatia grossa gelada (não congelada dura). Nunca em rede/saquinho de silicone sem supervisão.



Cenoura gelada

a partir de 4m

Bastão grosso, gelado na geladeira (não congelado). Sempre supervisionado.



Banana congelada

a partir de 4m

Pedaço grosso, levemente congelado. Amolece com a saliva.



Melancia gelada

a partir de 4m

Bastão sem sementes, gelado.



Pera gelada

a partir de 4m

Fatia grossa gelada.



Beterraba cozida gelada

a partir de 6m

Bastão cozido e depois gelado — mais firme que cru.

Mordedores (continuação)



Mordedor de silicone

a partir de 0m

Grau alimentício, sem BPA, peça única sem partes soltas.



Pão amanhecido

a partir de 6m

Fatia grossa e levemente dura, do dia anterior.



Biscoito de polvilho

a partir de 6m

Tipo biscoito de polvilho leve, que amolece rápido com a saliva.



Torrada

a partir de 6m

Fatia de pão bem tostada, em formato de bastão.



Pano de algodão gelado

a partir de 0m

Pano limpo, umedecido e gelado na geladeira (não no congelador).

Mordedores (continuação)



Chupeta gelada

a partir de 0m

Chupeta própria para gelar, seguindo instrução do fabricante.



Mamadeira ou copinho gelado

a partir de 4m

Bordas de silicone gelado, sempre supervisionado.



Abacaxi gelado

a partir de 6m

Bastão sem casca, gelado. Sabor ácido costuma aliviar bem.



Biscoito duro tipo italiano

a partir de 6m

Biscoito rígido tradicional para bebês, formato de bastão.

Dica: alterne 2 ou 3 opções gelada/dura/macia — o alívio muda conforme o ponto da gengiva que está incomodando naquele dia.

N

Um dentinho de cada vez

Consulte a lista completa de mordedores e a rotina de sono ajustada para os dias mais difíceis de teething, direto no app.

nutrimae.app

Este material é um apoio educativo ao dia a dia da introdução alimentar e não substitui a avaliação individual de um pediatra ou nutricionista. Cada bebê tem seu próprio ritmo — use este guia como referência geral, e não como prescrição.