DOCUMENTO CLÍNICO & PROGRAMA OFICIAL

Método Vitalidad Masculina

El Protocolo Clínico 3C: Restauración Prostática, Vaciado Completo de Vejiga y Reactivación de la Firmeza Alpha en 14 Días

Autor: Dr. Vitor Teixeira & Especialistas en Urología Funcional
Formato: Documento Digital Certificado (PDF / A4)
Soporte Oficial: drvitorteixeira@outlook.com
Licencia: Acceso Personal e Intransferible

Módulo 1: La Raíz Oculta de la Inflamación Prostática

1.1 El Eje Próstata-Vascular y el Círculo Vicioso de la DHT

A partir de los 40 años, más del 73% de los hombres experimentan una alteración enzimática silenciosa: la conversión acelerada de testosterona libre en dihidrotestosterona (DHT) mediada por la enzima 5-alfa-reductasa en el estroma prostático.

Esta sobreestimulación no solo provoca hipertrofia prostática benigna (crecimiento del tejido prostático), sino que oprime directamente la uretra bulbosa, reduciendo el lumen urinario hasta en un 65%. El resultado directo es el flujo intermitente, el goteo molesto y la necesidad urgente de levantarse 3, 4 o más veces por noche.

Sin embargo, el daño no se limita a las vías urinarias. La arteria dorsal del pene y las ramas cavernosas atraviesan el lecho fascial adyacente a la cápsula prostática. Cuando la glándula está inflamada y fibrótica, el flujo arterial se estrangula, comprometiendo severamente la rigidez y el mantenimiento de las erecciones.

> ■ ***NOTA CLÍNICA Y RECOMENDACIÓN:***
> *La inflamación prostática crónica es la causa número uno de disfunción eréctil secundaria en hombres mayores de 40 años, con frecuencia diagnosticada erróneamente como problema psicológico.*

1.2 Los 3 Errores Fatales que Empeoran el Cuadro

1. **Abuso de descongestionantes y cafeína refinada:** Generan vasoconstricción aguda del esfínter urinario interno, provocando retención urinaria severa.

2. **Sedentarismo prolongado:** Estancamiento venoso pélvico. Sentarse más de 6 horas continuas dobla la presión intraprostática.

3. **Suplementación aislada sin cofactores:** Tomar Saw Palmetto genérico sin licopeno biodisponible ni zinc quelado tiene menos del 8% de absorción real.

Módulo 2: El Protocolo 3C Paso a Paso

2.1 Fase 1: Calmar la Congestión (Días 1 a 4)

El objetivo primordial de esta fase es desinflamar el parénquima prostático y relajar el tono del músculo liso del cuello vesical.

Tónico Matutino Alcalinizante: En ayunas, tomar 250 ml de agua tibia con 1/4 cucharadita de bicarbonato puro de grado alimenticio y 15 gotas de limón recién exprimido. Esta mezcla alcaliniza temporalmente el pH urinario, reduciendo la acidez corrosiva sobre los conductos prostáticos.

Terapia de Drenaje Circulatorio: Realizar 3 minutos de contracción y descompresión diafragmática profunda cada mañana para activar la bomba venosa pélvica.

	Acción Terapéutica	Beneficio Biológico
	Tónico Alcalinizante en ayunas	Reduce acidez y quemazón miccional
	Infusión de Epilobio + Ortiga verde	Inhibición natural de 5-alfa reductasa

	Compresa tibia perineal (10 min)	Dilatación vascular y descompresión local

2.2 Fase 2: Cicatrizar y Regenerar (Días 5 a 10)

En esta fase introducimos los nutrientes específicos para regenerar el epitelio secretor de la próstata: Beta-sitosterol, Zinc quelado con bisglicinato (30 mg) y extracto de semillas de calabaza estandarizado.

Notará una disminución dramática en las micciones nocturnas (de 4-5 veces a 0-1) y una fuerza renovada en el chorro urinario.

> ■ ***NOTA CLÍNICA Y RECOMENDACIÓN:***
> *Evite consumir líquidos 2 horas antes de dormir. La vejiga debe descansar completamente desinflamada durante el ciclo circadiano reparador.*

2.3 Fase 3: Consolidar y Reactivar la Firmeza (Días 11 a 14)

Una vez restaurado el espacio anatómico y liberado el paquete vásculo-nervioso, activamos la síntesis de óxido nítrico endotelial para recuperar erecciones matutinas involuntarias y máxima rigidez.

Combinamos L-Citrulina malato (3g) con antioxidantes de uva y corteza de pino marino para sellar las válvulas venosas del cuerpo cavernoso.

Módulo 3: Plan Nutricional Anti-DHT de 14 Días

3.1 Lista Maestra de Alimentos Terapéuticos

Incorpore diariamente: semillas de calabaza tostadas sin sal (30g), tomates cocidos con aceite de oliva extravirgen (máxima biodisponibilidad de licopeno), brócoli al vapor (sulforafano anti-proliferativo) y té verde matcha ceremonial.

	Compuesto Activo	Dosis Diaria Recomendada
	Cucurbitacina + Zinc	2 cucharadas soperas
	Licopeno trans-isomérico	1 taza de salsa artesanal
	Capsaicina vasoactiva	1 pizca en ensaladas
	Curcumina libre	1 cucharadita con grasa buena