

■ NÍVEL 01 · MÓDULO 02 · POP-HM-01

POP — Higienização de Mãos

Lactário | Enteral | BLH

Código	POP-HM-01
Versão	1.0
Elaboração	___/___/___
Elaborado por	Dra. Stephanie Araujo de Souza — CRN8 13998
Aprovado (RT)	_____ CRN: _____
Próxima revisão	___/___/___ (máx. 12 meses)

Base legal: RDC 503/2021 | RDC 918/2024 | OMS — Guia de Higienizacao das Maos

1. Os 5 momentos obrigatórios

Moment o	Quando higienizar
1°	ANTES de entrar na área de produção / lactário / BLH
2°	ANTES de manipular qualquer alimento, fórmula ou leite humano
3°	APÓS tocar superfícies possivelmente contaminadas (lixo, rosto, cabelo)
4°	APÓS usar o banheiro
5°	APÓS qualquer interrupção (telefone, documentos, visita)

2. Higienização simples com água e sabão — 7 passos OMS (40–60 seg)

Passo	Procedimento
1	Molhar as mãos. Aplicar sabão líquido bacteriostático.
2	Friccionar palmas entre si, dedo a dedo, por 15 seg.
3	Palma direita sobre dorso esquerdo com dedos entrelaçados, e vice-versa.
4	Palmas com dedos entrelaçados.
5	Dorso dos dedos contra a palma oposta com dedos entretidos.
6	Polegar esquerdo em movimento circular com mão direita e vice-versa.
7	Ponta dos dedos e unhas contra a palma. Enxaguar. Secar com papel toalha. Fechar torneira com o papel.

3. Higienização cirúrgica com clorexidina — entrada na manipulação

Obrigatória para todos os manipuladores antes de iniciar a manipulação de produtos no lactário e BLH. Reduz a carga microbiana das mãos e antebraços a nível compatível com procedimento asséptico.

Base legal: RDC 918/2024 art. 50 | Recomendacao da Rede BLH-BR/Fiocruz



Pas so	Procedimento	Tempo
1	Retirar relógio, anéis e pulseiras antes de iniciar.	—
2	Molhar mãos e antebraços até os cotovelos com água corrente.	—
3	Aplicar sabão de clorexidina degermante (2% ou 4%) nas mãos e antebraços.	—
4	Escovar as unhas com escovinha estéril (uso único ou esterilizada).	30 seg
5	Friccionar palmas, dorso, espaços interdigitais, polegares e antebraços com o sabão. Seguir a técnica OMS dos 7 passos.	2 min
6	Enxaguar com água corrente da ponta dos dedos em direção ao cotovelo.	30 seg
7	Repetir a aplicação de clorexidina e fricção (sem escovinha).	2 min
8	Enxaguar completamente da ponta dos dedos para o cotovelo.	30 seg
9	Secar com papel toalha estéril de uso único — da ponta dos dedos em direção ao cotovelo.	—
10	NÃO tocar em nenhuma superfície até colocar as luvas ou iniciar a manipulação.	—

Atencao: Escovinha: usar escovinha estéril descartável OU esterilizada em autoclave. Nunca reutilizar sem esterilização. Manter em embalagem fechada até o uso.

4. Álcool gel 70° — quando usar e quando NÃO usar

Situação	Álcool gel é suficiente?
Mãos visivelmente limpas e secas, entre etapas	SIM — aplicar e friccionar até secar
Após usar o banheiro	NÃO — lavar com água e sabão obrigatoriamente
Mãos sujas com material orgânico	NÃO — lavar com água e sabão
Entrada no turno / área de produção	NÃO — higienização cirúrgica obrigatória
Troca de atividade (produto para produto)	SIM — álcool gel aceitável