

NÍVEL 01 · MÓDULO 02 · POP-PAR-01

POP — Sequência de Paramentação

Lactário | Nutrição Enteral Hospitalar | Banco de Leite Humano

Campo	Informação
Código	POP-PAR-01
Versão	1.0
Data de elaboração	___/___/___
Elaborado por	Dra. Stephanie Araújo de Souza — CRN8 13998
Aprovado por (RT)	_____ CRN: _____

1. Objetivo

Padronizar a sequência correta de paramentação para entrada nas áreas de produção do lactário, enteral e BLH, garantindo a barreira de contaminação em todas as etapas.

■ Base legal: RDC 503/2021 art. 79-82 (TNE) | RDC 918/2024 art. 47-55 (BLH)

2. Sequência obrigatória de paramentação — ordem não pode ser alterada

Ordem	Etapas	Detalhe obrigatório
1	Retirar adornos	Anéis, pulseiras, relógio, brincos, colares. Deixar fora da área de produção.
2	Touca / gorro	Cobrir TODO o cabelo, incluindo franja e costeletas. Verificar no espelho.
3	Máscara	Cobrir nariz e boca. Ajustar o clipe nasal. Não baixar durante a produção.
4	Higienização das mãos	Técnica OMS completa (40-60 seg). Ver POP-HM-01.
5	Avental / jaleco limpo	Vestir após higienização das mãos. Avental exclusivo do setor.
6	Luvas (quando indicado)	Somente após avental. Trocar ao mudar de atividade ou ao romper.

3. Paramentação por área — especificidades

Área	EPI obrigatório	Observações específicas
Lactário — preparo de fórmulas	Touca, máscara, avental, luvas	Avental de cor diferente do restante do hospital
TNE — preparo de enteral	Touca, máscara, avental	Luvas ao manipular NE não industrializada
BLH — sala de ordenha	Touca, máscara, avental, luvas	Máscaras trocadas a cada doadora



Área	EPI obrigatório	Observações específicas
BLH — processamento	Touca, máscara, avental, luvas	Luvas estéreis para reenvase e pasteurização
BLH — sala de distribuição	Touca, máscara, avental	Sem exigência de luvas para distribuição em embalagem fechada

4. Erros frequentes e como evitar

Erro observado	Risco	Como evitar
Touca não cobre todo o cabelo	Queda de cabelo no produto	Verificar no espelho antes de entrar. Supervisão diária.
Máscara abaixo do nariz	Contaminação por aerossóis	Treinamento e reforço visual (cartaz na entrada)
Adornos não retirados	Contaminação física e microbiológica	Aviso na entrada. Registro de NC se persistir.
Luvas colocadas antes do avental	Contaminação do interior da luva	Seguir a sequência numerada sem exceção
Avental do setor levado ao banheiro	Contaminação cruzada	Avental deve permanecer no setor. Gancho exclusivo na saída.

5. Saída da área produtiva

Ao sair da área de produção, retirar EPIs na seguinte ordem:

1. Luvas (descartar em lixeira com tampa)
2. Avental (dobrar para dentro e pendurar no gancho exclusivo ou descartar, conforme POP do serviço)
3. Máscara (descartar ou guardar conforme orientação da RT)
4. Higienizar as mãos antes de retirar a touca
5. Touca (descartar ou guardar conforme orientação da RT)

■ Este POP deve ser afixado na entrada da área de produção em formato plastificado, de forma visível para toda a equipe.