



■ NÍVEL 01 · MÓDULO 03 · REFERÊNCIA RÁPIDA

Tabela de Tempo x Temperatura

Referência rápida — lactário, enteral e BLH

1. Fórmulas infantis preparadas

Condição	Temperatura	Tempo máximo	Base
Água para reconstituição	70°C ou acima	Usar imediatamente após atingir a temp.	OMS 2007
Fórmula reconstituída sem refrigeração	Temperatura ambiente	2 horas	OMS 2007
Fórmula reconstituída refrigerada	2°C a 8°C	24 horas	OMS 2007
Fórmula reconstituída congelada	Não recomendado	Não congelar	OMS 2007

2. Nutrição enteral (NE)

Condição	Temperatura	Tempo máximo	Base
NE não industrializada	Temperatura ambiente	Administrar imediatamente após preparo	RDC 503/2021 art.45
NE industrializada sistema fechado	Conf. fabricante	Conf. fabricante	RDC 503/2021 art.46
NE em infusão sistema aberto	Temperatura ambiente	4 horas após início da infusão	Boas práticas
NE preparada sob refrigeração	2°C a 8°C	Máximo 24 horas	Boas práticas

3. Leite humano ordenhado (BLH) — armazenamento

Produto	Temperatura	Tempo máximo	Base
LHOC geladeira domiciliar	2°C a 8°C	12 horas	RDC 918/2024
LHOC freezer domiciliar	-18°C ou abaixo	15 dias	RDC 918/2024
LHOC freezer do BLH	-18°C ou abaixo	30 dias	RDC 918/2024
LHOC geladeira do BLH (após chegada)	2°C a 8°C	Processar em até 24h	RDC 918/2024
Pasteurização Holder	62,5°C	30 minutos exatos	RDC 918/2024
LHOP freezer do BLH	-18°C ou abaixo	6 meses	RDC 918/2024
LHOP geladeira após descongelamento	2°C a 8°C	24 horas — não recongelar	RDC 918/2024

4. Descongelamento do LHOP — protocolo específico

Atenção: Protocolo CHC-UFPR / Fiocruz: ligar o banho-maria e aguardar atingir 40°C. Desligar o equipamento. Aguardar aproximadamente 10 minutos para a temperatura estabilizar — o banho frequentemente ultrapassa 40°C e precisa estabilizar. Introduzir os frascos de LHOP congelado SOMENTE após confirmar que a temperatura está em 40°C. Monitorar com termômetro calibrado durante todo o processo.



Etapa do descongelamento	Temperatura	Ação
Ligar o banho-maria	—	Aguardar aquecer
Banho atinge 40°C	40°C	Desligar o equipamento
Aguardar estabilização	≈40°C (pode estar levemente acima — aguardar)	Monitorar. ~10 min para estabilizar.
Confirmar temperatura em 40°C	40°C	Introduzir os frascos de LHOP congelado
Acompanhar o descongelamento	Manter próximo de 40°C	Agitar suavemente os frascos se necessário
LHOP descongelado pronto	2°C a 8°C (refrigerado) ou distribuir imediatamente	Consumir em até 24h. Não recongelar.

5. Zona de perigo — referência rápida

Temperatura	Situação	Ação obrigatória
Abaixo de 2°C	Geladeira fria demais — risco de congelamento	Ajustar equipamento. Registrar.
2°C a 8°C	ZONA SEGURA para refrigeração	Manter. Registrar 2x ao dia.
8°C a 60°C	ZONA DE PERIGO — multiplicação bacteriana	Produto não deve permanecer >2h nesta faixa
62,5°C ± 0,5°C por 30 min	Pasteurização Holder	Monitorar continuamente. Registrar.
-18°C ou abaixo	ZONA SEGURA para congelamento	Manter. Registrar 2x ao dia.