อาหารทางสายให้อาหาร

เป็นการให้อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว สามารถไหลผ่านทางสายให้อาหารเข้าสู่ร่างกาย จัดให้สำหรับผู้ป่วยที่รับประทานอาหารทางปากไม่ได้ มีคุณค่าสารอาหารหลักครบ 5 หมู่ และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผู้ป่วยแต่ละคน

สำหรับบุคคลประเภทใดบ้าง

อาหารทางสายให้อาหารเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ เช่น

- ผู้ป่วยหมดสติ ไม่รู้สึกตัว
- ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางปาก คอ และหลอดอาหาร
- ผู้ป่วยที่มีอาการเบื่ออาหารมาก รับประทานอาหารทางปากได้น้อย
- ผู้ป่วยที่แพทย์ต้องการจะปรับปรุงภาวะโภชนาการให้ดีขึ้นในระยะเวลาสั้น

ข้อควรปฏิบัติในการเตรียมอาหารทางสายให้อาหาร

<u>ความสะอาด</u> ก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำอาหารทางสายให้อาหาร ภาชนะทุกชิ้นที่ใช้ในการทำต้องลวกด้วยน้ำร้อนก่อนและหลังใช้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารมีเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วง ท้องเดินได้

<u>การชั่งตวงส่วนผสม</u> ควรตวงให้ถูกต้องตามปริมาณของสูตรที่กำหนดให้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน

<u>การเก็บรักษา</u> อาหารทางสายให้อาหารที่ทำเสร็จแล้วต้องเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส และใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำในการให้อาหารทางสายให้อาหาร

- ปริมาณอาหารที่ให้ผู้ป่วยแต่ละมื้อ ให้ตามปริมาณที่แพทย์/นักโภชนาการกำหนด
- การให้อาหารแต่ละมื้อให้ระยะเวลาห่างกันประมาณ 4-6 ชั่วโมง
- ควรอุ่นอาหารก่อนให้ผู้ป่วยทุกครั้ง

อุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในการเตรียม

- เครื่องปั่นไฟฟ้า
- ตราชั่งตวงอาหาร หรือเครื่องชั่งดิจิตอล
- ชุดช้อนตวง
- ถ้วยตวงขนาด 500 มิลลิลิตร
- ถ้วยตวงขนาด 2000 มิลลิลิตร
- กระชอนกรองอาหาร
- หม้อนึ่ง ถ้วยสำหรับนึ่งอาหาร
- มีด เขียง
- ทัพพีตักอาหาร
- ถุงบรรจุอาหาร หนังยางรัด



สูตรอาหารปั่นผสมหรืออาหารทางสายให้อาหาร

สูตร....ทั่วไป 1:1 (350x4) 1400 kcal/วัน.....

ส่วนผสม

- เนื้อไก่/เนื้อปลาสุก...180 กรัม (12 ช้อนโต๊ะ)
- ไข่ต้มสุกทั้งฟอง.....2 ฟอง.....
- ฟักทองหรือแครอท....150 กรัม (3 ทัพพี).....
- กวางตุ้ง/มะเขือเทศสุก.....-.....
- กล้วยน้ำว้า.....45 กรัม (1 ผล).....
- ข้าวสวย/ข้าวต้ม.....110 กรัม (2 ทัพพี).....
- น้ำตาลทราย....36 กรัม (3 ช้อนโต๊ะ).....
- น้ำมันพืช.....9 ช้อนชา.....
- เกลือป่น.....ครึ่งช้อนชา.....
- มอลโตเด็กตริน.....6 ช้อนโต๊ะ.....
- น้ำต้มสุกปริมาณ.....1400 มล.....
- อื่นๆ.....

จำนวนมื้อและเวลา

จำนวนมื้อ	เวลา
3	06.00, 14.00, 22.00
4	06.00, 12.00, 18.00, 24.00
5	06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00
6	06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 02.00

วิธีทำ

1. เตรียมข้าวสวยหรือข้าวต้มที่สุกแล้ว พร้อมไข่ไก่ต้มสุก
2. เตรียมเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อไก่หรือปลา หั่นเป็นชิ้นเล็ก จากนั้นนำไปต้มหรือนึ่งจนสุก แล้วชั่งตวงตามสัดส่วนที่กำหนด
3. เตรียมผัก เช่น ฟักทอง แครอท หรือผักชนิดอื่น ๆ โดยล้างให้สะอาด ปอกเปลือก เอาเมล็ดออก ล้างซ้ำอีกครั้ง หั่นเป็นชิ้นเล็ก แล้วนำไปต้มหรือนึ่งจนสุก จากนั้นชั่งตวงตามสัดส่วน
4. เตรียมผลไม้ เช่น กล้วยน้ำว้าสุก หรือผลไม้ชนิดอื่น ๆ โดยปอกเปลือก เอาเฉพาะเนื้อ หั่นหรือฝาน แล้วนำไปต้มหรือนึ่งจนสุก และชั่งตวงตามสัดส่วน
5. นำวัตถุดิบที่เตรียมไว้ทั้งหมด รวมถึงน้ำมันพืช น้ำตาลทราย เกลือป่น และมอลโตเดกซ์ตริน ใส่ลงในเครื่องปั่น เติมน้ำต้มสุกเล็กน้อยพอให้ปั่นได้ จากนั้นปั่นจนเนื้อเนียนละเอียด
6. นำส่วนผสมที่ปั่นแล้วมากรองผ่านกระชอน 2–3 ครั้ง หรือจนเนื้อเนียนและฟองลดลง
7. เทส่วนผสมที่กรองแล้วลงในถ้วยตวง เติมน้ำต้มสุกเพิ่มจนได้ปริมาตรตามต้องการ (.....1400..... มิลลิลิตร)
8. บรรจุอาหารลงในถุงหรือภาชนะ แบ่งตามปริมาณที่ผู้ป่วยควรได้รับในแต่ละมื้อ และเก็บไว้ในตู้เย็น

อาหารทางสายให้อาหาร





ด้วยความปรารถนาดี

งานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลวังทอง

จ.พิษณุโลก