ANEXO PARA A DR.IAGENDA · ORIENTAÇÕES DE PREPARO

Orientações de preparo dos exames

Preparos padronizados a partir dos PDFs oficiais. Itens marcados ainda aguardam a validação da equipe médica. NU.V.E.M Medicina · Rua Ceará, 600 – Sala 101, Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG · versão de 04/11/2026.

Medicamentos: Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

1 Manometria Esofágica de Alta Resolução

Avalia os movimentos do esôfago e o funcionamento dos esfíncteres. Ajuda no diagnóstico de acalasia, disfagia (dificuldade para engolir) e refluxo refratário.

Duração do exame **10 a 20 minutos** | Tempo total na clínica **cerca de 2 horas** | Sedação **não há** | Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Verifique com o seu convênio a cobertura e a necessidade de autorização prévia.
- Medicamentos: veja a tabela abaixo (alguns são suspensos 48 horas antes).

JEJUM

- Jejum absoluto (inclusive de água) a partir das 22h da noite anterior ao exame.
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site (/exames/preparos e card da página do exame) e o chatbot Nuvete dizem "jejum de 6 horas". O PDF oficial diz jejum absoluto a partir das 22h. Confirmar qual vale.
- Casos especiais (crianças, idosos, diabéticos etc.): o tempo de jejum é avaliado individualmente.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Para dor torácica (se for o caso): Dilacoron, Isordil, Cardizem e Diltiazem	**Suspender 48 horas antes**	Somente com orientação médica
Para motilidade: Domperidona, Metoclopramida, Bromoprida ou similares	**Suspender 48 horas antes**	Somente com orientação médica
Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, antiácidos, Sucrafilm ou Lufta Gastro Pro	**Pode manter**	Não interfere neste exame

Medicamento	Conduta	Observação
Medicamentos para hipertensão, diabetes, problemas pulmonares e cardiológicos	**Pode manter**	[VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O card do site diz "podem ser tomados normalmente com o mínimo de água possível"; o PDF pede jejum absoluto inclusive de água a partir das 22h. Definir como o paciente toma esses medicamentos no dia.*

NO DIA DO EXAME

- Levar o pedido médico e exames anteriores (endoscopia digestiva, raio-X do esôfago).
- Levar a guia ou o número de autorização do convênio.
- Chegada antecipada: Não informado no preparo oficial (o card do site diz 15 minutos antes). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir a antecedência de chegada.
- Acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir se é necessário ou recomendado.
- Roupa: Não informado no preparo oficial (o card do site diz roupas com abertura frontal, evitar gola alta). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar orientação de vestimenta.
- Como é o exame: uma sonda fina é introduzida pelo nariz; o desconforto é momentâneo e bem tolerado pela maioria dos pacientes.

APÓS O EXAME

- Você pode retornar às atividades normais imediatamente, inclusive dirigir.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.
- Se você usa algum dos medicamentos da tabela e não recebeu orientação do seu médico sobre suspendê-lo, fale com o médico solicitante ou com a clínica antes do exame.

Fonte: public/pdfs/preparo-manometria-esofagica-v1.pdf

2 Manometria Anorretal

Avalia o funcionamento do esfíncter anal e do assoalho pélvico. Ajuda no diagnóstico de incontinência fecal, constipação obstrutiva e dificuldades para evacuar.

Duração	Sedação	Jejum	Pedido médico
40 a 60 minutos	**não há**	**não é necessário**	**obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Compre o MINILAX na farmácia (não precisa de receita).

JEJUM

- Não é necessário jejum: pode se alimentar normalmente.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

- Informe à equipe TODOS os medicamentos em uso, especialmente anticoagulantes.
- Suspensão de medicamentos: Não informado no preparo oficial (sem orientação de suspensão).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se algum medicamento deve ser suspenso (o chatbot cita supositórios; o site cita laxativos e fitoterápicos apenas para informar).

NO DIA DO EXAME

- Preparo intestinal (essencial): aplicar 02 MINILAX 2 horas antes do horário agendado, conforme as instruções da embalagem, deitado de lado com os joelhos dobrados. Aguardar a evacuação completa antes de sair para a clínica. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Divergência entre versões: o site diz "enema Minilax® ou similar 1 a 2 horas antes"; o chatbot Nuvete diz "enema retal (Fleet) 2 horas antes"; as versões em inglês e espanhol citam Fleet®. Confirmar produto, quantidade e horário.
- Levar o pedido médico e exames anteriores (ultrassom pélvico, colonoscopia).
- Roupa confortável e fácil de remover (calça larga ou saia). Higiene íntima normal.
- Acompanhante: não é obrigatório, mas é bem-vindo.
- Chegar 10 minutos antes do horário agendado.
- Como é o exame: é feito deitado de lado; uma pequena sonda é introduzida delicadamente. O procedimento é bem tolerado.

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir orientações pós-exame (retorno às atividades, sinais de alerta).

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-manometria-anorretal-v1.pdf

3 pHmetria e Impedanciometria Esofágica

Monitoramento de 24 horas

Registra o refluxo do estômago para o esôfago durante 24 horas, enquanto você mantém sua rotina normal.

Instalação **15 a 20 minutos** | Monitoramento **24 horas contínuas** | Atividade **normal durante o exame** | Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Suspensão de medicamentos: veja a tabela abaixo. A suspensão correta é fundamental para o resultado.
- Em alguns casos o médico pede que o exame seja feito em uso dos medicamentos. Essa orientação deve estar escrita no pedido médico.

JEJUM

- Jejum ABSOLUTO a partir das 22h da noite anterior (nem água). Casos específicos são avaliados individualmente. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site e o chatbot Nuvete dizem "jejum de 4 horas antes da instalação do cateter". Confirmar qual vale.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Inibidores de bomba de prótons (IBP): omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol	**Suspender 10 dias antes**	Somente com autorização do médico solicitante [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O site e o chatbot dizem 7 dias; o PDF oficial diz 10 dias.*
Procinéticos: domperidona, metoclopramida, bromoprida	**Suspender 48 horas antes**	Somente com autorização do médico solicitante
Antiácidos: Mylanta, Gaviscon, Luftal, bicarbonato	**Suspender 48 horas antes**	Somente com autorização do médico solicitante [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O site diz 24 horas antes; o PDF oficial diz 48 horas.*
Bloqueadores H2: ranitidina, famotidina	**Suspender 48 horas antes**	Somente com autorização do médico solicitante

- NUNCA suspenda IBP ou qualquer medicamento por conta própria. Em caso de dúvida, ligue para a clínica antes de parar qualquer medicamento.

NO DIA DO EXAME

- Tome banho antes de ir para a clínica.
- Use blusa de botão na frente, para facilitar a colocação. Evite roupas apertadas ou com zíper.

- Chegada antecipada e acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir antecedência de chegada e se acompanhante é necessário.

DURANTE O MONITORAMENTO

- Mantenha a atividade normal: trabalhar, caminhar, dormir.
- Registre no diário de sintomas fornecido pela clínica: horário das refeições, sintomas e posição (deitado, sentado, em pé).
- Não ingira café, chás com cafeína, refrigerantes com cafeína ou qualquer medicamento para refluxo. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O chatbot Nuvete acrescenta "evitar alimentos muito ácidos (limão, vinagre)", que não está no PDF oficial. Confirmar.
- Banho: após a colocação do aparelho não é permitido tomar banho; evitar banho de imersão. Não pode molhar o aparelho. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Contradição dentro do PDF oficial: o item 2 diz que não será permitido tomar banho; o item 7 diz que uma ducha rápida é permitida com cuidado. Definir a orientação.
- Mantenha a cabeceira da cama na posição habitual (não elevar artificialmente).

APÓS O EXAME

- Retirada do aparelho: Não informado no preparo oficial (não diz quando nem onde devolver o equipamento). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir orientação de retorno à clínica para retirada/devolução do aparelho após 24 horas.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.
- Antes de suspender qualquer medicamento, se tiver dúvida sobre a autorização do seu médico.

Fonte: public/pdfs/preparo-phmetria-impedanciometria-v1.pdf

4 Teste Respiratório para H. pylori

Exame não invasivo para diagnóstico e para confirmar a eliminação da bactéria Helicobacter pylori, associada a gastrite, úlcera e outros problemas do estômago.

Duração **30 a 40 minutos** | Método **não invasivo**

Pedido médico **obrigatório, com o tipo de exame especificado**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Alguns medicamentos precisam ser suspensos semanas antes: veja a tabela abaixo.

JEJUM

- Jejum de 2 horas antes do exame. Somente água é permitida. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O chatbot Nuvete diz "jejum de 4 horas"; o PDF oficial diz 2 horas. Confirmar.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Antibióticos (amoxicilina, claritromicina, metronidazol etc.)	**Suspender 4 semanas antes**	Somente com orientação médica
IBP (omeprazol, pantoprazol etc.)	**Suspender 2 semanas antes**	Somente com orientação do médico solicitante
Bismuto (Bepanthol, De-Nol etc.)	**Suspender 4 semanas antes**	Interfere diretamente no resultado [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O PDF cita "Bepanthol" como exemplo de bismuto. Conferir o exemplo (Bepantol é um produto de dexpantenol, não de bismuto).*
Análogos de GLP-1 (Ozempic®, Rybelsus®, Wegovy®, Mounjaro®)	**Suspender 3 semanas antes**	Somente com orientação médica

- NUNCA suspenda medicamentos por conta própria. Sempre consulte o médico que solicitou o exame antes de interromper qualquer tratamento.

NO DIA DO EXAME

- Não fume no dia do exame (o tabaco interfere no resultado).
- Não masque chiclete nem chupe balas nas 2 horas anteriores.
- Escove os dentes normalmente, mas não engula o creme dental.
- Leve o pedido médico e informe à equipe todos os medicamentos em uso.
- Chegada antecipada e acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir antecedência de chegada e se acompanhante é necessário.

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se pode voltar às atividades e à alimentação normalmente.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-teste-respiratorio-hpylori-v1.pdf

5 Teste Respiratório para SIBO, IMO, Lactose e Frutose

H_2 · CH_4 · H_2S

Avalia supercrescimento bacteriano (SIBO/IMO), intolerâncias alimentares e outros distúrbios digestivos pela análise do ar exalado. Sem coleta de sangue.

Duração **2 a 3 horas** | Método **não invasivo, sem coleta de sangue** | Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Dieta do dia anterior (muito importante). PODE comer: arroz branco cozido; carne bovina, frango ou peixe grelhado (sem temperos industrializados); ovos cozidos, mexidos ou estrelados; azeite de oliva e sal a gosto; água à vontade.
- NÃO pode comer no dia anterior: feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico e derivados; leite, queijo, iogurte e laticínios; pão, massas, biscoitos, farinha de trigo; frutas (especialmente maçã, pera, banana, melancia); brócolis, couve, repolho, cebola, alho, aspargos; mel, açúcar, refrigerantes, sucos; álcool de qualquer tipo.
- Colonoscopia ou enema opaco: aguardar 2 semanas após o procedimento (preparo intestinal) para fazer o exame.
- Probióticos: Não informado no preparo oficial (o PDF não cita). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site e o chatbot Nuvete pedem "não usar probióticos nas 2 semanas anteriores", que não está no PDF oficial. Confirmar.

JEJUM

- Jejum completo de 12 horas antes do exame. Somente água é permitida, em pequena quantidade, até 0h. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Ambíguo: não fica claro se a água é permitida depois de 0h. Confirmar.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Antibióticos (exceto colírios): amoxicilina, claritromicina, metronidazol etc.	**Suspender 4 semanas antes**	Somente com orientação médica
Análogos de GLP-1 (Ozempic®, Rybelsus®, Wegovy®, Mounjaro®)	**Suspender 3 semanas antes**	Somente com orientação médica
Laxativos	**Suspender 5 a 7 dias antes**	Se clinicamente possível, com orientação médica [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O chatbot Nuvete diz "não usar laxativos nas 24 horas anteriores"; o PDF oficial diz 5 a 7 dias.*

NO DIA DO EXAME

- Faça uma boa higiene da boca e use enxaguante bucal sem álcool. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site diz "não escovar os dentes com creme dental 30 minutos antes" e o chatbot diz "não escovar os dentes 30 min antes". Confirmar a orientação de higiene oral.

- Não fume no dia do exame. Não use chicletes ou balas. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site e o chatbot dizem "não fumar 1 hora antes"; o PDF oficial diz no dia do exame.
- Não pratique exercícios físicos intensos na 1 hora anterior.
- Chegue 10 minutos antes, com o pedido médico em mãos.
- Use roupas confortáveis: o exame é realizado sentado.
- Acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir se acompanhante é necessário (exame de 2 a 3 horas).

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se pode voltar à alimentação e aos medicamentos normalmente.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-teste-respiratorio-sibo-imo-v1.pdf

6 Halimetria e Sialometria

Diagnóstico de halitose

A halimetria mede os compostos sulfurados que causam o mau hálito. A sialometria avalia a produção de saliva. Qualquer substância na boca pode alterar o resultado.

Duração **30 a 40 minutos** | Método **não invasivo** | Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- 3 semanas antes: não utilizar antibióticos. Caso tenha utilizado, informe a clínica.
- 24 horas antes: não comer alho, cebola e comidas com temperos fortes (pimentas, curry etc.).
- 24 horas antes: não utilizar cosméticos aromáticos nem enxaguantes bucais.
- 24 horas antes: não ingerir bebidas alcoólicas.
- 12 horas antes: não fumar. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Contradição no PDF oficial: "12 horas antes: não fumar" e, na tabela, "não fumar nas 2 h anteriores". O site e o chatbot dizem 2 horas. Definir.

JEJUM

- 3 horas antes: não tomar café nem chá aromatizado.
- 2 horas antes: é obrigatório comer algo (uma refeição leve é suficiente).
- Bebidas: somente água é permitida.
- O quadro-resumo do PDF indica "Jejum: 3 horas". [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Contradição: o PDF indica jejum de 3 horas e, ao mesmo tempo, refeição leve obrigatória 2 horas antes. O site e o chatbot dizem "não comer nas 3 horas anteriores". Definir a regra de alimentação.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Antibióticos	**Não utilizar nas 3 semanas anteriores**	Se tiver utilizado, informe a clínica

- Informe à equipe todos os medicamentos em uso.

NO DIA DO EXAME

- Escove os dentes imediatamente após a refeição, usando sua pasta habitual.
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site e o chatbot dizem "não escovar os dentes nas 2 horas anteriores". Confirmar.
- Não use enxaguantes bucais. Evite perfume, desodorante e cremes com fragrância forte.
- Evite atividade física intensa na 1 hora anterior.
- Leve o pedido médico.
- Chegada antecipada e acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir antecedência de chegada e se acompanhante é necessário.
- Como é o exame: rápido, indolor e não invasivo; você sopra em um aparelho que mede os gases do ar exalado.

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se há orientação pós-exame.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.
- Se você usou antibiótico nas últimas 3 semanas.

Fonte: public/pdfs/preparo-halimetria-sialometria-v1.pdf

7 Avaliação Pélvica com Biofeedback Eletromiográfico

Avalia o funcionamento do assoalho pélvico, para diagnóstico e tratamento de incontinência urinária ou fecal, disfunções pélvicas e constipação obstrutiva. Realizada pela fisioterapeuta.

Duração **40 a 60 minutos** | Método **não invasivo** | Jejum **não é necessário**

Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Se possível, faça um diário miccional nos 3 dias anteriores.
- Anote seus sintomas: frequência urinária, episódios de perda, constipação, dor pélvica.
- Anote seu histórico: partos, cirurgias pélvicas, prolapsos, tratamentos anteriores.

JEJUM

- Não é necessário jejum: pode se alimentar normalmente.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

- Leve a lista de todos os medicamentos em uso, inclusive vitaminas, suplementos e fitoterápicos, e informe especialmente anticolinérgicos e diuréticos.
- Suspensão de medicamentos: Não informado no preparo oficial (sem orientação de suspensão). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se algum medicamento deve ser suspenso.

NO DIA DO EXAME

- Higiene íntima normal.
- Roupas confortáveis e fáceis de remover (calça larga, legging ou saia).
- Leve o pedido médico e exames anteriores, se houver: manometria anorretal, ultrassom pélvico, urodinâmica.
- Chegue 10 minutos antes.
- Acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir se acompanhante é permitido/recomendado.
- A avaliação é realizada com respeito e privacidade; tire suas dúvidas antes de iniciar.

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se há orientação pós-avaliação.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-avaliacao-pelvica-v1.pdf