

华东理工大学《药理学》2021-2022 学年第一学期期末试卷

一、选择题（每题 1 分，共 60 分）

（一）单项选择题

- 1、肾上腺素平喘后，病人心悸感是（ ）
A.副反应 B.毒性反应 C.过敏反应 D.继发反应
- 2、药物与受体结合特性的描述，哪项有错（ ）
A.可逆性 B.饱和性 C.特异性 D.非竞争性
- 3、药物作用的基本表现是使机体组织器官（ ）
A.功能提高或兴奋 B.功能降低或抑制
C.产生新的功能 D.兴奋和/或抑制
- 4、氯丙嗪引起的下列哪项反应用抗胆碱药治疗无效（ ）
A.迟发性运动障碍 B.帕金森综合征
C.急性肌张力障碍 D.静坐不能
- 5、吗啡不具有的药理作用是（ ）
A.引起腹泻 B.引起恶心、呕吐 C.镇咳作用 D.抑制呼吸中枢
- 6、新斯的明最强的作用是（ ）
A.兴奋骨骼肌 B.兴奋心脏 C.兴奋胃肠平滑肌 D.增加腺分泌
- 7、对阿托品最敏感的腺体是（ ）
A.汗腺 B.泪腺 C.内分泌腺 D.胃肠道腺体
- 8、治疗胆绞痛首选（ ）
A.阿托品+阿斯匹林 B.单用哌替啶
C.单用阿斯匹林 D.哌替啶+阿托品
- 9、下列哪种剂量会产生副作用（ ）
A、治疗量 B、极量 C、中毒量 D、LD50
- 10、肾上腺素升压作用可被下列哪类药物所翻转（ ）
A.M 受体阻断药 B. α 受体阻断药
C.N 受体阻断药 D. β 受体阻断药
- 11、可降压，又能作为吗啡类镇痛药成瘾者的戒毒药物是（ ）
A.钙拮抗药 B.利尿降压药
C.可乐定 D.哌唑嗪
- 12、强心苷治疗心力衰竭最主要的作用是（ ）
A.降低自律性 B.增加自律性
C.正性肌力作用 D.负性频率作用
- 13、可能诱发心绞痛的降压药是（ ）
A.肼苯哒嗪 B.利血平
C.可乐定 D.哌唑嗪
- 14、卡托普利的抗高血压机制是（ ）
A.抑制肾素活性 B.抑制血管紧张素 I 转化酶的活性
C.抑制 β -羟化酶的活性 D.抑制血管紧张素 I 的生成
- 15、阻断血管紧张素 II 受体的降压药是（ ）
A.氨氯地平 B.硝苯地平
C.多沙唑嗪 D.洛沙坦
- 16、治疗强心苷所致的窦性心动过缓的药物是（ ）

- A.肾上腺素 B.阿托品 C.去甲肾上腺素 D.多巴胺
- 17、强心苷中毒时不会出现的反应是（ ）
A.视色障碍 B.消化道反应 C.室性早搏 D.白细胞减少
- 18、解热镇痛药不宜用于治疗（ ）
A.月经痛 B.关节痛 C.感冒头痛 D.胃肠绞痛
- 19、哌唑嗪是（ ）
A. β -受体阻断剂 B. α -受体阻断剂
C.钾通道促进药 D.钙通道阻断药
- 20、卡托普利的降压机制主要是（ ）
A.抑制肾素活性 B.对抗血管紧张素 II 缩血管作用
C.减少醛固酮释 D.抑制血管紧张素 I 转化酶
- 21、关于普萘洛尔降压机制，哪项是不正确的（ ）
A.阻断心脏 β_1 受体，减少心输出量 B.减少肾素分泌
C.阻断延脑 β 受体，降低外周交感活性 D.阻断血 α -受体
- 22、治疗高血压危象最好选用（ ）
A.硝普钠 B.氢氯噻嗪 C.普萘洛尔 D. α -甲基多巴
- 23、噻嗪类利尿药无下列哪项作用（ ）
A.中度利尿作用 B.升高血钾作用
C.升高血糖作用 D.升高血中尿酸浓度
- 24、下列哪一药物的利尿作用与肾上腺皮质有关（ ）
A.螺内酯 B.呋塞米 C.氢氯噻嗪 D.氨苯喋啶
- 25、关于肝素的论述哪项是不正确的（ ）
A.延长凝血酶原时间 B.减少血小板粘附和聚集
C.延长凝血酶时间 D.减少纤维蛋白形成
- 26、关于维生素 K 的论述不正确的是（ ）
A. K_1 、 K_2 需胆汁协助吸收 B.参与凝血酶原形成
C.对肝硬化出血有效 D.可用于水杨酸类所致出血
- 27、妨碍铁剂吸收的物质是（ ）
A.胃酸 B.果糖 C.维生素 C D.鞣酸
- 28、关于维生素 B₁₂ 临床用途哪项是错的（ ）
A.小细胞低色素性贫血 B.巨幼红细胞性贫血
C.神经炎 D.恶性贫血
- 29、量反应和质反应的量效关系主要区别是（ ）
A.剂量大小不同 B.效应性质不同
C.时间长短不同 D.量效曲线图形不同
- 30、尿激酶的作用机制是（ ）
A.激活抗凝血酶 III B.抑制纤维蛋白形成
C.激活纤溶酶原 D.抑制血小板聚集
- 31、糖皮质激素在临床上不用于
A.中毒性感染 B.水痘或流感
C.支气管哮喘 D.全身性红斑狼疮
- 32、严重肝功能不全的病人宜选用（ ）
A.泼尼松 B.泼尼松龙 C.可的松 D.氟氢松
- 33、糖皮质激素抗炎减少瘢痕形成主要是由于（ ）

- A.减少渗出 B.稳定生物膜
C.抑制 DAN 合成 D.降低化学趋向性
- 34、糖皮质激素不会引起（ ）
A.向心性肥胖 B.消化性溃疡
C.糖尿病 D.精神兴奋性降低
- 35、对青霉素 G 敏感的病原菌是（ ）
A.肺炎支原体 B.螺旋体 C.大肠杆菌 D.痢疾杆菌
- 36、下列哪组细菌感染不宜用青霉素 G 治疗（ ）
A.肺炎杆菌与肠球菌 B.肺炎球菌与化脓链球菌
C.白喉与破伤风杆菌 D.钩端与梅毒螺旋体
- 37、青霉素 G 最严重不良反应是（ ）
A、抑制骨髓造血机能 B、二重感染
C、灰婴综合征 D、过敏性休克
- 38、氨基苷类与呋塞米合用时可加重（ ）
A.耳毒性 B.肾毒性 C.水电解质紊乱 D.肝脏损害
- 39、细菌产生钝化酶主要对哪类抗生素产生耐药（ ）
A.大环内酯类 B.第二代头孢菌素
C.四环素类 D.氨基甙类
- 40、细菌对青霉素产生耐药的机制是（ ）
A.改变代谢途径 B.胞浆膜通透性降低
C.产生 β -内酰胺酶 D.产生乙酰转移酶
- 41、关于多西环素的描述错误的是（ ）
A.口服吸收不食物影响 B.作用维持时间较四环素长
C.抗菌活性较四环素弱 D.对支原体、螺旋体有效
- 42、小儿长期使用四环素可引起（ ）
A.耳毒性反应 B.抑制骨、牙生长
C.白细胞降低 D.灰婴综合征
- 43、既对绿脓杆菌有效，又对结核杆菌有效的药物是（ ）
A.庆大霉素 B.链霉素 C.奈替米星 D.阿米卡星
- 44、林可霉素严重的不良反应是（ ）
A.粒细胞减少 B.假膜性肠炎
C.肝脏损害 D.肾脏损害
- 45、氨基苷类抗生素的抗菌作用是（ ）
A.对 G+ 菌有强大抗菌作用 B.对伤寒杆菌有效
C.对 G- 菌有强大抗菌作用 D.对立克次体有效
- 46、大剂量使用可产生阻断神经肌肉作用的抗生素是（ ）
A.半合成青霉素类 B.氟喹诺酮类
C.头孢菌素类 D.氨基苷类
- 47、对庆大霉素的论述错误的是（ ）
A.对结核杆菌有效 B.对绿脓杆菌有效
C.对耐青霉素的金葡菌有效 D.损害前庭功能较轻
- 48、氯霉素最严重的不良反应是（ ）
A.抑制骨髓造血功能 B.过敏性休克
C.损害近曲小管 D.神经肌肉阻断作用

49. 下列哪种情况适用于催产素 ()
- A. 胎位不正宫缩无力 B. 前置胎盘
C. 头盆不称的难产 D. 宫口开全，宫缩无力的难产
50. 下列哪项不是 H₁ 受体阻断剂的作用 ()
- A. 抑制胃酸分泌作用 B. 防晕作用
C. 抗胆碱作用 D. 镇静催眠作用

(二) 多项选择题

51. 对伤寒杆菌有效的抗菌药物是 ()
- A. 羧苄西林 B. 头孢氨苄 C. 氨苄西林
D. 环丙沙星 E. 多西环素
52. 对肺炎支原体有效的药物是 ()
- A. 罗红霉素 B. 四环素 C. 氧氟沙星
D. 阿莫西林 E. 头孢曲松
53. 引起二重感染的致病菌是 ()
- A. 伤寒杆菌 B. 痢疾杆菌 C. 葡萄球菌
D. 白色念珠菌 E. 难辨梭状芽胞杆菌
54. 药物的不良反应包括 ()
- A. 副作用 B. 毒性反应 C. 过敏反应
D. 质反应 E. 量反应
55. 一个较安全有效的药物应该是 ()
- A. 安全范围大 B. 治疗指数大 C. 半数有效量小
D. 半数致死量小 E. 治疗指数小
56. 可增加强心苷对心脏毒性的因素有 ()
- A. 中效利尿药 B. 高血钙 C. 低血钾
D. 低血镁 E. 心肌缺血
57. 脱水药的适应症，下列不正确的是 ()
- A. 青光眼 B. 颅内压升高伴活动性出血者
C. 急性肺水肿 D. 慢性心功能不全伴水肿
58. 可选用铁剂治疗的贫血性疾病是 ()
- A. 慢性腹泻 B. 钩虫病 C. 月经过多 D. 内因子缺乏 E. 痔疮
59. 能抑制血小板粘附和聚集的药物是 ()
- A. 维生素 B₁₂ B. 硫酸亚铁 C. 阿斯匹林
D. 双嘧达莫 E. 噻氯匹啶
60. 糖皮质激素可引起 ()
- A. 伤口愈合加快 B. 胃酸分泌增多 C. 淋巴细胞增多
D. 高血压 E. 低血钾

二、名词解释 (每个 2 分，共 12 分)

- 1、生物利用度
- 2、抗菌活性
- 3、首剂现象
- 4、血浆半衰期
- 5、抗生素

6、效价强度

三、问答题（共 28 分）

- 1、简述氢氯噻嗪的用途与不良反应。
- 2、糖皮质激素有哪些用途？
- 3、青霉素的主要不良反应是什么？怎样防治？
- 4、试述硝酸甘油的抗心绞痛作用机制。

二、名词解释（每个 2 分，共 12 分）

- 1、生物利用度：经任何给药途径给予一定的药物后到达全身血循环内药物的百分率。
- 2、抗菌活性：制药物抑制或杀灭病原微生物的能力。
- 3、首剂现象：部分病人首次用哌唑嗪后可出现体位性低血压、心悸、晕厥等，称为首剂现象。
- 4、血浆半衰期：血浆药物浓度下降一半所需要的时间。它反映体内药物消除速度。
- 5、抗生素：是微生物（细菌、真菌和放线菌属）的代谢产物，分子量较低，低浓度时能杀灭或抑制其他病原微生物。包括天然和人工半合成抗生素两类。
- 6、效价强度：指能引起等效反应的相对浓度或剂量，其值越小则强度越大。

三、问答题（共 28 分）

1、氢氯噻嗪的用途与不良反应。

氢氯噻嗪通过抑制远曲小管近端管腔膜侧的 Na^+-Cl^- 共转运子，因而抑制 NaCl 的重吸收产生利尿作用。

（0.5 分）

【用途】

- 1) 各种类型的水肿 对轻中、度心源性水肿疗效好；（1.0 分）
- 2) 高血压病 是治疗高血压的基础药；（1.0 分）
- 3) 高尿钙伴有肾结石；（0.5 分）
- 4) 肾性尿崩症。（1.0 分）

【不良反应】

- 1) 电解质紊乱 如低血钾、低血钠…（1 分）
- 2) 高尿酸血症 （0.5 分）
- 3) 代谢变化 如高血糖、高脂血症（1 分）
- 4) 过敏反应（0.5 分）

2、糖皮质激素的临床用途

（1）严重感染或炎症 如中毒性菌痢、爆发性流脑、败血症，应配合足量有效的抗菌药；一般病毒性感染不用。 1.5 分

抗炎治疗及防治某些炎症的后遗症 如结脑、脑炎、心包炎、虹膜炎等；早用可减少渗出，后期使用可减轻愈合过程中组织过度增生.. 1 分

（2）自身免疫性疾病 过敏性疾病和自身免疫性疾病：如风湿、类风湿、肾病综合征、支气管哮喘、血管神经性水肿、过敏性休克等。 1 分

（3）抗休克：如中毒性菌痢，宜及早和大剂量应用。 1 分

(4) 血液病：急性淋巴细胞性白血病、粒细胞减少症、血小板减少症和过敏性紫癜等。 1 分

(5) 局部应用。 0.5 分

(1) 眼科：结膜炎、虹膜炎、视网膜炎

(2) 皮肤科：接触性皮炎、湿疹等。

(6) 替代治疗：用于急、慢性肾上腺皮质功能减退症、腺垂体功能减退症及肾上腺次全切除后等疾病。

1 分

3、青霉素的主要不良反应是什么？怎样防治？

[主要不良反应]：过敏反应，包括一般过敏反应… 过敏性休克…。 (3.0 分)

[防治]：(共 4 分，每小点 0.5 分)

1) 仔细询问过敏史，对青霉素过敏者禁用； (0.5)

2) 避免滥用和局部用药； (0.3)

3) 避免在饥饿时注射青霉素； (0.3)

4) 不在没有急救药和抢救设备的条件下使用； (0.3)

5) 初次使用、用药间隔 3 天以上或换批号者必须做皮肤过敏试验，反应阳性者禁用； (1.0)

6) 注射液需临用现配； (0.3)

7) 病人每次用药后需观察 30 分钟，无反应者方可离去；

8) 一旦发生过敏性休克，应首先立即皮下或肌肉注射肾上腺素 0.5~1.0mg，严重者应稀释后缓慢静脉注射或滴注，必要时加入糖皮质激素和抗组胺药。同时采用其他急救措施。 (1.0)

4、试述硝酸甘油的抗心绞痛作用机制。

(1) 硝酸甘油作为一氧化氮供体，在平滑肌细胞内经一氧化氮合酶的催化释放出 NO，NO 结合可溶性鸟苷酸环化酶活性中心的 Fe^{2+} ，激活鸟苷酸环化酶，增加细胞内第二信使 cGMP 的含量，进而激活 cGMP 依赖性蛋白激酶，减少细胞内 Ca^{2+} 释放和外 Ca^{2+} 内流，细胞内 Ca^{2+} 减少使肌球蛋白轻链去磷酸化而松弛血管平滑肌。硝酸甘油的扩血管作用还有 PGI₂ 和细胞膜超极化的机制参与。 (0.5)

(2) 降低心肌耗氧量：前后负荷…室壁张力…。 (2.0)

(3) 扩张冠状动脉，增加缺血区血流灌注：血流阻力…。 (2.0)

(4) 降低左室充盈压，增加心内膜血供，改善左室顺应性； (2.0)

(5) 保护缺血的心肌细胞，减轻缺血损伤：NO、PGI₂、降钙素基因相关肽的合成与释放…。 (0.5)