

被覆空間のノート

箱 (@o_ccah)

2022 年 9 月 23 日

概要

被覆空間について解説する。性質の良い位相空間の上では、被覆空間が基本亜群が作用する集合と一対一に対応し、さらに基本群が作用する集合とも一対一に対応することを示す。

目次

1	被覆空間	2
1.1	位相空間上の空間	2
1.2	ファイバー束と被覆空間	3
1.3	点付き空間の場合	4
2	亜群	4
2.1	亜群	4
2.2	亜群の作用	4
2.3	亜群が作用する集合と群が作用する集合との対応	5
3	基本亜群と基本群	7
3.1	ホモトピー	7
3.2	道と道ホモトピー	7
3.3	道の連結, 逆	8
3.4	基本亜群と基本群	10
3.5	単連結空間	12
4	基本亜群の被覆空間への作用	12
4.1	持ち上げ	12
4.2	被覆空間のホモトピー拡張性質	13
4.3	基本亜群の被覆空間への作用	14
4.4	基本亜群の被覆空間への作用に関する同変写像	16
4.5	持ち上げの存在判定法	17
4.6	普遍被覆空間	18
5	被覆空間の分類	19
5.1	展覧空間	19

5.2	被覆空間と基本亜群が作用する集合との対応	20
5.3	被覆空間と基本群が作用する集合との対応	22
5.4	基本群の部分群による弧状連結な被覆空間の分類	23

記号と用語

- 自然数, 実数全体の集合を, それぞれ \mathbb{N} , \mathbb{R} と書く. 0 は自然数に含める. また, $\mathbb{I} = [0, 1]$ と書く.
- 集合 X に群 G の左作用 (これを単に作用という) が定まっているとき, X を左 G -集合あるいは単に G -集合という. 右作用の場合は, 右 G -集合という. 特に断らなくても, 群の左作用を $(g, x) \mapsto g \cdot x$ と書き, 右作用を $(g, x) \mapsto x \cdot g$ と書く.
- 集合 X とその元 x_0 との組 (X, x_0) を, 点付き集合という. 位相空間に対する点付き空間, G -集合 (G は群) に対する点付き G -集合も同様に定める. $(X, x_0), (Y, y_0)$ を点付き集合とすると, 写像 $f: X \rightarrow Y$ であって $f(x_0) = y_0$ を満たすものを, (X, x_0) から (Y, y_0) への点付き写像という. このとき, $f: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ と書く. X, Y が付加構造をもつとき, f が種々の性質をもつのにしたがって, 点付き連続写像, 点付き同相写像, 点付き G -同変写像などという. また, (2つの点付き空間が) 点付き同相である, (2つの点付き G -集合が) 点付き G -同型である, などともいう.
- 集合 X, Y に対して, $X \times Y$ から X, Y への標準射影をそれぞれ pr_X, pr_Y と書く.
- 集合の圏を **Set**, 位相空間の圏を **Top**, 点付き空間の圏を **Top***, G -集合 (G は群) の圏を $G\text{-Set}$ と書く.

1 被覆空間

1.1 位相空間上の空間

定義 1.1 (位相空間上の空間) B を位相空間とする. 位相空間 E と連続写像 $p: E \rightarrow B$ との組 (E, p) を, B 上の空間 (space over B) という. B 上の空間 (E, p) に対して, B をその底空間 (base space), E をその全空間 (total space), p をその射影 (projection) という. また, 点 $b \in B$ に対して $p^{-1}(\{b\})$ を (E, p) の b 上のファイバー (fiber) といい, E_b と書く.

射影を明示する必要がある場合には, B 上の空間 (E, p) を単に E とも書く.

$(E, p), (E', p')$ を位相空間 B 上の空間とすると, 写像 $f: E \rightarrow E'$ であって $p = p' \circ f$ を満たすものを, (E, p) から (E', p') への B 上の写像という. B 上の写像が種々の性質をもつのに従って, B 上の連続写像, B 上の同相写像などといういい方をする. (E, p) から (E', p') への B 上の同相写像が存在するとき, (E, p) と (E', p') は B 上同相であるという. 点 $b \in B$ に対して, B 上の写像 $f: E \rightarrow E'$ を制限して得られるファイバー E_b から E'_b への写像を, f_b と書く.

位相空間 B 上の空間を対象とし, B 上の連続写像を射とする圏を, **Top_B** と書く.

定義 1.2 (底空間の制限) B を位相空間, (E, p) を B 上の空間とする. B の部分空間 B' に対して, $E|_{B'} = p^{-1}(B')$ と書き, p を制限して得られる $E|_{B'}$ から B' への写像を $p_{B'}$ と書く. B' 上の空間 $(E|_{B'}, p_{B'})$ を, (E, p) の底空間の B' への制限 (restriction) という.

以下、特に断らない限り、 B 上の空間 (E, p) と B の部分空間 B' に対して、 $E|_{B'}$ は $p_{B'}$ を射影として B' 上の空間とみなす。

定義 1.3 (自明な B 上の空間) B, F を位相空間とする。 B 上の空間 $(B \times F, \text{pr}_B)$ を、 F をファイバーとする B 上の自明な空間 (trivial space over B) という。

定義 1.4 (自明化可能な B 上の空間) B を位相空間とする。 B 上の空間 (E, p) は、ある自明な B 上の空間と B 上同相であるとき、自明化可能 (trivializable) であるという。このとき、 B 上の同相写像 $\phi: E \rightarrow B \times F$ (F は位相空間) を (E, p) の自明化写像 (trivialization map) という。

1.2 ファイバー束と被覆空間

定義 1.5 (自明化開集合, 自明化開被覆) B を位相空間、 (E, p) を B 上の空間とする。

- (1) B の開集合 U であって、 $(E|_U, p_U)$ が U 上の自明な空間であるものを、 (E, p) に対する B の自明化開集合 (trivializing open set) という。 (E, p) に対する自明化開集合であって点 $b \in B$ を含むものを、 (E, p) に対する b の自明化開近傍 (trivializing open neighbourhood) という。
- (2) (E, p) に対する B の自明化開集合のみからなる B の開被覆を、 (E, p) に対する B の自明化開被覆 (trivializing open cover) という。

定義 1.6 (ファイバー束) 位相空間 B 上の空間 (E, p) の空間であって、これに対する B の自明化開被覆が存在するものを、 B 上のファイバー束 (fiber bundle) という。

定義 1.7 (被覆空間) 位相空間 B 上のファイバー束 (E, p) であって、各ファイバー E_b ($b \in B$) が離散であるものを、 B 上の被覆空間 (covering space) という。

位相空間 B 上の被覆空間の全体がなす \mathbf{Top}_B の充満部分圏を、 \mathbf{Cov}_B と書く。

命題 1.8 B を位相空間、 (E, p) を B 上のファイバー束とする。任意の位相空間 F に対して、ファイバー E_b が F に同相であるような点 $b \in B$ 全体の集合は、 B において開かつ閉である。

証明 ファイバー E_b が位相空間 F に同相であるような点 $b \in B$ 全体の集合を X と置く。 $b \in B$ とし、 (E, p) に対する b の自明化開近傍 U をとると、 U の点上のファイバーはすべて E_b に同相である。したがって、 $b \in X$ ならば $U \subseteq X$ であり、 $b \notin X$ ならば $U \cap X = \emptyset$ である。よって、 X と $B \setminus X$ はともに B において開である。 \square

系 1.9 連結空間 B 上のファイバー束 (E, p) について、そのすべてのファイバーは同相である。

証明 B は空でないから、1 点 $b_0 \in B$ を固定できる。ファイバー E_b が E_{b_0} に同相であるような点 $b \in B$ 全体の集合を B' と置くと、 $b_0 \in B'$ より B' は空でなく、命題 1.8 より B' は B において開かつ閉である。よって、 B の連結性より $B' = B$ である。 \square

命題 1.10 B を位相空間、 $(E, p), (E', p')$ を B 上の被覆空間とする。 B 上の連続写像 $f: E \rightarrow E'$ は、開写像である。

証明 $(E, p), (E', p')$ の両方に対する B の自明化開被覆 $\{U_i\}_{i \in I}$ をとる. 各 $i \in I$ に対して f の制限 $f_{U_i}: E|_{U_i} \rightarrow E'|_{U_i}$ は U_i 上の連続写像であり, またすべての $i \in I$ に対して f_{U_i} が開写像ならば f も開写像である. したがって, $(E, p), (E', p')$ が自明な被覆空間である場合に主張を示せばよい.

$(E, p) = (B \times F, \text{pr}_B), (E', p') = (B \times F', \text{pr}_B)$ (F, F' は離散空間) とする. 点 $(b, x) \in B \times F$ を任意にとり, $f(b, x) = (b, x')$ ($x' \in F$) と置く. (b, x) の任意の近傍 U に対して $f(U)$ が (b, x') の近傍であることを示したい. $U = V \times \{x\}$ (V は b の近傍) という形であるとしてよい. さらに, f は連続であり F' は離散だから, $V \times \{x\}$ 上で f の F' -成分は一定であるとしてよい. このとき $f(V \times \{x\}) = V \times \{x'\}$ であり, これは (b, x') の近傍である. これで, 主張が示された. \square

1.3 点付き空間の場合

定義 1.11 (点付き空間上の点付き空間) (B, b_0) を点付き空間とする. 点付き空間 (E, x_0) と点付き連続写像 $p: (E, x_0) \rightarrow (B, b_0)$ との組 $((E, x_0), p)$ を, (B, b_0) 上の点付き空間 (pointed space over (B, b_0)) という.

射影を明示する必要がない場合には, (B, b_0) 上の点付き空間 $((E, x_0), p)$ を単に (E, x_0) とも書く.

点付き空間 (B, b_0) 上の点付き空間を対象とし, B 上の点付き連続写像を射とする圏を, $\mathbf{Top}_{(B, b_0)}^*$ と書く.

定義 1.12 (点付きファイバー束) (B, b_0) を点付き空間とする. (B, b_0) 上の点付き空間 $((E, x_0), p)$ であって, (E, p) が B 上のファイバー束であるものを, (B, b_0) 上の点付きファイバー束 (pointed fiber bundle) という.

定義 1.13 (点付き被覆空間) (B, b_0) を点付き空間とする. (B, b_0) 上の点付き空間 $((E, x_0), p)$ であって, (E, p) が B 上の被覆空間であるものを, (B, b_0) 上の点付き被覆空間 (pointed covering space) という.

点付き空間 (B, b_0) 上の点付き被覆空間の全体がなす $\mathbf{Top}_{(B, b_0)}^*$ の充満部分圏を, $\mathbf{Cov}_{(B, b_0)}^*$ と書く.

2 亜群

2.1 亜群

定義 2.1 (亜群) すべての射が同型射であるような小圏を, 亜群 (groupoid) という.

\mathcal{G} を亜群とすると, 対象 $b \in \text{Ob}(\mathcal{G})$ の恒等射を e_b と書く.

亜群を対象とし, 亜群の間の関手を射とする圏を, \mathbf{Grpoid} と書く.

定義 2.2 (連結亜群) \mathcal{G} を亜群とする. $\text{Ob}(\mathcal{G})$ が空でなく, 任意の $b, b' \in \text{Ob}(\mathcal{G})$ に対して b から b' への射が存在するとき, \mathcal{G} は連結 (connected) であるという.

2.2 亜群の作用

定義 2.3 (亜群の作用) \mathcal{G} を亜群とする. E を集合, $p: E \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{G})$ を写像とし, $b \in \text{Ob}(\mathcal{G})$ に対して $E_b = p^{-1}(\{b\})$ と書き,

$$D = \{(\alpha, x) \in \text{Arr}(\mathcal{G}) \times E \mid \text{Dom } \alpha = p(x)\}$$

と置く．次の3条件を満たす写像 $\theta: D \rightarrow E$ を、亜群 \mathcal{G} の (E, p) (あるいは単に E) への作用 (action) という．

- (i) 任意の $(\alpha, x) \in D$ に対して, $\text{Cod } \alpha = p(\alpha \cdot x)$ である．
- (ii) 任意の対象 $b \in \text{Ob}(\mathcal{G})$ と $x \in E_b$ に対して, $\epsilon_b \cdot x = x$ である．
- (iii) \mathcal{G} の任意の射 $\alpha: b \rightarrow b', \beta: b' \rightarrow b''$ と $x \in E_b$ に対して, $\beta\alpha \cdot x = \beta \cdot (\alpha \cdot x)$ である．

\mathcal{G} の (E, p) への作用を1つ固定するとき, (E, p) (あるいは単に E) を \mathcal{G} -集合 (\mathcal{G} -set) という． (E, p) を \mathcal{G} -集合とすると, $b \in \text{Ob}(\mathcal{G})$ に対して $p^{-1}(\{b\})$ を (E, p) を b 上のファイバー (fiber) といい, E_b と書く．また, しばしば作用を表す記号 θ を明示せず, $\theta(\alpha, x)$ の代わりに $\alpha \cdot x$ と書く．

定義 2.3 の状況で, 写像 $\theta: D \rightarrow E$ が亜群 \mathcal{G} の (E, p) への作用であるとは, θ が条件 (i) を満たし, 対象の対応 $b \mapsto E_b$ と射の対応 $\alpha \mapsto \theta(\alpha, -)$ が \mathcal{G} から **Set** への関手をなすということに他ならない．

定義 2.4 (亜群の作用に関する同変写像) \mathcal{G} を亜群, $(E, p), (E', p')$ を \mathcal{G} -集合とする．写像 $f: E \rightarrow E'$ は, 次の2条件を満たすとき, \mathcal{G} -同変 (\mathcal{G} -equivariant) であるという．

- (i) $p = p' \circ f$ である．
- (ii) \mathcal{G} の任意の射 $\alpha: b \rightarrow b'$ と $x \in E$ に対して, $f(\alpha \cdot x) = \alpha \cdot f(x)$ である．

f が全単射で f, f' がともに \mathcal{G} -同変であるとき, f は \mathcal{G} -同型 (\mathcal{G} -isomorphism) であるという．

定義 2.4 の状況で, 写像 $f: E \rightarrow E'$ が \mathcal{G} -同変であるとは, f が条件 (i) を満たし, f のファイバーへの制限の族 $\{f_b: E_b \rightarrow E'_b\}_{b \in \text{Ob}(\mathcal{G})}$ が \mathcal{G} -集合 (E, p) と (E', p') のそれぞれに対応する関手の間の自然変換であるということに他ならない．

\mathcal{G} -集合を対象とし, \mathcal{G} -同変写像を射とする圏を, $\mathcal{G}\text{-Set}$ と書く．

2.3 亜群が作用する集合と群が作用する集合との対応

\mathcal{G} を亜群, $b_0 \in \text{Ob}(\mathcal{G})$ とし, $G = \text{Aut}_{\mathcal{G}}(b_0)$ と置く．

(E, p) が \mathcal{G} -集合ならば, E_{b_0} は \mathcal{G} の作用の制限によって G -集合をなす． (E', p') も \mathcal{G} -集合で $f: E \rightarrow E'$ が \mathcal{G} -同変写像ならば, f のファイバーへの制限 $f_{b_0}: E_{b_0} \rightarrow E'_{b_0}$ は G -同変写像である．容易に確かめられるように, この対応は恒等射と合成を保ち, 関手

$$\mathbf{F}_{b_0}: \mathcal{G}\text{-Set} \rightarrow G\text{-Set}$$

をなす．

次に, 逆方向の関手を構成する． G -集合 X に対して, \mathcal{G} -集合 $(P \times^G X, p_X)$ を次のように定める．

- b_0 を始対象とする \mathcal{G} の射全体の集合を P と置き, 写像 $p: P \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{G})$ を $p(\beta) = \text{Cod } \beta$ と定める． $\Pi(B)$ の (P, p) への作用が

$$\alpha \cdot \beta = \alpha\beta \quad (\alpha \in \Pi(B), \beta \in P, \text{Dom } \alpha = \text{Cod } \beta = p(\beta))$$

によって定まる (すなわち, (P, p) は関手 $\text{Hom}_{\mathcal{G}}(b_0, -): \mathcal{G} \rightarrow \mathbf{Set}$ に対応する \mathcal{G} -集合である)．さらに, G の P への右作用が

$$\beta \cdot \gamma = \beta\gamma \quad (\beta \in P, \gamma \in G)$$

によって定まる.

- G の $P \times X$ への右作用 $(\beta, x) \cdot \gamma = (\beta \cdot \gamma, \gamma^{-1} \cdot x)$ の軌道空間を $P \times^G X = (P \times X)/G$ とし, $P \times X$ から $\text{Ob}(\mathcal{G})$ への写像 $(\beta, x) \mapsto p(\beta) = \text{Cod } \beta$ が誘導する写像として $p_X: P \times^G X \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{G})$ を定める.
- $\Pi(B)$ の (P, p) への作用が誘導する $\Pi(B)$ の $(P \times^G X, p_X)$ への作用を考える. すなわち,

$$\alpha \cdot [(\beta, x)] = [(\alpha\beta, x)] \quad (\alpha \in \Pi(B), \beta \in P, x \in X, \text{Dom } \alpha = \text{Cod } \beta = p_X([(\beta, x)]))$$

と定める.

G -集合の間の G -同変写像 $f: X \rightarrow Y$ に対して, \mathcal{G} -同変写像 $\text{id}_P \times^G f: P \times^G X \rightarrow P \times^G Y$ を

$$(\text{id}_P \times^G f)([(\beta, x)]) = [(\beta, f(x))] \quad (\beta \in P, x \in X)$$

と定める (これは確かに $(P \times^G X, p_X)$ から $(P \times^G Y, p_Y)$ への \mathcal{G} -同変写像である). 容易に確かめられるように, この対応は恒等射と合成を保ち, 関手

$$\mathbf{E}_{b_0}: G\text{-Set} \rightarrow \mathcal{G}\text{-Set}$$

をなす.

定理 2.5 (亜群が作用する集合と群が作用する集合との対応) \mathcal{G} を亜群, $b_0 \in \text{Ob}(\mathcal{G})$ とし, $G = \text{Aut}_{\mathcal{G}}(b_0)$ と置く.

(1) G -集合 X に対して, 写像

$$\begin{aligned} \phi_X: (P \times^G X)_{b_0} &\rightarrow X, \quad [(\alpha, x)] \mapsto \alpha \cdot x, \\ \phi'_X: X &\rightarrow (P \times^G X)_{b_0}, \quad x \mapsto [(\text{id}_{b_0}, x)] \end{aligned}$$

は矛盾なく定まり, これらは互いに他の逆を与える G -同型である. さらに, G -集合 X, Y の間の G -同変写像 $f: X \rightarrow Y$ に対して, 図式

$$\begin{array}{ccc} (P \times^G X)_{b_0} & \xrightarrow{(\text{id}_P \times^G f)_{b_0}} & (P \times^G Y)_{b_0} \\ \phi_X \downarrow & & \downarrow \phi_Y \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

は可換である.

(2) \mathcal{G} が連結であるとして, 各 $b \in \text{Ob}(\mathcal{G})$ に対して \mathcal{G} の射 $\alpha_b: b_0 \rightarrow b$ を 1 つずつ固定する. このとき, \mathcal{G} -集合 (E, p) に対して, 写像

$$\begin{aligned} \psi_{(E,p)}: P \times^G E_{b_0} &\rightarrow E, \quad [(\alpha, x)] \mapsto \alpha \cdot x, \\ \psi'_{(E,p)}: E &\rightarrow P \times^G E_{b_0}, \quad x \mapsto [(\alpha_{p(x)}, \alpha_{p(x)}^{-1} \cdot x)] \end{aligned}$$

は矛盾なく定まり ($\psi'_{(E,p)}$ は $\{\alpha_b\}_{b \in B}$ のとり方によらない), これらは互いに他の逆を与える \mathcal{G} -同型である. さらに, \mathcal{G} -集合 $(E, p), (E', p')$ の間の \mathcal{G} -同変写像 $f: E \rightarrow E'$ に対して, 図式

$$\begin{array}{ccc} P \times^G E_{b_0} & \xrightarrow{\text{id}_P \times^G f_{b_0}} & P \times^G E'_{b_0} \\ \psi_{(E,p)} \downarrow & & \downarrow \psi_{(E',p')} \\ E & \xrightarrow{f} & E' \end{array}$$

は可換である。

証明 容易に確かめられる。 □

よって、 \mathcal{G} が連結垂群ならば、定理 2.5 (1), (2) の同型はそれぞれ自然同型 $\mathbf{F}_{b_0} \circ \mathbf{E}_{b_0} \cong \text{Id}_{G\text{-Set}}$, $\mathbf{E}_{b_0} \circ \mathbf{F}_{b_0} \cong \text{Id}_{\mathcal{G}\text{-Set}}$ を与え、 \mathbf{F}_{b_0} と \mathbf{E}_{b_0} は互いに他の準逆を与える圏同値関手であり、圏同値 $\mathcal{G}\text{-Set} \simeq G\text{-Set}$ が成立する。

3 基本垂群と基本群

3.1 ホモトピー

定義 3.1 (ホモトピー) X, Y を位相空間, $f, g: X \rightarrow Y$ を連続写像とする。連続写像 $\sigma: X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$ であって $\sigma(-, 0) = f$ かつ $\sigma(-, 1) = g$ を満たすものを, f から g へのホモトピー (homotopy) という。 f から g へのホモトピーが存在するとき, f と g はホモトピック (homotopic) であるといい, $f \simeq g$ と書く。

容易に確かめられるように, この関係 \simeq は, X から Y への連続写像全体のなす集合上の同値関係である。この同値関係に関する連続写像 f の同値類を, f のホモトピー類 (homotopy class) といい, $[f]$ と書く。

命題 3.2 X, Y, Z を位相空間, $f, f': X \rightarrow Y, g, g': Y \rightarrow Z$ を連続写像とする。 $f \simeq f'$ かつ $g \simeq g'$ ならば, $g \circ f \simeq g' \circ f'$ である。

証明 $\sigma: X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$ が f から f' へのホモトピーならば $g \circ \sigma$ は $g \circ f$ から $g \circ f'$ へのホモトピーだから, $f \simeq f'$ ならば $g \circ f \simeq g \circ f'$ である。また, $\tau: Y \times \mathbb{I} \rightarrow Z$ が g から g' へのホモトピーならば $\tau \circ (f' \times \text{id}_{\mathbb{I}})$ は $g \circ f'$ から $g' \circ f'$ へのホモトピーだから, $g \simeq g'$ ならば $g \circ f' \simeq g' \circ f'$ である。よって, $f \simeq f'$ かつ $g \simeq g'$ ならば $g \circ f \simeq g' \circ f'$ である。 □

定義 3.3 (ホモトピー同値) X, Y を位相空間とする。連続写像 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X$ が $g \circ f \simeq \text{id}_X$ かつ $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ を満たすとき, f と g は互いに他のホモトピー逆 (homotopy inverse) であるという。ホモトピー逆をもつ連続写像を, ホモトピー同値写像 (homotopy equivalence) という。 X から Y へのホモトピー同値写像が存在するとき, X と Y はホモトピー同値 (homotopy equivalent) であるという。

命題 3.2 より, 位相空間を対象とし, 連続写像のホモトピー同値類を射とする圏 $\mathbf{Ho}(\mathbf{Top})$ が自然に定まる。連続写像 f がホモトピー同値写像であるとは, $[f]$ が $\mathbf{Ho}(\mathbf{Top})$ の同型射であるということに他ならない。

3.2 道と道ホモトピー

定義 3.4 (道) X を位相空間, $x, y \in X$ とする。連続写像 $l: \mathbb{I} \rightarrow X$ であって $l(0) = x$ かつ $l(1) = y$ を満たすものを, X 上の x から y への道 (path) といい, その全体を $\Omega(X; x, y)$ と書く。このとき, x を l の始点 (initial point), y を l の終点 (terminal point) という。始点と終点と同じ点 x であるような道を, x を基点 (base point) とする閉道 (closed path) という。

位相空間 X とその点 x に対して, 常に点 x を値にとる X 上の道を, e_x と書く。

定義 3.5 (道ホモトピー) X を位相空間, $l, m \in \Omega(X; x, y)$ ($x, y \in X$) とする。連続写像 $\sigma: \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$ であって, 任意の $s \in \mathbb{I}$ に対して $\sigma(-, s) \in \Omega(X; x, y)$ であり, $\sigma(-, 0) = l$ かつ $\sigma(-, 1) = m$ を満たすものを,

l から m への (X 上の) 道ホモトピー (path homotopy) という. l から m への道ホモトピーが存在するとき, l と m は (X 上) 道ホモトピック (path homotopic) であるといい, $l \simeq m$ と書く.

容易に確かめられるように, この関係 \simeq は, $\Omega(X; x, y)$ 上の同値関係である. この同値関係に関する道 l の同値類を, l の道ホモトピー類 (path homotopy class) といい, $[l]$ と書く.

位相空間 X とその点 x に対して, 常に点 x を値にとる X 上の道 e_x の道ホモトピー類を, ϵ_x と書く.

注意 3.6 一般に, 始点と終点を共有する位相空間 X 上の道 l と m について, それらが \mathbb{I} から X への連続写像としてホモトピックであることと, 道ホモトピックであることは同値ではない. これら 2 つの関係をともに記号 \simeq で表し, これらの関係に関する同値類とともに記号 $[-]$ で表すが, 道に対しては常に「道ホモトピック」の意味でこれらの記号を用いる.

命題 3.7 X, Y を位相空間, $f: X \rightarrow Y$ を連続写像とする. 始点と終点を共有する X 上の道 l, l' について, $l \simeq l'$ ならば $f \circ l \simeq f \circ l'$ である.

証明 $\sigma: \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$ が l から l' への道ホモトピーならば, $f \circ \sigma$ は $f \circ l$ から $f \circ l'$ への道ホモトピーである. よって, $l \simeq l'$ ならば $f \circ l \simeq f \circ l'$ である. \square

次小節以降で必要になるので, 次の命題を示しておく.

命題 3.8 X を Euclid 空間 \mathbb{R}^n ($n \in \mathbb{N}$) の凸集合とする. 始点と終点を共有する X 上の 2 つの道は, 道ホモトピックである.

証明 始点と終点を共有する X 上の道 l, m に対して, $\mathbb{I} \times \mathbb{I}$ から X への連続写像 $(t, s) \mapsto (1-s)l(t) + sm(t)$ は l から m への道ホモトピーだから, $l \simeq m$ である. \square

3.3 道の連結, 逆

定義 3.9 (道の連結, 逆) X を位相空間, $x, y, z \in X$ とし, $l \in \Omega(X; x, y)$, $m \in \Omega(X; y, z)$ とする.

(1) l と m の連結 (connection) $m * l \in \Omega(X; x, z)$ を,

$$(m * l)(t) = \begin{cases} l(2t) & (0 \leq t \leq 1/2) \\ m(2t - 1) & (1/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

と定める.

(2) l の逆 (inverse) $l^- \in \Omega(X; y, x)$ を,

$$l^-(t) = l(1 - t) \quad (t \in \mathbb{I})$$

と定める.

明らかに, $(l^-)^- = l$ かつ $(m * l)^- = m^- * l^-$ である.

命題 3.10 位相空間 X 上の道 $l, l' \in \Omega(X; x, y)$ と $m, m' \in \Omega(X; y, z)$ ($x, y, z \in X$) に対して, 次が成り立つ.

(1) $l \simeq l'$ かつ $m \simeq m'$ ならば $m * l \simeq m' * l'$ である.

(2) $l \simeq l'$ ならば $l^- \simeq (l')^-$ である.

証明 (1) $\sigma: \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$ が l から l' への道ホモトピーであり $\tau: \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$ が m から m' への道ホモトピーならば, $\mathbb{I} \times \mathbb{I}$ から X への写像

$$(t, s) \mapsto \begin{cases} \sigma(2t, s) & (0 \leq t \leq 1/2) \\ \tau(2t-1, s) & (1/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

は $m * l$ から $m' * l'$ への道ホモトピーである. よって, $l \simeq l'$ かつ $m \simeq m'$ ならば $m * l \simeq m' * l'$ である.

(2) $\sigma: \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$ が l から l' への道ホモトピーならば, $\mathbb{I} \times \mathbb{I}$ から X への写像

$$(t, s) \mapsto \sigma(1-t, s)$$

は l^- から $(l')^-$ への道ホモトピーである. よって, $l \simeq l'$ ならば $l^- \simeq (l')^-$ である. \square

命題 3.11 位相空間 X 上の道 $l \in \Omega(X; x, y)$, $m \in \Omega(X; y, z)$, $n \in \Omega(X; z, w)$ ($x, y, z, w \in X$) に対して, 次が成り立つ.

$$(1) n * (m * l) \simeq (n * m) * l.$$

$$(2) l * e_x \simeq e_y * l \simeq l.$$

$$(3) l^- * l \simeq e_x, l * l^- \simeq e_y.$$

証明 (1) \mathbb{I} 上の 0 から 1 への道 ϕ, ψ を

$$\phi(t) = t, \quad \psi(t) = \begin{cases} t/2 & (0 \leq t \leq 1/2) \\ t-1/4 & (1/2 \leq t \leq 3/4) \\ 2t-1 & (3/4 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

と定めると, 命題 3.8 より ϕ と ψ は道ホモトピックだから, 命題 3.7 より $n * (m * l) = (n * (m * l)) \circ \phi$ と $(n * m) * l = (n * (m * l)) \circ \psi$ は道ホモトピックである.

(2) \mathbb{I} 上の 0 から 1 への道 ϕ, ψ, χ を

$$\phi(t) = t, \quad \psi(t) = \begin{cases} 0 & (0 \leq t \leq 1/2) \\ 2t-1 & (1/2 \leq t \leq 1), \end{cases} \quad \chi(t) = \begin{cases} 2t & (0 \leq t \leq 1/2) \\ 1 & (1/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

と定めると, 命題 3.8 より ϕ, ψ, χ はすべて道ホモトピックだから, 命題 3.7 より $l = l \circ \phi$, $l * e_x = l \circ \psi$, $e_y * l = l \circ \chi$ はすべて道ホモトピックである.

(3) \mathbb{I} 上の 0 を基点とする閉道 ϕ, ψ を

$$\phi(t) = 0, \quad \psi(t) = \begin{cases} 2t & (0 \leq t \leq 1/2) \\ 1-2t & (1/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

と定めると, 命題 3.8 より ϕ と ψ は道ホモトピックだから, 命題 3.7 より $e_x = l \circ \phi$ と $l^- * l = l \circ \psi$ は道ホモトピックである. また, いま示した $e_x \simeq l^- * l$ において x, y, l をそれぞれ y, x, l^- で置き換えれば, $e_y \simeq l * l^-$ を得る. \square

命題 3.12 X, Y を位相空間, $f: X \rightarrow Y$ を連続写像とする. 道 $l \in \Omega(X; x, y)$ と $m \in \Omega(X; y, z)$ ($x, y, z \in X$) に対して, 次が成り立つ.

- (1) $f \circ e_x = e_{f(x)}.$
- (2) $f \circ (m * l) = (f \circ m) * (f \circ l).$
- (3) $f \circ l^- = (f \circ l)^-.$

証明 明らかである. □

3.4 基本亜群と基本群

X を位相空間とする. 点 $x, y \in X$ に対して, x から y への道全体の集合 $\Omega(X; x, y)$ を「道ホモトピックである」という同値関係 \simeq で割って得られる商集合 $\Omega(X; x, y)/\simeq$ を考える. 命題 3.10 より, 道ホモトピー類 $\alpha = [l] \in \Omega(X; x, y)/\simeq$ と $\beta = [m] \in \Omega(X; y, z)/\simeq$ ($x, y, z \in X$) に対して

$$\beta\alpha = [m * l] \in \Omega(X; x, z)/\simeq$$

および

$$\alpha^{-1} = [l^-] \in \Omega(X; y, x)/\simeq$$

が代表元 l, m のとり方によらずに定まる. さらに, 命題 3.11 より, 道ホモトピー類 $\alpha \in \Omega(X; x, y)/\simeq$, $\beta \in \Omega(X; y, z)/\simeq$, $\gamma \in \Omega(X; z, w)/\simeq$ ($x, y, z, w \in X$) に対して

$$\gamma(\beta\alpha) = (\gamma\beta)\alpha, \quad \alpha\epsilon_x = \epsilon_y\alpha = \alpha, \quad \alpha^{-1}\alpha = \epsilon_x, \quad \alpha\alpha^{-1} = \epsilon_y$$

である. よって, X の点を対象とし, $\Omega(X; x, y)/\simeq$ の元を x から y への射とし, $x \in X$ に対して ϵ_x を x の恒等射とし, 上記の演算 $(\alpha, \beta) \mapsto \beta\alpha$ を射の合成とすることで, 亜群が定まる. 上記の演算 $\alpha \mapsto \alpha^{-1}$ は, この亜群における逆射を与える.

定義 3.13 (基本亜群) X を位相空間とする. 上記の亜群を, X の基本亜群といい, $\Pi(X)$ と書く. 点 $x, y \in X$ に対して, $\text{Hom}_{\Pi(X)}(x, y) = \Omega(X; x, y)/\simeq$ を $\Pi(X; x, y)$ と書く.

明らかに, 基本亜群 $\Pi(X)$ が連結であるための必要十分条件は, X が弧状連結であることである.

定義 3.14 (基本群) (X, x_0) を点付き空間とする. 基本亜群 $\Pi(X)$ における x_0 の自己同型群 $\text{Aut}_{\Pi(X)}(x_0)$ を, (X, x_0) の基本群といい, $\pi_1(X, x_0)$ と書く.

注意 3.15 X が弧状連結ならば, $\Pi(X)$ の対象はすべて同型であり, したがって $\pi_1(X, x_0)$ は基点 x_0 のとり方によらず群として同型である (ただし, 異なる基点に対する基本群の間に自然に群同型写像が定まるわけではない). そこで, X が弧状連結であり, 基本群 $\pi_1(X, x_0)$ の群としての同型類にのみ興味がある場合には, $\pi_1(X, x_0)$ を単に $\pi_1(X)$ と書く.

次に, X, Y を位相空間, $f: X \rightarrow Y$ を連続写像とする. 命題 3.7 より, 道ホモトピー類 $\alpha = [l] \in \Pi(X; x, y)$ ($x, y \in X$) に対して

$$\Pi(f)(\alpha) = [f \circ l] \in \Pi(Y; f(x), f(y))$$

が代表元 l のとり方によらずに定まる. さらに, 命題 3.12 より, 道ホモトピー類 $\alpha \in \Pi(X; x, y)$, $\beta \in \Pi(X; y, z)$, $\gamma \in \Pi(X; z, w)$ ($x, y, z, w \in X$) に対して

$$\Pi(f)(\epsilon_x) = \epsilon_{f(x)}, \quad \Pi(f)(\beta\alpha) = \Pi(f)(\beta)\Pi(f)(\alpha)$$

である．よって，対象の対応を $f: X \rightarrow Y$ とし，射の対応を上記の写像 $\Pi(f): \Pi(X; x, y) \rightarrow \Pi(Y; f(x), f(y))$ とすることで， $\Pi(X)$ から $\Pi(Y)$ への関手が定まる．

定義 3.16 (連続写像が誘導する基本亜群の間の関手) X, Y を位相空間， $f: X \rightarrow Y$ を連続写像とする．上記の $\Pi(X)$ から $\Pi(Y)$ への関手を， f が誘導する基本亜群の間の関手といい， $\Pi(f)$ あるいは単に f_* と書く．

定義 3.17 (連続写像が誘導する基本群の間の群準同型) $(X, x_0), (Y, y_0)$ を点付き空間， $f: (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ を点付き連続写像とする．群準同型 $\Pi(f): \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$ を， f が誘導する基本群の間の群準同型といい， $\pi_1(f, x_0)$ あるいは単に f_* と書く．

Π は位相空間の圏 **Top** から亜群の圏 **Grpoid** への関手となり，したがって π_1 は点付き空間の圏 **Top*** から群の圏 **Grp** への関手となる．

命題 3.18 X, Y を位相空間， $f, g: X \rightarrow Y$ を連続写像とする． $\sigma: X \times \mathbb{I} \rightarrow Y$ が f から g へのホモトピーならば，各点 $x \in X$ に対して $[\sigma_x] = [\sigma(x, -)] \in \Pi(Y; f(x), g(x))$ を与える族 $\{[\sigma_x]\}_{x \in X}$ は，関手 $\Pi(f)$ から $\Pi(g)$ への自然同型である．

証明 σ が f から g へのホモトピーであるとする．任意の道ホモトピー類 $\alpha = [l] \in \Pi(X; x, y)$ ($x, y \in X$) に対して

$$[\sigma_y]\Pi(f)(\alpha) = \Pi(g)(\alpha)[\sigma_x],$$

すなわち

$$\sigma_y * (f \circ l) \simeq (g \circ l) * \sigma_x$$

を示せばよい． $\mathbb{I} \times \mathbb{I}$ 上の道 $\phi_0, \phi_1, \psi_0, \psi_1$ を

$$\phi_0(t) = (t, 0), \quad \phi_1(t) = (t, 1), \quad \psi_0(t) = (0, t), \quad \psi_1(t) = (1, t) \quad (t \in \mathbb{I})$$

と定めると， $\psi_1 * \phi_0$ と $\phi_1 * \psi_0$ は $(0, 0)$ から $(1, 1)$ への道であり，これらは道ホモトピックである (命題 3.8)．よって，命題 3.12 と命題 3.7 より

$$\begin{aligned} \sigma_y * (f \circ l) &= (\sigma \circ (l \times \text{id}_{\mathbb{I}}) \circ \psi_1) * (\sigma \circ (l \times \text{id}_{\mathbb{I}}) \circ \phi_0) \\ &= \sigma \circ (l \times \text{id}_{\mathbb{I}}) \circ (\psi_1 * \phi_0) \\ &\simeq \sigma \circ (l \times \text{id}_{\mathbb{I}}) \circ (\phi_1 * \psi_0) \\ &= (\sigma \circ (l \times \text{id}_{\mathbb{I}}) \circ \phi_1) * (\sigma \circ (l \times \text{id}_{\mathbb{I}}) \circ \psi_0) \\ &= (g \circ l) * \sigma_x \end{aligned}$$

である． □

系 3.19 X, Y を位相空間， $f: X \rightarrow Y$ を連続写像とする． f がホモトピー同値写像ならば， $\Pi(f): \Pi(X) \rightarrow \Pi(Y)$ は圏同値関手であり，任意の $x_0 \in X$ に対して $\pi_1(f, x_0): \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$ は群同型である．

証明 f がホモトピー同値写像であるとして，そのホモトピー逆 $g: Y \rightarrow X$ をとる．命題 3.18 より， $\Pi(g) \circ \Pi(f)$ は恒等関手 $\text{Id}_{\Pi(X)}$ に自然同型であり， $\Pi(f) \circ \Pi(g)$ は恒等関手 $\text{Id}_{\Pi(Y)}$ に自然同型である．よって， $\Pi(f)$ は $\Pi(g)$ を準逆にもつ圏同値関手である．さらに，圏同値関手は忠実充満だから，任意の点 $x_0 \in X$ に対して $\pi_1(f, x_0): \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$ は全単射であり，したがって群同型である． □

3.5 単連結空間

定義 3.20 (単連結空間) 位相空間 X は、弧状連結であり、かつその基本群 $\pi_1(X)$ が自明であるとき、単連結 (simply connected) であるという。

4 基本群の被覆空間への作用

4.1 持ち上げ

定義 4.1 (持ち上げ)

- (1) B を位相空間, (E, p) を B 上の空間とし, A を位相空間, $f: A \rightarrow B$ を連続写像とする. 連続写像 $\tilde{f}: A \rightarrow E$ であって $p \circ \tilde{f} = f$ を満たすものを, f の (E, p) (あるいは単に E) への持ち上げ (lift) という.
- (2) (B, b_0) を点付き空間, $((E, x_0), p)$ を (B, b_0) 上の点付き空間とし, (A, a_0) を点付き空間, $f: (A, a_0) \rightarrow (B, b_0)$ を点付き連続写像とする. 点付き連続写像 $\tilde{f}: (A, a_0) \rightarrow (E, x_0)$ であって $p \circ \tilde{f} = f$ を満たすものを, f の $((E, x_0), p)$ (あるいは単に (E, x_0)) への点付き持ち上げ (pointed lift) という.

命題 4.2 B を位相空間, E を B 上の被覆空間とし, A を位相空間, $f: A \rightarrow B$ を連続写像とする. 連続写像 $\tilde{f}, \tilde{f}': A \rightarrow E$ がともに f の持ち上げならば, $A_0 = \{x \in A \mid \tilde{f}(x) = \tilde{f}'(x)\}$ は A において開かつ閉である.

証明 $\tilde{f}, \tilde{f}': A \rightarrow E$ がともに f の持ち上げであるとする. E に対する B の自明化開被覆 $\{U_i\}_{i \in I}$ をとると, $\{f^{-1}(U_i)\}_{i \in I}$ は A の開被覆だから, A_0 が A において開かつ閉であることを示すためには, 各 $i \in I$ に対して $A_0 \cap f^{-1}(U_i)$ が $f^{-1}(U_i)$ において開かつ閉であることを示せばよい. したがって, (E, p) が自明な被覆空間である場合に主張を示せばよい.

$(E, p) = (B \times F, \text{pr}_B)$ (F は離散空間) とする. このとき, 連続写像 $\phi, \phi': A \rightarrow F$ が存在して $\tilde{f} = \text{id}_B \times \phi$, $\tilde{f}' = \text{id}_B \times \phi'$ と書いて,

$$A_0 = \{x \in A \mid \phi(x) = \phi'(x)\}$$

となる. F は離散だから, A_0 は A において開かつ閉である. □

系 4.3 (持ち上げの一意性) (B, b_0) を点付き空間, (E, x_0) を (B, b_0) 上の点付き被覆空間とし, (A, a_0) を点付き連結空間とする. 点付き連続写像 $f: (A, a_0) \rightarrow (B, b_0)$ に対して, その (E, x_0) への点付き持ち上げはたかだか一意である.

証明 $\tilde{f}, \tilde{f}': (A, a_0) \rightarrow (E, x_0)$ がともに f の点付き持ち上げならば, 命題 4.2 より $A_0 = \{x \in A \mid \tilde{f}(x) = \tilde{f}'(x)\}$ は A において開かつ閉であり, また $a_0 \in A_0$ より A_0 は空でない. よって, A の連結性より $A_0 = A$, すなわち $\tilde{f} = \tilde{f}'$ である. □

4.2 被覆空間のホモトピー拡張性質

補題 4.4 B を位相空間, (E, p) を B 上の自明化可能な空間とし, A を位相空間とする. $F: A \times \mathbb{I} \rightarrow B$ と $\tilde{f}: A \rightarrow E$ を連続写像とし, \tilde{f} は $F(-, 0)$ の持ち上げであるとする. このとき, F の持ち上げ $\tilde{F}: A \times \mathbb{I} \rightarrow E$ であって, $\tilde{F}(-, 0) = \tilde{f}$ を満たすものが存在する.

証明 $(E, p) = (B \times F, \text{pr}_B)$ (F は位相空間) としてよい. 連続写像 $\tilde{F}: A \times \mathbb{I} \rightarrow B \times F$ を

$$\tilde{F}(a, t) = (F(a, t), \text{pr}_B(\tilde{f}(a))) \quad ((a, t) \in A \times \mathbb{I})$$

と定めれば, \tilde{F} は F の持ち上げであって $\tilde{F}(-, 0) = \tilde{f}$ を満たす. \square

定理 4.5 (被覆空間のホモトピー拡張性質) B を位相空間, (E, p) を B 上の被覆空間とし, A を位相空間とする. $F: A \times \mathbb{I} \rightarrow B$ と $\tilde{f}: A \rightarrow E$ を連続写像とし, \tilde{f} は $F(-, 0)$ の持ち上げであるとする. このとき, F の持ち上げ $\tilde{F}: A \times \mathbb{I} \rightarrow E$ であって $\tilde{F}(-, 0) = \tilde{f}$ を満たすものが一意に存在する.

証明 F の持ち上げ $\tilde{F}: A \times \mathbb{I} \rightarrow E$ が $\tilde{F}(-, 0) = \tilde{f}$ を満たすとする. 任意の点 $a \in A$ に対して, $\tilde{F}(a, -)$ は $F(a, -)$ の持ち上げであって $\tilde{F}(a, 0) = \tilde{f}(a)$ を満たす. よって, 持ち上げの一意性 (系 4.3) より, 条件を満たす \tilde{F} はたかだか一意である.

まず, 任意の点 $a \in A$ に対してその開近傍 U_a が存在して, $F|_{U_a \times \mathbb{I}}$ の持ち上げ $\tilde{F}_a: U_a \times \mathbb{I} \rightarrow E$ であって $\tilde{F}_a(-, 0) = \tilde{f}|_{U_a}$ を満たすものが存在することを示す. Lebesgue の被覆補題より, 正の整数 n と (E, p) に対する B の自明化開集合 $V_{a,0}, \dots, V_{a,n-1}$ が存在して, 各 i に対して $F(\{a\} \times [i/n, (i+1)/n]) \subseteq V_{a,i}$ となる. さらに, Tube Lemma より, a の開近傍 U_a が存在して, 各 i に対して $F(U_a \times [i/n, (i+1)/n]) \subseteq V_{a,i}$ となる. 以下, $0 \leq i < n$ に関して再帰的に, $F|_{U_a \times [i/n, (i+1)/n]}$ の持ち上げ $\tilde{F}_{a,i}: U_a \times [i/n, (i+1)/n] \rightarrow E$ であって

$$\tilde{F}_{a,0}(-, 0) = \tilde{f}, \quad \tilde{F}_{a,i}\left(-, \frac{i}{n}\right) = \tilde{F}_{a,i-1}\left(-, \frac{i}{n}\right) \quad (1 \leq i < n) \quad (*)$$

を満たすものを構成する. $0 \leq i < n$ とし, $\tilde{F}_{a,i-1}$ までは構成できたとする. すると, $\tilde{F}_{a,i-1}(-, i/n): U_a \rightarrow E$ ($i = 0$ の場合は \tilde{f} . 以下同様) は $F(-, i/n): U_a \rightarrow B$ の持ち上げであり, $F(U_a \times [i/n, (i+1)/n])$ は (E, p) に対する自明化開集合 $V_{a,i}$ に含まれる. したがって, 補題 4.4 より, $F|_{U_a \times [i/n, (i+1)/n]}$ の持ち上げ $\tilde{F}_{a,i}: U_a \times [i/n, (i+1)/n] \rightarrow E$ であって $\tilde{F}_{a,i}(-, i/n) = \tilde{F}_{a,i-1}(-, i/n)$ を満たすものが存在する. これで, 再帰が完成した. (*) より, $\tilde{F}_{a,0}, \dots, \tilde{F}_{a,n-1}$ は貼り合って連続写像 $\tilde{F}_a: U_a \times \mathbb{I} \rightarrow E$ を定め, これは条件を満たす.

次に, F の持ち上げ $\tilde{F}: A \times \mathbb{I} \rightarrow E$ であって $\tilde{F}(-, 0) = \tilde{f}$ を満たすものが存在することを示す. 2 点 $a, a' \in A$ を任意にとる. 前段で存在を示した \tilde{F}_a と $\tilde{F}_{a'}$ について, これらの $(U_a \cap U_{a'}) \times \mathbb{I}$ への制限は, ともに $F|_{(U_a \cap U_{a'}) \times \mathbb{I}}$ の持ち上げであって $(U_a \cap U_{a'}) \times \{0\}$ 上では \tilde{f} に等しい. したがって, すでに示した一意性より, \tilde{F}_a と $\tilde{F}_{a'}$ は定義域の交叉 $(U_a \cap U_{a'}) \times \mathbb{I}$ 上で一致する. よって, $\{\tilde{F}_a\}_{a \in A}$ は貼り合って連続写像 $\tilde{F}: A \times \mathbb{I} \rightarrow E$ を定め, これは条件を満たす. これで, 主張が示された. \square

注意 4.6 B を位相空間, (E, p) を B 上の被覆空間とする. 定理 4.5 は, 次のように書き直せる.

位相空間 A と連続写像 $F: A \times \mathbb{I} \rightarrow B$ と $\tilde{f}: A \rightarrow E$ について、図式

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\tilde{f}} & E \\ \iota_0 \downarrow & & \downarrow p \\ A \times \mathbb{I} & \xrightarrow{F} & B \end{array}$$

が可換ならば（ただし、写像 $\iota_0: A \rightarrow A \times \mathbb{I}$ を $\iota_0(x) = (x, 0)$ で定める）、連続写像 $\tilde{F}: A \times \mathbb{I} \rightarrow E$ であって図式

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\tilde{f}} & E \\ \iota_0 \downarrow & \nearrow \tilde{F} & \downarrow p \\ A \times \mathbb{I} & \xrightarrow{F} & B \end{array}$$

を可換にするものが一意に存在する。

よって、空間対 (X, X') がある位相空間 A に対する空間対 $(A \times \mathbb{I}, A \times \{0\})$ と同相ならば^{*1}、上記の主張において「 $\iota_0: A \rightarrow A \times \mathbb{I}$ 」を「包含写像 $X' \rightarrow X$ 」で置き換えたものも成立する。

4.3 基本垂群の被覆空間への作用

補題 4.7 $J = (\mathbb{I} \times \{0\}) \cup (\{0, 1\} \times \mathbb{I})$ と置く。空間対 $(\mathbb{I} \times \mathbb{I}, J)$ は、空間対 $(\mathbb{I} \times \mathbb{I}, \mathbb{I} \times \{0\})$ に同相である。□

定理 4.8 B を位相空間、 (E, p) を B 上の被覆空間とする。

- (1) 点 $b, b' \in B$, $x \in E_b$ と $\alpha \in \Pi(B; b, b')$ に対して、 $x' \in E_{b'}$ と $\tilde{\alpha} \in \Pi(E; x, x')$ の組であって $p_*(\tilde{\alpha}) = \alpha$ を満たすものが一意に存在する。
- (2) 点 $b, b' \in B$, $x \in E_b$ と $\alpha \in \Pi(B; b, b')$ に対して、 $\alpha \cdot x$ を (1) で定まる点 $x' \in E_{b'}$ と定義する。この写像 $(\alpha, x) \mapsto \alpha \cdot x$ は、基本垂群 $\Pi(B)$ の (E, p) への作用である。

証明 (1) $\alpha = [l]$ とすると、 x を始点とする l の持ち上げ \tilde{l} が存在する（定理 4.5）。 $x' = \tilde{l}(1) \in E_{b'}$, $\tilde{\alpha} = [\tilde{l}] \in \Pi(E; x, x')$ と置けば、 $p_*(\tilde{\alpha}) = \alpha$ である。

条件を満たす組の一意性を示す。そのためには、 $l, l' \in \Omega(B; b, b')$ が道ホモトピックであり、 \tilde{l}, \tilde{l}' をそれぞれ x を始点とする l, l' の持ち上げとして、 \tilde{l} と \tilde{l}' の終点が一致し \tilde{l} と \tilde{l}' が道ホモトピックであることをいえばよい。 l から l' への道ホモトピー $\sigma: \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow X$ をとる。 $J = (\mathbb{I} \times \{0\}) \cup (\{0, 1\} \times \mathbb{I})$ と置き、連続写像 $\tilde{\sigma}_0: J \rightarrow E$ を

$$\tilde{\sigma}_0(-, 0) = \tilde{l}, \quad \tilde{\sigma}_0(-, 1) = \tilde{l}', \quad \tilde{\sigma}_0(0, -) = e_x$$

によって定めると、図式

$$\begin{array}{ccc} J & \xrightarrow{\tilde{\sigma}_0} & E \\ \downarrow & & \downarrow p \\ \mathbb{I} \times \mathbb{I} & \xrightarrow{\sigma} & B \end{array}$$

^{*1} 位相空間 X とその部分空間 X' の組 (X, X') を、空間対 (pair of spaces) という。空間対 (X, X') と (Y, Y') が同相 (homeomorphic) であるとは、同相写像 $f: X \rightarrow Y$ であって $f(X') = Y'$ であるものが存在することをいう。

($J \rightarrow \mathbb{I} \times \mathbb{I}$ は包含写像) は可換である. よって, 被覆空間のホモトピー拡張性質 (定理 4.5) と注意 4.6 および補題 4.7 より, 連続写像 $\tilde{\sigma}: \mathbb{I} \times \mathbb{I} \rightarrow E$ であって図式

$$\begin{array}{ccc} J & \xrightarrow{\tilde{\sigma}_0} & E \\ \downarrow & \nearrow \tilde{\sigma} & \downarrow p \\ \mathbb{I} \times \mathbb{I} & \xrightarrow{\sigma} & B \end{array}$$

を可換にするものが存在する. この $\tilde{\sigma}$ は $\tilde{\sigma}_0$ の拡張だから,

$$\tilde{\sigma}(-, 0) = \tilde{l}, \quad \tilde{\sigma}(-, 1) = \tilde{l}', \quad \tilde{\sigma}(0, -) = e_x$$

である. また, $p \circ \tilde{\sigma} = \sigma$ と $\sigma(1, -) = e_{b'}$ より $\tilde{\sigma}(1, -)$ は \mathbb{I} から $E_{b'}$ への連続写像だが, $E_{b'}$ は離散だから, その値は一定である. よって, $\tilde{l}(1) = \tilde{l}'(1)$ であり, $\tilde{\sigma}$ は \tilde{l} から \tilde{l}' への道ホモトピーである.

(2) まず, $b \in B$, $x \in E_b$ とすると, $\epsilon_x \in \Pi(E; x, x)$ は $p_*(\epsilon_x) = \epsilon_b$ を満たすから, $\epsilon_b \cdot x = x$ である. 次に, $b, b', b'' \in B$, $\alpha \in \Pi(B; b, b')$, $\beta \in \Pi(B; b', b'')$ とし, $x \in E_b$ とする. 点 $x' \in E_{b'}$ と $\tilde{\alpha} \in \Pi(E; x, x')$ を $p_*(\tilde{\alpha}) = \alpha$ となるようにとり, 点 $x'' \in E_{b''}$ と $\tilde{\beta} \in \Pi(E; x', x'')$ を $p_*(\tilde{\beta}) = \beta$ となるようにとると, $\tilde{\beta}\tilde{\alpha} \in \Pi(E; x, x'')$ は $p_*(\tilde{\beta}\tilde{\alpha}) = p_*(\tilde{\beta})p_*(\tilde{\alpha}) = \beta\alpha$ を満たすから,

$$\beta\alpha \cdot x = x'' = \beta \cdot x' = \beta \cdot (\alpha \cdot x)$$

である. よって, 写像 $(\alpha, x) \mapsto \alpha \cdot x$ は基本垂群 $\Pi(B)$ の (E, p) への作用である. \square

定義 4.9 (位相が定める基本垂群の作用) B を位相空間, (E, p) を B 上の被覆空間とする. 命題 5.7 によって定まる基本垂群 $\Pi(B)$ の (E, p) への作用を, E の位相が定める基本垂群の作用という.

以下, 位相空間 B 上の被覆空間 (E, p) は, 常に E の位相が定める基本垂群の作用によって $\Pi(B)$ -集合とみなす. また, 各点 $b_0 \in B$ に対して, E_{b_0} を上記の基本垂群の作用から定まる群作用によって $\pi_1(B, b_0)$ -集合とみなす.

命題 4.10 B を位相空間, (E, p) を B 上の被覆空間とし, $b, b' \in B$, $x \in E_b$, $x' \in E_{b'}$ とする.

- (1) 写像 $p_*: \Pi(E; x, x') \rightarrow \Pi(B; b, b')$ は単射であり, その像は $\alpha \cdot x = x'$ を満たす $\alpha \in \Pi(B; b, b')$ の全体である.
- (2) ある $\alpha \in \Pi(B; b, b')$ が存在して $\alpha \cdot x = x'$ となるための必要十分条件は, x と x' が E の同じ弧状連結成分に属することである.

証明 (1) 基本垂群の被覆空間への作用の定義から明らかである.

(2) (1) より, ある $\alpha \in \Pi(B; b, b')$ が存在して $\alpha \cdot x = x'$ となることは $\Pi(E; x, x') \neq \emptyset$, すなわち x と x' が E の同じ弧状連結成分に属することと同値である. \square

系 4.11 (B, b_0) を点付き空間, $((E, x_0), p)$ を (B, b_0) 上の点付き被覆空間とする.

- (1) 群準同型 $p_*: \pi_1(E, x_0) \rightarrow \pi_1(B, b_0)$ は単射であり, その像は $\pi_1(B, b_0)$ -集合 E_{b_0} の点 x_0 の固定部分群に等しい.
- (2) 2 点 $x, x' \in E_{b_0}$ が $\pi_1(B, b_0)$ の作用によって移り合うための必要十分条件は, x と x' が E の同じ弧状連結成分に属することである.

証明 命題 4.10 の特別な場合である。 □

命題 4.12 B を弧状連結空間, (E, p) を B 上の被覆空間とし, $b_0 \in B$ とする。

- (1) E が弧状連結であるための必要十分条件は, $\pi_1(B, b_0)$ の E_{b_0} への作用が推移的であることである。
- (2) E が単連結であるための必要十分条件は, $\pi_1(B, b_0)$ の E_{b_0} への作用が自由かつ推移的であることである。

証明 (1) 必要性を示す。 E が弧状連結であるとする。すると, $E \neq \emptyset$ と E のファイバーがすべて同相であること (系 1.9) より $E_{b_0} \neq \emptyset$ であり, E_{b_0} の任意の 2 点は $\pi_1(B, b_0)$ の作用によって移り合う (系 4.11 (2)). よって, $\pi_1(B, b_0)$ の E_{b_0} への作用は推移的である。

十分性を示す。 $\pi_1(B, b_0)$ の E_{b_0} への作用が推移的であるとする。すると, $E_{b_0} \neq \emptyset$ だから 1 点 $x_0 \in E_{b_0}$ を固定できる。点 $x \in E$ を任意にとる。 B は弧状連結だから $\alpha \in \Pi(B; p(x'), b_0)$ が存在し, さらに仮定より $\beta \in \pi_1(B, b_0)$ であって $\beta\alpha \cdot x = x_0$ となるものが存在する。したがって, x と x_0 は E の同じ弧状連結成分に属する (命題 4.10 (2)). 任意の点 $x \in E$ に対してこれがいえるから, E は弧状連結である。

(2) 系 4.11 (1) より, 基本群 $\pi_1(E, x_0)$ ($x_0 \in E_{b_0}$) が自明であるための必要十分条件は, $\pi_1(B, b_0)$ の E_{b_0} への作用が自由であることである。このことと (1) から, 主張を得る。 □

4.4 基本垂群の被覆空間への作用に関する同変写像

命題 4.13 B を位相空間, $(E, p), (E', p')$ を B 上の被覆空間, $f: E \rightarrow E'$ を B 上の写像とする。次の 2 条件について, (a) \implies (b) が成り立つ。さらに, B が局所弧状連結ならば, 2 条件は同値である。

- (a) f は B 上の連続写像である。
- (b) f は $\Pi(B)$ -集合族 (E, p) から (E', p') への $\Pi(B)$ -同変写像である。

証明 (a) \implies (b) 点 $b, b' \in B$ と $\alpha \in \Pi(B; b, b')$ を任意にとり, $x \in E_b$ として, 点 $x' \in E_{b'}$ と $\tilde{\alpha} \in \Pi(E; x, x')$ を $p_*(\tilde{\alpha}) = \alpha$ となるようにとる。 f が連続ならば, $f_*(\tilde{\alpha}) \in \Pi(E'; f(x), f(x'))$ が定まり, これは $p'_*(f_*(\tilde{\alpha})) = p_*(\tilde{\alpha}) = \alpha$ を満たすから,

$$\alpha \cdot f(x) = f(x') = f(\alpha \cdot x)$$

である。よって, f は $\Pi(B)$ -同変である。

(b) \implies (a) (B が局所弧状連結である場合) B は局所弧状連結だから, (E, p) と (E', p') の両方に対する B の自明化開被覆 $\{U_i\}_{i \in I}$ であって各 U_i が弧状連結であるものがとれる。 f が $\Pi(B)$ -同変ならば, 各 $i \in I$ に対して f の制限 $f_{U_i}: E|_{U_i} \rightarrow E'|_{U_i}$ は $\Pi(U_i)$ -同変である。また, $\{E|_{U_i}\}_{i \in I}$ は E の開被覆だから, f が連続であることと, すべての $i \in I$ に対して f_{U_i} が連続であることは同値である。したがって, B が弧状連結かつ $(E, p), (E', p')$ が自明な被覆空間である場合に主張を示せばよい。

$(E, p) = (B \times F, \text{pr}_B)$, $(E', p') = (B \times F', \text{pr}_B)$ (F, F' は離散空間) とする。このとき, 点 $b, b' \in B$ と $\alpha \in \Pi(B; b, b')$ に対して

$$\begin{aligned} \alpha \cdot (b, x) &= (b', x) & (x \in F), \\ \alpha \cdot (b, x') &= (b', x') & (x' \in F') \end{aligned}$$

だから、 f が $\Pi(B)$ -同変ならば、写像 $\phi: F \rightarrow F'$ が存在して $f = \text{id}_B \times \phi$ と書ける。このとき、 f は明らかに連続である。これで、主張が示された。 \square

4.5 持ち上げの存在判定法

定理 4.14 (持ち上げの存在判定法) (B, b_0) を点付き空間、 $((E, x_0), p)$ を (B, b_0) 上の点付き被覆空間とし、 (A, a_0) を弧状連結かつ局所弧状連結な点付き空間、 $f: (A, a_0) \rightarrow (B, b_0)$ を点付き連続写像とする。次の 2 条件は同値である。

- (a) f の (E, x_0) への点付き持ち上げが存在する。
- (b) $f_*(\pi_1(A, a_0)) \subseteq p_*(\pi_1(E, x_0))$ である。

さらに、これらの条件の下で、 f の (E, x_0) への点付き持ち上げは一意である。

証明 (a) \implies (b) $\tilde{f}: (A, a_0) \rightarrow (E, x_0)$ を f の点付き持ち上げとすると、

$$f_*(\pi_1(A, a_0)) = p_*(\tilde{f}_*(\pi_1(A, a_0))) \subseteq p_*(\pi_1(E, x_0))$$

が成り立つ。

(b) \implies (a) $f_*(\pi_1(A, a_0)) \subseteq p_*(\pi_1(E, x_0))$ であるとする。 (A, a_0) は連結だから、持ち上げの一意性 (系 4.3) より、 f の (E, x_0) への点付き持ち上げはただか一意である。

以下、 f の (E, x_0) への点付き持ち上げ $\tilde{f}: (A, a_0) \rightarrow (E, x_0)$ を構成する。 A は弧状連結だから、 $a \in A$ に対して $\Pi(A; a_0, a)$ は空でない。さらに、 $\alpha, \beta \in \Pi(A; a_0, a)$ とすると

$$f_*(\beta)^{-1}f_*(\alpha) = f_*(\beta^{-1}\alpha) \in f_*(\pi_1(A, a_0)) \subseteq p_*(\pi_1(E, x_0))$$

だから、系 4.11 (1) より $f_*(\beta)^{-1}f_*(\alpha) \cdot x_0 = x_0$ 、すなわち $f_*(\alpha) \cdot x_0 = f_*(\beta) \cdot x_0$ である。よって、写像 $\tilde{f}: A \rightarrow E$ を

$$\tilde{f}(a) = f_*(\alpha) \cdot x_0 \quad (a \in A, \alpha \in \Pi(A; a_0, a))$$

と定義できる。この写像は、明らかに $\tilde{f}(a_0) = x_0$ および $p \circ \tilde{f} = f$ を満たす。あとは、 \tilde{f} の連続性を示せばよい。

点 $a_1 \in A$ を任意にとり、 $\alpha \in \Pi(A; a_0, a_1)$ を 1 つ固定する。 $f(a_1)$ を含む E に対する自明化開集合 U をとる。 A は局所弧状連結だから、これに対して a の弧状連結な開近傍 V を $f(V) \subseteq U$ となるようにとれる。任意の $a \in V$ に対して $\beta \in \Pi(V; a_1, a)$ がとれ、 $\tilde{f}(a)$ は

$$\tilde{f}(a) = f_*(\beta\alpha) \cdot x_0 = f_*(\beta) \cdot (f_*(\alpha) \cdot x_0) = f_*(\beta) \cdot \tilde{f}(a_1)$$

と表されるから、基本垂群の被覆空間への作用の定義より、 $\tilde{f}(a)$ は $\tilde{f}(a_1)$ と同じ $E|_U$ の弧状連結成分に属する。よって、自明化写像 $\phi: E|_U \rightarrow U \times F$ (F は離散空間) をとり、 $\phi(a_1)$ の F -成分を y_1 と置くと、任意の $a \in V$ に対して

$$\phi(\tilde{f}(a)) = (a, y_1)$$

である。よって、 \tilde{f} は a_1 の開近傍 V 上で連続である。任意の $a_1 \in A$ に対してこれがいえるから、 \tilde{f} は連続である。これで、主張が示された。 \square

系 4.15 (B, b_0) を点付き空間, $((E, x_0), p)$ を (B, b_0) 上の点付き被覆空間とし, (A, a_0) を単連結かつ局所弧状連結な点付き空間とする. 任意の点付き連続写像 $f: (A, a_0) \rightarrow (B, b_0)$ に対して, f の $((E, x_0), p)$ への点付き持ち上げが一意に存在する.

証明 このとき基本群 $\pi_1(A, a_0)$ は自明だから, $f_*(\pi_1(A, a_0)) \subseteq p_*(\pi_1(E, x_0))$ は常に成り立つ. よって, 定理 4.14 から主張が従う. \square

系 4.16 B は位相空間, U は B の弧状連結かつ局所弧状連結な部分集合であり, 任意の点 $b \in U$ に対して包含写像が誘導する群準同型 $\pi_1(U, b_0) \rightarrow \pi_1(B, b_0)$ の像は自明であるとする. このとき, B 上の任意の被覆空間 (E, p) に対して, $(E|_U, p_U)$ は U 上の自明化可能な被覆空間である. 特に, B が単連結かつ局所弧状連結ならば, B 上の被覆空間はすべて自明化可能である.

証明 $E|_U$ の連続切断全体の集合 $\Gamma(E|_U) = \{s: U \rightarrow E|_U \mid s \text{ は連続写像, } p_U \circ s = \text{id}_U\}$ に離散位相を入れると, 写像

$$\phi: U \times \Gamma(E|_U) \rightarrow E|_U, \quad (b, s) \mapsto s(b)$$

が U 上の同相写像であることを示す. ϕ は U 上の連続写像であり, したがって開写像である (命題 1.10). さらに, 仮定と持ち上げの存在判定法 (定理 4.14) より, 任意の点 $x \in E|_U$ に対して $s \in \Gamma(E|_U)$ であって $s(p(x)) = x$ を満たすものが一意に存在するから, ϕ は全単射である. よって, ϕ は U 上の同相写像である. \square

4.6 普遍被覆空間

定義 4.17 (普遍被覆空間) B を弧状連結かつ局所弧状連結な位相空間とする^{*2}. B 上の被覆空間 (E, p) であって E が単連結であるものを, B 上の普遍被覆空間 (universal covering space) という. さらに, (B, b_0) が点付き空間であって $((E, x_0), p)$ が (B, b_0) 上の点付き被覆空間ならば, (E, x_0) を (B, b_0) 上の点付き普遍被覆空間 (pointed universal covering space) という.

命題 4.18 弧状連結かつ局所弧状連結な点付き空間 (B, b_0) 上の点付き普遍被覆空間は, 存在すれば $\mathbf{Cov}^*_{(B, b_0)}$ の始対象である. 特に, (B, b_0) 上の点付き普遍被覆空間は, B 上の点付き同相を除いてたかだか一意である.

証明 $((E, x_0), p)$ を (B, b_0) 上の点付き普遍被覆空間とする. B は局所弧状連結だから, E も局所弧状連結である. 示すべきことは, (B, b_0) 上の任意の点付き被覆空間 $((E', x'_0), p')$ に対して, B 上の点付き連続写像 $f: (E, x_0) \rightarrow (E', x'_0)$ が一意に存在することである. これは, 系 4.15 の特別な場合である. \square

系 4.19 弧状連結かつ局所弧状連結な位相空間 B 上の普遍被覆空間は, B 上の同相を除いてたかだか一意である.

証明 (E, p) と (E', p') がともに B 上の普遍被覆空間であるとする. 1 点 $b_0 \in B$ を固定する. (E, p) と (E', p') は空でなく, それぞれファイバーはすべて同相だから (系 1.9), E_{b_0}, E'_{b_0} は空でない. そこで, 点 $x_0 \in E_{b_0}$ と $x'_0 \in E'_{b_0}$ を固定すると, $((E, x_0), p)$ と $((E', x'_0), p')$ はともに (B, b_0) 上の点付き普遍被覆空間だから, 命題 4.18 よりこれらは B 上点付き同相である. 特に, (E, p) と (E', p') は B 上同相である. \square

^{*2} B に弧状連結性と局所弧状連結性を課しているのは, 命題 4.18 が成立するようにするためである.

5 被覆空間の分類

5.1 展覧空間

定義 5.1 (許容開集合) X を位相空間とする. X の局所弧状連結な開集合 $U \neq \emptyset$ であって^{*3}, 任意の 2 点 $x, y \in U$ に対して包含写像が誘導する写像 $\Pi(U; x, y) \rightarrow \Pi(X; x, y)$ の像が 1 元集合であるものを, X の許容開集合という. 点 $x \in X$ を含む許容開集合を, x の許容開近傍という.

U が位相空間 X の許容開集合ならば, $U \neq \emptyset$ であり, 任意の 2 点 $x, y \in U$ に対して $\Pi(U; x, y) \neq \emptyset$ だから, U は弧状連結である.

記法 5.2 本節の以下の部分では, 位相空間 X とその許容開集合 U , 点 $x, y \in U$ に対して, 包含写像が誘導する写像 $\Pi(U; x, y) \rightarrow \Pi(X; x, y)$ の像の唯一の元を $\alpha_{y,x}^U \in \Pi(X; x, y)$ と書く.

命題 5.3 X を位相空間, U を X の許容開集合とする. 任意の点 $x, y, z \in U$ に対して

$$\alpha_{x,x}^U = \epsilon_x, \quad \alpha_{z,y}^U \alpha_{y,x}^U = \alpha_{z,x}^U, \quad (\alpha_{y,x}^U)^{-1} = \alpha_{x,y}^U$$

である. さらに, $V \subseteq U$ も X の許容開集合であるとき, 任意の点 $x, y \in V$ に対して

$$\alpha_{y,x}^V = \alpha_{y,x}^U$$

である.

証明 明らかである. □

定義 5.4 (展覧空間) 許容開集合全体が開基をなすような位相空間を, 展覧空間 (espace délaçable) という^{*4}.

命題 5.5 位相空間 X に対して, 次の 2 条件は同値である.

- (a) X は展覧空間である.
- (b) X は局所弧状連結であり, かつ, 任意の点 $x \in X$ に対してその開近傍 U であって包含写像が誘導する群準同型 $\pi_1(U, x) \rightarrow \pi_1(X, x)$ の像が自明であるものが存在する^{*5}.

証明 (a) \implies (b) X が展覧空間であるとする. 任意の点 $x \in X$ とその開近傍 U に対して, x の許容開近傍 $V \subseteq U$ がとれるが, V は弧状連結であり, 包含写像が誘導する群準同型 $\pi_1(V, x) \rightarrow \pi_1(X, x)$ の像は自明である. よって, (b) が成り立つ.

(b) \implies (a) (b) が成り立つとする. 点 $x \in X$ とその開近傍 U を任意にとる. 仮定より, x の開近傍であって包含写像が誘導する群準同型 $\pi_1(V, x) \rightarrow \pi_1(X, x)$ の像が自明であるものがとれ, さらに x の弧状連

^{*3} 許容開集合の定義に局所弧状連結性を課しているのは, 補題 5.6 (3) が成立するようにするためである. 局所弧状連結性を課さなくても, 命題 5.3, 命題 5.5, 補題 5.6 (1), (2) は成立し, 展覧空間の定義 (定義 5.4) に影響はない.

^{*4} フランス語の “espace délaçable” という用語は, Bourbaki [1, Ch. IV §1.2 Def. 2] で用いられている. 形容詞 délaçable は「～の紐をほどく」という意味の動詞 délaçer の派生語である. この条件が普遍被覆空間の存在と関連していることを踏まえて (系 5.13), 円周の普遍被覆空間のイメージから付けられた名称だと思われる. Wikipedia [5] に “unloopable space” という英訳があるが, どのくらい普及しているのかはわからない. 確定した和訳はないと思われるが, 音の感じと普遍被覆空間のイメージから, 本稿では「展覧空間」と訳してみた.

^{*5} 条件 (b) の後半を満たす位相空間は, 半局所単連結 (semi-locally simply connected) であるという.

結な開近傍 $W \subseteq U \cap V$ がとれる. W は局所弧状連結であり, 包含写像 $\iota: W \rightarrow X$ が誘導する群準同型 $\iota_*: \pi_1(W, x) \rightarrow \pi_1(X, x)$ の像は自明である. 任意の 2 点 $y, z \in W$ に対して, $\iota_*(\Pi(W; y, z)) \subseteq \Pi(X; y, z)$ が 1 元集合であることを示す. W は弧状連結だから, $\beta \in \Pi(W; x, y)$ と $\gamma \in \Pi(W; x, z)$ がとれる. $\alpha \in \Pi(W; y, z)$ を任意にとる. すると, $\gamma^{-1}\alpha\beta \in \pi_1(W, x)$ だから $\iota_*(\gamma^{-1}\alpha\beta) = \epsilon_x$, すなわち $\iota_*(\alpha) = \iota_*(\gamma\beta^{-1})$ である. したがって, $\iota_*(\Pi(W; y, z))$ はただ 1 つの元 $\iota_*(\gamma\beta^{-1})$ からなる. よって, W は許容開集合である. 以上より, X は展覧空間である. \square

5.2 被覆空間と基本亜群が作用する集合との対応

補題 5.6 B を展覧空間, (E, p) を $\Pi(B)$ -集合とし, U を B の許容開集合とする.

(1) $E|_U$ 上の関係

$$x \sim_U x' \iff \alpha_{p(x'), p(x)}^U \cdot x = x'$$

は同値関係である.

(2) (1) の同値関係 \sim_U による $E|_U$ の商集合を F_U と書くと, 写像 $\phi_U: E|_U \rightarrow U \times F_U$, $x \mapsto (p(x), [x])$ は全単射である.

(3) さらに, (E, p) が B 上の被覆空間であり, $\Pi(B)$ の (E, p) への作用が E の位相が定めるものであるとする. このとき, F_U に離散位相を入れ $U \times F_U$ を U 上の自明な被覆空間とみなすと, (2) の写像 ϕ_U は U 上の同相写像である.

証明 (1) 命題 5.3 から従う.

(2) 点 $b \in U$ と同値類 $C \in F_U$ に対して, C の代表元 $x \in E|_U$ を 1 つ固定すると, $E_b \cap C$ はただ 1 つの元 $\alpha_{b, p(x)}^U \cdot x$ からなる. よって, ϕ_U は全単射である.

(3) このとき, $x \sim_U x'$ であるための必要十分条件は, x と x' が $E|_U$ の同じ弧状連結成分に属することである (命題 4.10 (2)). また, $E|_U$ は U 上の自明化可能な被覆空間である (系 4.16). U は弧状連結だから, ϕ_U は U 上の同相写像である. \square

命題 5.7 B を展覧空間, (E, p) を $\Pi(B)$ -集合とする. E 上の位相であって, 次の条件を満たすものが一意に存在する.

B の任意の許容開集合 U に対して, $E|_U$ は E の開集合であり, 補題 5.6 の全単射 $\phi_U: E|_U \rightarrow U \times F_U$ は同相写像である. ここで, F_U は離散空間とみなしている.

さらに, この位相に関して, (E, p) は B 上の被覆空間となる.

証明 条件を満たす E 上の位相に関して (E, p) が B 上の被覆空間となることは明らかである. B の許容開集合 U に対して, $U \times F_U$ の位相を全単射 ϕ_U によって移して得られる $E|_U$ 上の位相を τ_U と書く. 位相空間の一般論より, 条件を満たす E 上の位相が一意に存在することを示すためには, 次の 2 つを示せばよい.

(1) B の許容開集合 U, V に対して, $E|_{U \cap V}$ は位相 τ_U に関して開集合である.

(2) B の許容開集合 U, V に対して, τ_U と τ_V が誘導する $E|_{U \cap V}$ 上の相対位相は一致する.

以下, これらを示す.

(1) $\phi_U(E|_{U \cap V}) = V \times F_U$ は $U \times F_U$ の開集合だから、 $E|_{U \cap V}$ は位相 τ_U に関して開集合である。

(2) X は展覧空間だから、 X の許容開集合 $W \subseteq U \cap V$ の全体は $U \cap V$ を被覆し、したがって W に対する $E|_W$ の全体は $E|_{U \cap V}$ を被覆する。このような許容開集合 W を 1 つ固定する。任意の 2 点 $x, x' \in E|_W$ に対して

$$x \sim_W x' \iff \alpha_{p(x'), p(x)}^W \cdot x = x' \iff \alpha_{p(x'), p(x)}^U \cdot x = x' \iff x \sim_U x'$$

であり (命題 5.3), また補題 5.6 より任意の $x \in E|_U$ に対してある $x' \in E|_W$ が存在して $x \sim_U x'$ となるから, 包含写像 $\iota: E|_W \rightarrow E|_U$ は全単射 $f: F_W \rightarrow F_U$ を誘導する。これより図式

$$\begin{array}{ccc} E|_W & \xrightarrow{\tilde{\iota}} & E|_U \\ \phi_W \downarrow & & \downarrow \phi_U \\ W \times F_W & \xrightarrow{\iota \times f} & U \times F_U \end{array} \quad (\iota: W \rightarrow U \text{ は包含写像})$$

は可換であり, $\iota \times f$ は開埋め込みだから, $\tilde{\iota}$ は位相 τ_W と τ_U に関して開埋め込みである。以上より, $S \subseteq E|_{U \cap V}$ が位相 τ_U に関して開集合であるための必要十分条件は, X の任意の許容開集合 $W \subseteq U \cap V$ に対して $S \cap E|_W$ が位相 τ_W に関して開集合であることである。 τ_V についても同じことがいえるから, τ_U と τ_V が誘導する $E|_{U \cap V}$ 上の相対位相は一致する。 \square

定義 5.8 (基本垂群の作用が定める位相) B を展覧空間とし, (E, p) を $\Pi(B)$ -集合とする。命題 5.7 によって定まる E 上の位相を, 基本垂群 $\Pi(B)$ の作用が定める位相という。

定理 5.9 (被覆空間と基本垂群が作用する集合との対応) B を展覧空間とし, E を集合, $p: E \rightarrow B$ を写像とする。定義 4.9 と定義 5.8 の対応は互いに他の逆であり, E 上の位相であって (E, p) を B 上の被覆空間にするものと, 基本垂群 $\Pi(B)$ の (E, p) への作用との一対一対応を与える。

証明 まず, τ を E 上の位相であって (E, p) を B 上の被覆空間にするものとし, τ が定める基本垂群の作用を θ とし, θ が定める位相を τ' とする。 τ' は命題 5.7 の条件によって特徴付けられる位相だが, 補題 5.6 (3) より τ もこの条件をみたすから, $\tau' = \tau$ である。

次に, θ を基本垂群 $\Pi(B)$ の (E, p) への作用とし, θ が定める位相を τ とし, τ が定める基本垂群の作用を θ' とする。 $\theta(\alpha) = \theta(\alpha, -)$, $\theta'(\alpha) = \theta'(\alpha, -)$ と書く。許容開集合 U と点 $b, b' \in U$ に対して, 位相 τ は補題 5.6 の全単射 $\phi_U: E|_U \rightarrow U \times F_U$ が同相写像になるように定義されているから,

$$\theta'(\alpha_{b', b}^U) = \theta(\alpha_{b', b}^U) \quad (*)$$

である。点 $b, b' \in B$ と $\alpha = [l] \in \Pi(B; b, b')$ を任意にとる。 B が展覧空間であることと Lebesgue の被覆補題より, 正の整数 n と許容開集合の列 U_0, \dots, U_{n-1} を, 各 i に対して $l([i/n, (i+1)/n]) \subseteq U_i$ となるようにとれる。各 i に対して $b_i = l(i/n)$ と置くと

$$\alpha = \alpha_{b_n, b_{n-1}}^{U_{n-1}} \cdots \alpha_{b_1, b_0}^{U_0}$$

だから, (*) より

$$\theta'(\alpha) = \theta'(\alpha_{b_n, b_{n-1}}^{U_{n-1}}) \cdots \theta'(\alpha_{b_1, b_0}^{U_0}) = \theta(\alpha_{b_n, b_{n-1}}^{U_{n-1}}) \cdots \theta(\alpha_{b_1, b_0}^{U_0}) = \theta(\alpha)$$

である。よって, $\theta' = \theta$ である。 \square

定理 5.9 と命題 4.13 より, 圏同型 $\mathbf{Cov}_B \cong \Pi(B)\text{-Set}$ が成立する。

5.3 被覆空間と基本群が作用する集合との対応

2.3 節で, \mathcal{G} を亜群, $b_0 \in \text{Ob}(\mathcal{G})$ として $G = \text{Aut}_{\mathcal{G}}$ と置くととき, 関手 $\mathbf{F}_{b_0}: \mathcal{G}\text{-Set} \rightarrow G\text{-Set}$ と $\mathbf{E}_{b_0}: G\text{-Set} \rightarrow \mathcal{G}\text{-Set}$ を構成した. (B, b_0) を点付き展覧空間として $\mathcal{G} = \Pi(B)$, $G = \pi_1(B, b_0)$ とするとき, 前小節で述べたように圏同型 $\mathbf{Cov}_B \cong \Pi(B)\text{-Set}$ が成立するから, これらは関手

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{b_0}: \mathbf{Cov}_B &\rightarrow G\text{-Set}, & \mathbf{F}_{b_0}((E, p)) &= E_{b_0}, & \mathbf{F}_{b_0}(f) &= f_{b_0}, \\ \mathbf{E}_{b_0}: G\text{-Set} &\rightarrow \mathbf{Cov}_B, & \mathbf{E}_{b_0}(X) &= P \times^{\pi_1(B, b_0)} X, & \mathbf{E}_{b_0}(f) &= \text{id}_P \times^{\pi_1(B, b_0)} f \end{aligned}$$

ともみなせる. ここで, P は b_0 を始点とする B 上の道の道ホモトピー類全体の集合である.

定理 5.10 (被覆空間と基本群が作用する集合との対応) (B, b_0) を点付き展覧空間とする.

(1) $\pi_1(B, b_0)$ -集合 X に対して, 写像

$$\begin{aligned} \phi_X: (P \times^{\pi_1(B, b_0)} X)_{b_0} &\rightarrow X, & [(\alpha, x)] &\mapsto \alpha \cdot x, \\ \phi'_X: X &\rightarrow (P \times^{\pi_1(B, b_0)} X)_{b_0}, & x &\mapsto [(\text{id}_{b_0}, x)] \end{aligned}$$

は矛盾なく定まり, これらは互いに他の逆を与える $\pi_1(B, b_0)$ -同型である. さらに, $\pi_1(B, b_0)$ -集合 X, Y の間の $\pi_1(B, b_0)$ -同変写像 $f: X \rightarrow Y$ に対して, 図式

$$\begin{array}{ccc} (P \times^{\pi_1(B, b_0)} X)_{b_0} & \xrightarrow{(\text{id}_P \times^{\pi_1(B, b_0)} f)_{b_0}} & (P \times^{\pi_1(B, b_0)} Y)_{b_0} \\ \phi_X \downarrow & & \downarrow \phi_Y \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

である.

(2) B が弧状連結であるとして, 各点 $b \in B$ に対して道ホモトピー類 $\alpha_b \in \Pi(B; b_0, b)$ を 1 つずつ固定する. このとき, B 上の被覆空間 (E, p) に対して, 写像

$$\begin{aligned} \psi_{(E, p)}: P \times^{\pi_1(B, b_0)} E_{b_0} &\rightarrow E, & [(\alpha, x)] &\mapsto \alpha \cdot x, \\ \psi'_{(E, p)}: E &\rightarrow P \times^{\pi_1(B, b_0)} E_{b_0}, & x &\mapsto [(\alpha_{p(x)}, \alpha_{p(x)}^{-1} \cdot x)] \end{aligned}$$

は矛盾なく定まり ($\psi'_{(E, p)}$ は $\{\alpha_b\}_{b \in B}$ のとり方によらない), これらは互いに他の逆を与える B 上の同相写像である. さらに, B 上の被覆空間 $(E, p), (E', p')$ の間の B 上の連続写像 $f: E \rightarrow E'$ に対して, 図式

$$\begin{array}{ccc} P \times^{\pi_1(B, b_0)} E_{b_0} & \xrightarrow{\text{id}_P \times^{\pi_1(B, b_0)} f_{b_0}} & P \times^{\pi_1(B, b_0)} E'_{b_0} \\ \psi_{(E, p)} \downarrow & & \downarrow \psi_{(E', p')} \\ E & \xrightarrow{f} & E' \end{array}$$

は可換である.

証明 被覆空間と基本亜群が作用する集合との対応 (定理 5.9) と命題 4.13, 亜群が作用する集合と群が作用する集合との対応 (定理 2.5) から従う. \square

よって、 B が弧状連結ならば、定理 2.5 (1), (2) の同型はそれぞれ自然同型 $\mathbf{F}_{b_0} \circ \mathbf{E}_{b_0} \cong \text{Id}_{\pi_1(B, b_0)\text{-Set}}$, $\mathbf{E}_{b_0} \circ \mathbf{F}_{b_0} \cong \text{Id}_{\mathbf{Cov}_B}$ を与え、 \mathbf{F}_{b_0} と \mathbf{E}_{b_0} は互いに他の準逆を与える圏同値関手であり、圏同値 $\mathbf{Cov}_B \simeq \pi_1(B, b_0)\text{-Set}$ が成立する。

系 5.11 (被覆空間の分類) (B, b_0) を弧状連結な点付き展覧空間とする。

- (1) 任意の $\pi_1(B, b_0)$ -集合 X に対して、 B 上の被覆空間 (E, p) であって E_{b_0} が X に $\pi_1(B, b_0)$ -同型であるものが、 B 上の同相を除いて一意に存在する。
- (2) $(E, p), (E', p')$ を B 上の被覆空間とする。任意の $\pi_1(B, b_0)$ -同変写像 $g: E_{b_0} \rightarrow E'_{b_0}$ に対して、 B 上の連続写像 $f: E \rightarrow E'$ であって $f_{b_0} = g$ を満たすものが一意に存在する。

証明 被覆空間と基本群が作用する集合との対応 (定理 5.10) より関手 \mathbf{F}_{b_0} は圏同値だから、主張は圏の一般論から従う。 \square

系 5.12 (点付き被覆空間の分類) (B, b_0) を弧状連結な点付き展覧空間とする。

- (1) 任意の点付き $\pi_1(B, b_0)$ -集合 (X, a_0) に対して、 (B, b_0) 上の点付き被覆空間 $((E, x_0), p)$ であって (E_{b_0}, x_0) が (X, a_0) に点付き $\pi_1(B, b_0)$ -同型であるものが、 B 上の点付き同相を除いて一意に存在する。
- (2) $((E, x_0), p), ((E', x'_0), p')$ を (B, b_0) 上の点付き被覆空間とする。任意の点付き $\pi_1(B, b_0)$ -同変写像 $g: (E_{b_0}, x_0) \rightarrow (E'_{b_0}, x'_0)$ に対して、 B 上の点付き連続写像 $f: (E, x_0) \rightarrow (E', x'_0)$ であって $f_{b_0} = g$ を満たすものが一意に存在する。

証明 (2) と (1) の一意性は系 5.11 (2) から、(1) の存在は系 5.11 (1) から従う。 \square

系 5.13 弧状連結かつ局所弧状連結な位相空間 B に対して、次の 2 条件は同値である。

- (a) B は展覧空間である。
- (b) B 上の普遍被覆空間が存在する。

証明 (a) \implies (b) B が展覧空間であるとする。1 点 $b_0 \in B$ を固定して、被覆空間と基本群が作用する集合との対応 (定理 5.10) によって自由かつ推移的な $\pi_1(B, b_0)$ -集合 (たとえば、 $\pi_1(B, b_0)$ 自身に $\pi_1(B, b_0)$ を左からの群演算によって作用させればよい) に対応する B 上の被覆空間は、普遍被覆空間である (命題 4.12 (2))。

(b) \implies (a) (E, p) が B 上の普遍被覆空間であるとする。 B は局所弧状連結だから、 (E, p) に対する弧状連結な自明化開集合 U の全体は B の開基をなすが、このような U が許容開集合であることを示す。 B は局所弧状連結だから、 U も局所弧状連結である。 l, l' は U に含まれる道であり、始点と終点を共有するとする。 $E|_U$ は自明化可能だから、 l, l' それぞれの持ち上げ \tilde{l}, \tilde{l}' を始点と終点を共有するようにとれる。 E は単連結だから $\Pi(E)$ において $[\tilde{l}] = [\tilde{l}']$ であり、したがって $\Pi(B)$ において $[l] = p_*([\tilde{l}]) = p_*([\tilde{l}']) = [l']$ である。よって、 U は許容開集合である。 \square

5.4 基本群の部分群による弧状連結な被覆空間の分類

G を群とする。 G の部分群 H と H' が共役 (conjugate) であるとは、ある $g \in G$ が存在して $gHg^{-1} = H'$ となることをいう。この関係は、 G の部分群全体のなす集合上の同値関係である。この同値関係に関する同値

類を、共役類 (conjugacy class) という.

補題 5.14 G を群とし, $(X, x_0), (Y, y_0)$ を推移的な点付き G -集合とする.

- (1) X と Y が G -同型であるための必要十分条件は, X における x_0 の固定部分群と y_0 の固定部分群とが共役であることである.
- (2) (X, x_0) と (Y, y_0) が点付き G -同型であるための必要十分条件は, x_0 の固定部分群と y_0 の固定部分群とが一致することである.

証明 (2) 必要性は明らかである. また, x_0 の固定部分群を H と置くと, 写像 $[g] \mapsto g \cdot x_0$ は点付き G -集合 $(G/H, [e])$ から (X, x_0) への点付き G -同型だから, 十分性も成り立つ.

(1) X と Y が G -同型であることは, ある点 $x \in X$ が存在して (X, x) と (Y, y_0) が点付き G -同型であることと同値である. X は推移的だから, これはまた, ある $g \in G$ が存在して $(X, g \cdot x_0)$ と (Y, y_0) が点付き G -同型であることと同値である. また, x_0 の固定部分群を H と置くと, $g \cdot x_0$ の固定部分群は gHg^{-1} である. よって, 主張は (2) から従う. \square

定理 5.15 (基本群の部分群による弧状連結な被覆空間の分類) (B, b_0) を弧状連結な点付き展覧空間とする.

- (1) (E, p) を B 上の弧状連結な^{*6} 被覆空間とする. $\pi_1(B, b_0)$ の部分群 $p_*(\pi_1(E, x_0))$ の共役類は, 点 $x_0 \in E_{b_0}$ のとり方によらない.
- (2) $\pi_1(B, b_0)$ の任意の部分群の共役類 C に対して, B 上の弧状連結な被覆空間 (E, p) であって $\pi_1(B, b_0)$ の部分群 $p_*(\pi_1(E, x_0))$ ($x_0 \in E_{b_0}$) の共役類が C であるものが, B 上の同相を除いて一意に存在する.

定理 5.16 (基本群の部分群による弧状連結な点付き被覆空間の分類) (B, b_0) を弧状連結な点付き展覧空間とする. $\pi_1(B, b_0)$ の任意の部分群 H に対して, (B, b_0) 上の弧状連結な点付き被覆空間 $((E, x_0), p)$ であって $p_*(\pi_1(E, x_0)) = H$ を満たすものが, B 上の点付き同相を除いて一意に存在する.

定理 5.15 と定理 5.16 の証明 B 上の被覆空間 (E, p) が連結であるための必要十分条件は, $\pi_1(B, b_0)$ -集合 E_{b_0} が推移的であることである (命題 4.12 (1)). また, 点 $x_0 \in E_{b_0}$ に対して, $p_*(\pi_1(E, x_0))$ は $\pi_1(B, b_0)$ -集合 E_{b_0} の点 x_0 の固定部分群である (系 4.11 (1)). よって, 定理 5.15 は被覆空間の分類 (系 5.11) と補題 5.14 (1) から, 定理 5.16 は点付き被覆空間の分類 (系 5.12) と補題 5.14 (2) から従う. \square

参考文献

- [1] N. Bourbaki, *Éléments de Mathématique, Topologie algébrique: Chapitres 1 à 4*, Springer, 2016.
- [2] T. tom Dieck, *Algebraic Topology*, American Mathematical Society, 2008.
- [3] flag3, 「基本群と被覆空間の Galois 理論」, 2021 年 11 月 11 日修正版. (2022 年 9 月 23 日アクセス)
<https://flag3.github.io>
- [4] J.Koizumi, 「被覆空間の Galois 理論」. (2022 年 9 月 23 日アクセス)
<https://asuka-math.amebaownd.com/posts/6005018>

^{*6} いま B は展覧空間であり, 特に局所弧状連結だから, B 上の被覆空間も局所弧状連結である. したがって, B 上の被覆空間が連結であることと弧状連結であることは同値である.

- [5] Wikipedia ‘Semi-locally simply connected’. (2022 年 9 月 23 日アクセス)
https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-locally_simply_connected