心肺機能停止前の重症傷病者に対する静脈路確保及び輸液

心停止前 静脈路確保・輸液プロトコール

【特定行為】

観 察

前提条件：15歳以上と判断される
1) 増悪するショックの可能性が高い
2) クラッシュ症候群を疑う

静脈路確保
要否の判断

NO → 通常の処置プロトコールに従った活動

YES

オンラインによる指示要請

オンライン不能 → 通常の処置プロトコールに従った活動

適応根拠
1) ショック増悪
2) クラッシュ症候群

[指示要請の報告事項]
・心原性ショックを疑う徴候の有無
・ショックを疑う病態
・現在の観察所見・状況
・ショック増悪の根拠
(出血, 意識障害, アナフィラキシー, 熱中症, 脱水 など)
・クラッシュ症候群を疑う根拠
(重量物, 土砂, 機械, 推定圧迫時間 など)

指導医の判断

心停止前の
静脈路確保の指示

NO → 搬送基準に従った搬送先の選定

YES

静脈路確保の実施
不成功なら報告

不成功 → 指導医の判断

[不成功の判断]
・2回穿刺しても入らない
(または5分以上を要する)
・状況から穿刺困難
[不成功だったら報告]
指導医に報告して
指示を受ける

【指導医による基本指示項目】
1) 静脈路確保の指示
2) 輸液速度の指示
急速輸液 → 全開 (総輸液量1000ml以内)
or
維持輸液 → 1秒1滴程度 (≒180ml/hr)

成 功

[基本的な手技]
・20G静脈留置針を用いる
・穿刺は2回まで (または5分以内)
・指示による輸液速度
急速輸液 → 全開
(1000ml終了後は維持輸液)
維持輸液 → 1滴/秒 (180ml/hr)

指示速度による輸液の開始

搬送基準に従った搬送先の選定

搬送先医療機関に
(輸液開始後の) 状況・症状・処置の報告

[指導医に報告] (搬送先と異なる場合)
・静脈路確保の実施 (部位、太さG)
・輸液開始後の変化
・搬送先での病態・診断