

FORMALE SYSTEME

ÜBUNG 6

Eric Kunze

`eric.kunze@tu-dresden.de`

TU Dresden, 26. November 2021

letzte Änderung:
20.11.2021, 22:44

Aufgabe 1:

Pumping-Lemma

NICHTREGULARITÄT DURCH PUMPEN

Idee:

- Jeder DFA hat nur endlich viele Zustände n
- Aber manche reguläre Sprachen enthalten beliebig lange Wörter

Wie kann ein DFA Wörter mit mehr als n Zeichen akzeptieren?

- Dann muss der DFA beim Einlesen einen Zustand mehr als einmal besuchen
- Dafür muss es in den Zustandsübergängen eine Schleife geben
- Diese Schleife kann man aber auch mehr als einmal durchlaufen

Jedes akzeptierte Wort mit $\geq n$ Zeichen hat einen Teil, den man beliebig oft wiederholen – „aufpumpen“ – kann.

DAS PUMPING-LEMMA

Satz (Pumping-Lemma): Für jede reguläre Sprache \mathbf{L} gibt es eine Zahl $n \geq 0$, so dass gilt:
für jedes Wort $z \in \mathbf{L}$ mit $|z| \geq n$
gibt es eine Zerlegung $z = uvw$ mit $|v| \geq 1$ und $|uv| \leq n$, so dass:
für jede Zahl $k \geq 0$ gilt: $uv^k w \in \mathbf{L}$

Beweis: Sei \mathcal{M} ein DFA für \mathbf{L} mit $|Q|$ Zuständen. Wir wählen $n = |Q| + 1$.

Ein akzeptierender Lauf für ein beliebiges Wort z mit $|z| = \ell \geq n$ muss in den ersten n Schritten einen Zustand p zweimal besuchen (sagen wir: nach i und j Schritten), hat also die Form:


$$q_0 \xrightarrow{z_1} q_1 \xrightarrow{z_2} \dots \xrightarrow{z_{i-1}} q_{i-1} \xrightarrow{z_i} p \xrightarrow{z_{i+1}} q_{i+1} \xrightarrow{z_{i+2}} \dots \xrightarrow{z_{j-1}} q_{j-1} \xrightarrow{z_j} p \xrightarrow{z_{j+1}} q_{j+1} \xrightarrow{z_{j+2}} \dots \xrightarrow{z_\ell} q_\ell$$

Die gesuchte Zerlegung ist $u = z_1 \dots z_i$, $v = z_{i+1} \dots z_j$, $w = z_{j+1} \dots z_\ell$.

Der Lauf $(q_0 \dots q_{i-1} p)(q_{i+1} \dots q_{j-1} p)^k (q_{j+1} \dots q_\ell)$ akzeptiert $uv^k w$.



AUFGABE 1



- a) Geben Sie für jedes $z \in \{bc, adc, cda, bc dc, ac dc\}$ alle Zerlegungen $z = uvw$ mit $u, w \in \Sigma^*$, $v \in \Sigma^+$ an, sodass für alle $k \geq 0$ gilt: $uv^k w \in L(\mathcal{M})$. Begründen Sie Ihre Antworten.
- b) Ermitteln Sie eine Zahl $n \in \mathbb{N}$, sodass für alle $z \in L(\mathcal{M})$ mit $|z| \geq n$ gilt, dass eine Zerlegung $z = uvw$ mit $u, w \in \Sigma^*$, $v \in \Sigma^+$ und $|uv| \leq n$ existiert, sodass für alle $k \geq 0$ gilt: $uv^k w \in L(\mathcal{M})$.

Aufgabe 2:

Regularität von Sprachen

BEWEIS VON NICHTREGULARITÄT

Satz (Myhill & Nerode): Eine Sprache \mathbf{L} ist genau dann regulär, wenn $\simeq_{\mathbf{L}}$ endlich viele Äquivalenzklassen hat.

Satz: Wenn \mathbf{L}_1 und \mathbf{L}_2 regulär sind, dann auch $\mathbf{L}_1 \cap \mathbf{L}_2$, $\mathbf{L}_1 \cup \mathbf{L}_2$, \mathbf{L}_1^* und $\overline{\mathbf{L}}_1$.

Satz (Pumping-Lemma): Für jede reguläre Sprache \mathbf{L} gibt es eine Zahl $n \geq 0$, so dass gilt:
für jedes Wort $x \in \mathbf{L}$ mit $|x| \geq n$
gibt es eine Zerlegung $x = uvw$ mit $|v| \geq 1$ und $|uv| \leq n$, so dass:
für jede Zahl $k \geq 0$ gilt: $uv^k w \in \mathbf{L}$

AUFGABE 2

Gegeben ist das Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$. Welche der folgenden Sprachen L_j über Σ mit $1 \leq j \leq 2$ ist regulär? Beweisen Sie Ihre jeweilige Antwort.

a) $L_1 = \{a^i b^j : 1 \leq i \leq 15\}$

b) $L_2 = \{a^n b^m a^{n \cdot m} : n, m \geq 0\}$

Aufgabe 3:

Wiederholung

AUFGABE 3

Beweisen oder widerlegen Sie unter Verwendung von Resultaten aus der Vorlesung folgende Aussagen.

- a) Für die Grammatik $G = (\{S, X, Y, Z\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow Y, X \rightarrow b, Y \rightarrow aYYb, aY \rightarrow aZ, ZY \rightarrow ZX, Z \rightarrow a\}, S)$ gilt: $abab \in L(G)$.
- b) Kann eine Sprache L von einem DFA erkannt werden, so gibt es auch einen ε -NFA \mathcal{M} mit $L(\mathcal{M}) = L$.
- c) Für jeden NFA \mathcal{M} mit Wortübergängen gibt es einen äquivalenten NFA.
- d) Es gibt eine reguläre Sprache, für welche die Anzahl der Äquivalenzklassen der *Nerode*-Rechtskongruenz endlich ist.
- e) Wenn es für eine Sprache L ein $n \in \mathbb{N}$ gibt, so dass die *Nerode*-Rechtskongruenz \simeq_L höchstens n Äquivalenzklassen hat, so kann L von einem DFA erkannt werden.
- f) Für jede Sprache L gilt: $L = \bigcup_{u \in L} [u]_{\simeq_L}$.

Aufgabe 4

Chomsky-Normalform

ELIMINIEREN VON ε -REGELN

Eingabe: CFG $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$

Ausgabe: ε -freie CFG $G' = \langle V', \Sigma, P', S' \rangle$ mit $\mathbf{L}(G') = \mathbf{L}(G)$

- Initialisiere $P' := P$ und $V' := V$
- Berechne $V_\varepsilon = \{A \in V \mid A \Rightarrow^* \varepsilon\}$
- Entferne alle ε -Regeln aus P'
- Solange es in P' eine Regel $B \rightarrow xAy$ gibt, mit

$$A \in V_\varepsilon \quad |x| + |y| \geq 1 \quad B \rightarrow xy \notin P'$$

wähle eine solche Regel und setze $P' := P' \cup \{B \rightarrow xy\}$

- Falls $S \in V_\varepsilon$ dann definiere ein neues Startsymbol $S' \notin V$, setze $V' := V' \cup \{S'\}$ und $P' := P' \cup \{S' \rightarrow S, S' \rightarrow \varepsilon\}$. Falls $S \notin V_\varepsilon$, dann verwenden wir einfach $S' := S$ als Startsymbol.

ELIMINIERUNG VON KETTENREGELN

Eine **Kettenregel** ist eine Regel der Form $A \rightarrow B$.

Sei $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ ϵ -frei. Eine äquivalente Grammatik ohne Kettenregeln ist gegeben durch $G' = \langle V, \Sigma, P', S \rangle$:

Eliminieren von Kettenregeln:

$E(A)$... Menge aller $B \in V$, die man von $A \in V$ aus über Kettenregeln erreichen kann:

- (1) $A \in E(A)$
- (2) Falls $B \in E(A)$ und $B \rightarrow B' \in P$ mit $B' \in V$ dann $B' \in E(A)$.
Wiederhole.

$$\implies P' = \bigcup_{A \in V} \left\{ A \rightarrow w \mid \text{es gibt } B \rightarrow w \in P \text{ mit } w \notin V \text{ und } B \in E(A) \right\}$$

DIE CHOMSKY-NORMALFORM

Eine kontextfreie Grammatik $G = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ ist in **Chomsky-Normalform (CNF)**, wenn alle ihre Produktionsregeln eine der beiden folgenden Formen haben:

$$A \rightarrow BC \quad (\text{mit } B, C \in V) \quad \text{oder} \quad A \rightarrow c \quad (\text{mit } c \in \Sigma)$$

Umwandlung in CNF:

- (1) Eliminierung von ε -Regeln
- (2) Eliminierung von Kettenregeln

(3) Extrahiere Regeln der Form $A \rightarrow c$, so dass alle anderen Regeln $B \rightarrow w$ keine Terminale mehr in w enthalten.

- für jedes Symbol $a \in \Sigma$:
neue Variable V_a mit Regel $V_a \rightarrow a$
- für Regeln $A \rightarrow w$ mit $|w| > 1$:
ersetze jedes Vorkommen von $a \in \Sigma$ in w durch V_a

(4) Reduziere Regeln der Form $A \rightarrow B_1 \cdots B_n$ auf $n = 2$

Für jede Produktionsregel $A \rightarrow B_1 \cdots B_n$ mit $n > 2$:

- Führe $n - 2$ neue Variablen C_1, \dots, C_{n-2} ein
- Ersetze die Regel durch neue Regeln:

$$A \rightarrow B_1 C_1$$

$$C_1 \rightarrow B_2 C_2$$

$$\vdots$$

$$C_{n-3} \rightarrow B_{n-2} C_{n-2}$$

$$C_{n-2} \rightarrow B_{n-1} B_n$$

AUFGABE 4

Betrachten Sie die Grammatik $G_0 = \langle V, \Sigma, P, S \rangle$ mit $V = \{S, T, U, V, R\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ und

$$P = \left\{ \begin{array}{llll} S \rightarrow \varepsilon, & S \rightarrow aSb, & S \rightarrow T, & S \rightarrow R, \\ T \rightarrow bbT, & T \rightarrow U, & U \rightarrow aaU, & U \rightarrow bbT, \\ V \rightarrow bSa, & R \rightarrow \varepsilon, & R \rightarrow bSa & \end{array} \right\}$$

- a) Konstruieren Sie eine Grammatik G_1 , die keine Regeln der Form $A \rightarrow \varepsilon$ für $A \in V$ enthält. Erweitern Sie dazu, wenn nötig, die Grammatik G_0 um ein neues Startsymbol S' und entsprechende Regeln.
- b) Geben Sie zu G_1 eine äquivalente Grammatik G_2 an, die keine Kettenregeln, also Produktionen der Form $A \rightarrow B$ mit Nichtterminalsymbolen A, B , enthält.
- c) Geben Sie eine Grammatik G_3 in Chomsky-Normalform an mit $L(G_3) = L(G_2) \setminus \{\varepsilon\}$.

Aufgabe 5

CYK-Algorithmus

AUFGABE 5

Gegeben ist folgende Grammatik $G = (V, \Sigma, P, S)$ mit $V = \{S, X, M, A, B\}$, $\Sigma = \{a, b\}$ und

$$P = \left\{ \begin{array}{lll} S \rightarrow \varepsilon, & S \rightarrow AX, & S \rightarrow AB, \\ X \rightarrow MB, & & \\ M \rightarrow AB, & M \rightarrow AX, & \\ A \rightarrow a, & & \\ B \rightarrow a, & B \rightarrow b & \end{array} \right\}$$

Verwenden Sie den CYK-Algorithmus (mit der Matrix-Notation aus der Vorlesung), um für die folgenden Wörter w_i zu entscheiden, ob $w_i \in L(G)$ ist.

a) $w_1 = aaabba$

b) $w_2 = aabbaa$