

PROGRAMMIERUNG

Übung 5: Unifikation & Induktion auf Listen

Eric Kunze

eric.kunze@mailbox.tu-dresden.de

TU Dresden, 10. Mai 2019



Unifikationsalgorithmus - Regeln

• **Dekomposition.** Sei $\delta \in \Sigma$ ein k-stelliger Konstruktor, $s_1, \ldots, s_k, t_1, \ldots, t_k$ Terme über Konstruktoren und Variablen.

$$\begin{pmatrix} \delta(s_1,\ldots,s_k) \\ \delta(t_1,\ldots,t_k) \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{pmatrix} s_1 \\ t_1 \end{pmatrix},\ldots,\begin{pmatrix} s_k \\ t_k \end{pmatrix}$$

• Elimination. Sei x eine Variable!

$$\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix} \sim 0$$

• Vertauschung. Sei t keine Variable.

$$\begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

• **Substitution.** Sei *x* eine Variable, *t* keine Variable und *x* kommt nicht in *t* vor (occur check). Dann ersetze in jedem anderen Term die Variable *x* durch *t*.



$$\begin{cases} \left(\delta(\alpha, \ \sigma(x_1, \alpha), \quad \sigma(x_2, x_3)) \\ \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, x_2), \ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \right) \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_1, \alpha) \\ \sigma(x_1, x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_2, x_3) \\ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{El.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Vert.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Subst.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$



$$\begin{cases} \left(\begin{array}{c} \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, \alpha), \quad \sigma(x_2, x_3)) \\ \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, x_2), \ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{array} \right) \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_1, \alpha) \\ \sigma(x_1, x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_2, x_3) \\ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{El.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Vert.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Subst.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

allgemeinster Unifikator:

$$x_1 \mapsto x_1 \qquad x_2 \mapsto \alpha \qquad x_3 \mapsto \gamma(\alpha)$$



$$\begin{cases} \left(\begin{matrix} \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, \alpha), \quad \sigma(x_2, x_3)) \\ \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, x_2), \ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{matrix} \right) \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_1, \alpha) \\ \sigma(x_1, x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_2, x_3) \\ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{matrix} \right) \right\} \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{El.}}{\Longrightarrow} 2 \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Vert.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Subst.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(\alpha) \end{pmatrix} \right\}$$

allgemeinster Unifikator:

$$x_1 \mapsto x_1 \qquad x_2 \mapsto \alpha \qquad x_3 \mapsto \gamma(\alpha)$$

Teilaufgabe (b)

$$t_1 = (a , [a])$$

 $t_2 = (Int , [Double])$
 $t_3 = (b , c)$



$$\begin{cases} \left(\begin{matrix} \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, \alpha), \quad \sigma(x_2, x_3)) \\ \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, x_2), \ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{matrix} \right) \\ \overset{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_1, \alpha) \\ \sigma(x_1, x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_2, x_3) \\ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{matrix} \right) \right\} \\ \overset{\text{Dek.}}{\Longrightarrow}^3 \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \overset{\text{El.}}{\Longrightarrow}^2 \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \overset{\text{Vert.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \overset{\text{Subst.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \end{cases}$$

allgemeinster Unifikator:

$$x_1 \mapsto x_1 \qquad x_2 \mapsto \alpha \qquad x_3 \mapsto \gamma(\alpha)$$

Teilaufgabe (b)

$$t_1 = (a, [a])$$

 $t_2 = (Int, [Double])$
 $t_3 = (b, c)$

• t₁ und t₂ sind



$$\begin{cases} \left(\begin{matrix} \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, \alpha), \quad \sigma(x_2, x_3)) \\ \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, x_2), \ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{matrix} \right) \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_1, \alpha) \\ \sigma(x_1, x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_2, x_3) \\ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{matrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{El.}}{\Longrightarrow} 2 \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Vert.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Subst.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

allgemeinster Unifikator:

$$x_1 \mapsto x_1 \qquad x_2 \mapsto \alpha \qquad x_3 \mapsto \gamma(\alpha)$$

Teilaufgabe (b)

$$t_1 = (a , [a])$$

 $t_2 = (Int , [Double])$
 $t_3 = (b , c)$

- t1 und t2 sind **nicht** unifizierbar
- t1 und t3 sind



$$\begin{cases} \left(\begin{matrix} \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, \alpha), \quad \sigma(x_2, x_3)) \\ \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, x_2), \ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{matrix} \right) \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_1, \alpha) \\ \sigma(x_1, x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_2, x_3) \\ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{matrix} \right) \right\} \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{El.}}{\Longrightarrow} 2 \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Vert.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Subst.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

allgemeinster Unifikator:

$$x_1 \mapsto x_1 \qquad x_2 \mapsto \alpha \qquad x_3 \mapsto \gamma(\alpha)$$

Teilaufgabe (b)

$$t_1 = (a , [a])$$

 $t_2 = (Int , [Double])$
 $t_3 = (b , c)$

- t1 und t2 sind **nicht** unifizierbar
- t1 und t3 sind unifizierbar mit



$$\begin{cases} \left(\delta(\alpha, \ \sigma(x_1, \alpha), \quad \sigma(x_2, x_3)) \\ \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, x_2), \ \sigma(x_2, \gamma(x_2))) \right) \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_1, \alpha) \\ \sigma(x_1, x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_2, x_3) \\ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} 3 \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{El.}}{\Longrightarrow} 2 \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Vert.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Subst.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

allgemeinster Unifikator:

$$x_1 \mapsto x_1 \qquad x_2 \mapsto \alpha \qquad x_3 \mapsto \gamma(\alpha)$$

Teilaufgabe (b)

$$t_1 = (a, [a])$$

 $t_2 = (Int, [Double])$
 $t_3 = (b, c)$

- t1 und t2 sind **nicht** unifizierbar
- t_1 und t_3 sind unifizierbar mit $a \mapsto a$ $b \mapsto a$ $c \mapsto \lceil a \rceil$
- t2 und t3 sind



$$\begin{cases} \left(\delta(\alpha, \ \sigma(x_1, \alpha), \quad \sigma(x_2, x_3)) \\ \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, x_2), \ \sigma(x_2, \gamma(x_2))) \right) \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_1, \alpha) \\ \sigma(x_1, x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_2, x_3) \\ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} 3 \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{El.}}{\Longrightarrow} 2 \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Vert.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Subst.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

allgemeinster Unifikator:

$$x_1 \mapsto x_1 \qquad x_2 \mapsto \alpha \qquad x_3 \mapsto \gamma(\alpha)$$

Teilaufgabe (b)

$$t_1 = (a, [a])$$

 $t_2 = (Int, [Double])$
 $t_3 = (b, c)$

- t_1 und t_2 sind **nicht** unifizierbar
- t_1 und t_3 sind unifizierbar mit $a \mapsto a$ $b \mapsto a$ $c \mapsto \lceil a \rceil$
- t2 und t3 sind unifizierbar mit



$$\begin{cases} \left(\delta(\alpha, \ \sigma(x_1, \alpha), \quad \sigma(x_2, x_3)) \\ \delta(\alpha, \ \sigma(x_1, x_2), \ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \right) \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_1, \alpha) \\ \sigma(x_1, x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(x_2, x_3) \\ \sigma(x_2, \gamma(x_2)) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{El.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \alpha \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Vert.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

$$\stackrel{\text{Subst.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix} \right\}$$

allgemeinster Unifikator:

$$x_1 \mapsto x_1 \qquad x_2 \mapsto \alpha \qquad x_3 \mapsto \gamma(\alpha)$$

Teilaufgabe (b)

$$t_1 = (a , [a])$$

 $t_2 = (Int , [Double])$
 $t_3 = (b , c)$

- t1 und t2 sind **nicht** unifizierbar
- t_1 und t_3 sind unifizierbar mit $a \mapsto a$ $b \mapsto a$ $c \mapsto \lceil a \rceil$
- t_2 und t_3 sind unifizierbar mit $b \mapsto Int \quad c \mapsto \lceil Double \rceil$



$$\begin{cases} \left(\begin{array}{cccc} \sigma \left(\begin{array}{cccc} \gamma(x_2) &, & \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & x_3 \\ \sigma(& x_1 &, & \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & \sigma(\alpha, x_1) \\ \end{array}) \end{array}) \right) \\ \sigma \left(\begin{array}{cccc} x_1 &, & \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & \sigma(\alpha, x_1) \\ \end{array}) \right) \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \gamma(x_2) \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & x_3 \\ \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & \sigma(\alpha, x_1) \\ \end{array}) \right\} \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \gamma(x_2) \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma(\alpha) \\ \gamma(\alpha) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, x_1) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, x_1) \end{pmatrix} \right\} \\ \xrightarrow{\text{Sub.}} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, \gamma(x_2)) \end{pmatrix} \right\}$$



$$\begin{cases} \left(\begin{array}{cccc} \sigma\left(\begin{array}{cccc} \gamma(x_2) &, & \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & x_3 \\ \sigma\left(\begin{array}{cccc} x_1 &, & \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & \sigma(\alpha, x_1) \\ \end{array}) \right) \end{array} \right) \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \gamma(x_2) \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & x_3 \\ \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & \sigma(\alpha, x_1) \\ \end{array}) \end{array} \right) \right\} \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \gamma(x_2) \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma(\alpha) \\ \gamma(\alpha) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, x_1) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \gamma(x_2) \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, x_1) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Vert.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, x_1) \end{pmatrix} \right\} \\ \xrightarrow{\text{Sub.}} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, \gamma(x_2)) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Sub.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, \gamma(x_2)) \end{pmatrix} \right\}$$

allgemeinster Unifikator:

$$x_1 \mapsto \gamma(x_2)$$
 $x_2 \mapsto x_2$ $x_3 \mapsto \sigma(\alpha, \gamma(x_2))$



$$\begin{cases} \left(\begin{array}{cccc} \sigma \left(\begin{array}{cccc} \gamma(x_2) &, & \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & x_3 \\ \sigma \left(\begin{array}{cccc} x_1 &, & \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & \sigma(\alpha, x_1) \\ \end{array}) \right) \end{array} \right) \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \gamma(x_2) \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & x_3 \\ \sigma(\begin{array}{cccc} \gamma(\alpha), & \sigma(\alpha, x_1) \\ \end{array}) \right) \right\} \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \gamma(x_2) \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \gamma(\alpha) \\ \gamma(\alpha) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, x_1) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Dek.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} \gamma(x_2) \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, x_1) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Vert.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, x_1) \end{pmatrix} \right\} \\ \xrightarrow{\text{Sub.}} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, \gamma(x_2)) \end{pmatrix} \right\} \\ \stackrel{\text{Sub.}}{\Longrightarrow} \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \gamma(x_2) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ \sigma(\alpha, \gamma(x_2)) \end{pmatrix} \right\}$$

allgemeinster Unifikator:

$$x_1 \mapsto \gamma(x_2)$$
 $x_2 \mapsto x_2$ $x_3 \mapsto \sigma(\alpha, \gamma(x_2))$

weitere Unifikatoren:

$$x_1 \mapsto \gamma(\alpha)$$
 $x_2 \mapsto \alpha$ $x_3 \mapsto \sigma(\alpha, \gamma(\alpha))$
 $x_1 \mapsto \gamma(\gamma(\alpha))$ $x_2 \mapsto \gamma(\alpha)$ $x_3 \mapsto \sigma(\alpha, \gamma(\gamma(\alpha)))$



- Allgemeine Hinweise. Es müssen alle Variablen quantifiziert werden!
- Was wollen wir? Wir wollen zeigen, dass eine Eigenschaft (ein Prädikat) P für jede Liste xs :: [a] gilt, d.h. dass P(xs) gilt.



- Allgemeine Hinweise. Es müssen alle Variablen quantifiziert werden!
- Was wollen wir? Wir wollen zeigen, dass eine Eigenschaft (ein Prädikat) P für jede Liste xs :: [a] gilt, d.h. dass P(xs) gilt.
- Induktionsanfang. Wir zeigen P(xs) für xs == [].
 Achtung: hat P weitere freie Parameter, dann müssen auch diese quantifiziert werden!



- Allgemeine Hinweise. Es müssen alle Variablen quantifiziert werden!
- Was wollen wir? Wir wollen zeigen, dass eine Eigenschaft (ein Prädikat) P für jede Liste xs :: [a] gilt, d.h. dass P(xs) gilt.
- Induktionsanfang. Wir zeigen P(xs) für xs == [].
 Achtung: hat P weitere freie Parameter, dann müssen auch diese quantifiziert werden!
- Induktionsvoraussetzung. Wir nehmen an, dass P(xs') für eine Liste xs':: [a] gilt.
 Achtung: freie Parameter!



- Allgemeine Hinweise. Es müssen alle Variablen quantifiziert werden!
- Was wollen wir? Wir wollen zeigen, dass eine Eigenschaft (ein Prädikat) P für jede Liste xs :: [a] gilt, d.h. dass P(xs) gilt.
- Induktionsanfang. Wir zeigen P(xs) für xs == [].
 Achtung: hat P weitere freie Parameter, dann müssen auch diese quantifiziert werden!
- Induktionsvoraussetzung. Wir nehmen an, dass P(xs') für eine Liste xs':: [a] gilt.
 Achtung: freie Parameter!
- Induktionsschritt. Nutze die Induktionsvoraussetzung um zu zeigen, dass $P(\mathbf{x} : \mathbf{x}\mathbf{s}')$ für alle $\mathbf{x} :: \mathbf{a}$ gilt.



• zu zeigen.

```
sum (foo xs) = 2 * sum xs - length xs für alle xs :: Int
```



• zu zeigen.

```
sum (foo xs) = 2 * sum xs - length xs für alle xs :: Int
```

• Induktionsanfang. Sei xs :: [Int] mit xs == [].

```
linke Seite: sum (foo []) \stackrel{(2)}{=} sum [] \stackrel{(6)}{=} 0
```

rechte Seite: 2 * sum [] - length []
$$\stackrel{(10)}{=}$$
 2 * sum [] - 0 $\stackrel{(6)}{=}$ 2 * 0 - 0 = 0



• zu zeigen.

```
sum (foo xs) = 2 * sum xs - length xs für alle xs :: Int
```

• Induktionsanfang. Sei xs :: [Int] mit xs == [].

```
linke Seite: sum (foo []) \stackrel{(2)}{=} sum [] \stackrel{(6)}{=} 0
```

rechte Seite: 2 * sum [] - length []
$$\stackrel{(10)}{=}$$
 2 * sum [] - 0 $\stackrel{(6)}{=}$ 2 * 0 - 0 = 0

• Induktionsvoraussetzung. Sei xs :: [Int], sodass gilt

$$sum (foo xs) = 2 * sum xs - length xs$$

П



Aufgabe 3

• Induktionsschritt. Für alle x :: Int zeigen wir, dass gilt

```
sum (foo (x:xs)) = 2 * sum (x:xs) - length (x:xs)
```

Beweis.

sum (foo (x:xs))
$$\stackrel{(3)}{=}$$
 sum (x : x : (-1) : foo xs)
 $\stackrel{3\cdot(7)}{=}$ x + x + (-1) + sum (foo xs)
 $\stackrel{(IV)}{=}$ x + x + (-1) + 2 * sum xs - length xs
 $\stackrel{(Komm.)}{=}$ 2 * x + 2 * sum xs - 1 - length xs)
 $\stackrel{(Dist.)}{=}$ 2 * (x + sum xs) - (1 + length xs)
 $\stackrel{(7)}{=}$ 2 * sum (x:xs) - (1 + length xs)
 $\stackrel{(11)}{=}$ 2 * sum (x:xs) - length (x:xs)