

## Correction to “Nanoscale Structure Evolution in Alkoxide–Carboxylate Sol–Gel Precursor Solutions of Barium Titanate”

Tomasz M. Stawski, Sjoerd A. Veldhuis, Rogier Besselink, Hessel L. Castricum, G. Portale, Dave H. A. Blank, and Johan E. ten Elshof\*

*J. Phys. Chem. C* **2010**, *115*, 20449–20459 DOI: 10.1021/jp206572q

Equation 9 contains errors. The correct expression for  $S_c(q)$  reads<sup>1</sup>

$$S_c(q) = \frac{1}{1 + 24\nu G(2qR_{HS})/(2qR_{HS})}$$
$$G(2qR_{HS}) = \alpha \frac{\sin(2qR_{HS}) - (2qR_{HS})\cos(2qR_{HS})}{(2qR_{HS})^2}$$
$$+ \beta \frac{4qR_{HS} \sin(2qR_{HS}) + (2 - (2qR_{HS})^2)\cos(2qR_{HS}) - 2}{(2qR_{HS})^3}$$
$$+ \gamma \frac{-(2qR_{HS})^4 \cos(2qR_{HS}) + 4[3(2qR_{HS})^2 - 6]\cos(2qR_{HS}) + 4[(2qR_{HS})^3 - 12qR_{HS}]\sin(2qR_{HS}) + 24}{(2qR_{HS})^5}$$
$$\alpha = (1 + 2\nu)^2/(1 - \nu)^4$$
$$\beta = -6\nu(1 + \nu/2)^2/(1 - \nu)^4$$
$$\gamma = \nu\alpha/2$$

The above correct expression was used in the calculations, so all results and conclusions in the paper remain unchanged.

### REFERENCES

- (1) Kinning, D. J.; Thomas, E. L. *Macromolecules* **1984**, *17*, 1712–1718.