

Prolapsus urétral chez la fille à propos de cinq cas

HILALI M.(1), NOUR M.(2), TALHA H.(2), OUBEJJA H.(2), ERRAJI M.(2), ZERHOUNI H.(2), ETTAYEBI F.(2)

(1) *Hopital d'enfant de Rabat, RABAT, MAROC*; (2) *Hopital d'enfant de Rabat, RABAT, MAROC*

Objectifs :Urétral prolapsus muqueux est rare chez les jeunes filles. Cette étude rapporte cinq cas de prolapsus urétral, en soulignant les options thérapeutiques de cette affection.

Sujet / matériels et méthodes : Il s'agit d'une maladie bénigne, vu dans la plupart des cas comme une saillie circulaire de l'urètre distal responsable d'un saignement vulvaire. Généralement, le traitement médical et le suivi sont suffisants, mais l'échec peut nécessiter une correction chirurgicale avec très peu de complications.l'exérèse chirurgicale sous anesthésie générale, a été posée chez les 4 cas et une fille qui a bénéficiée d'une simple réduction du prolapsus.

Résultats principaux:Les suites ont été simples et la guérison est obtenue dans tous les cas avec une durée moyenne d'hospitalisation de 4 jours. Les patientes ont été vues en consultation après quelques mois et aucune sténose, ni récurrence n'a été observée après un an de recul.

Conclusions: L'excision-suture réalisée dans les formes vues tardivement reste un traitement de choix avec des résultats satisfaisants. Les formes vues précocement, peuvent être traitées par simple réduction associée à un traitement antiseptique et anti-inflammatoire