

Erratum

Erratum à l'article « Comparaison des recommandations européennes (ESC) et américaines (ACC/AHA) concernant la prise en charge initiale des syndromes coronariens aigus avec sus-décalage du segment ST »
[Ann. Cardiol. Angeiol. 62 (2013) 265–268]

Erratum to “Comparison between European Society of Cardiology (ESC) and American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) guidelines for initial management of ST-elevation myocardial infarction (STEMI)” [Ann. Cardiol. Angeiol. 62 (2013) 265–268]

E. Puymirat^{a,*,b,c}, G. Ducrocq^d

^a Department of Cardiology, hôpital européen Georges-Pompidou, Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), 20, rue Leblanc, 75015 Paris, France

^b Université Paris-Descartes, 75006 Paris, France

^c Inserm U-970, 75015 Paris, France

^d Department of cardiology, hôpital Bichat, AP-HP, 75018 Paris, France

Dans l'article : « Comparaison des recommandations européennes (ESC) et américaines (ACC/AHA) concernant la prise en charge initiale des syndromes coronariens aigus avec sus décalage du segment ST » (*Comparison between European Society of Cardiology (ESC) and American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) guidelines for initial management of ST-elevation myocardial infarction [STEMI]*), publié dans le numéro 4 du volume 62 de l'année 2013 des *Annales de cardiologie et d'angéiologie*, une erreur de posologie s'est glissée à la page 267, 5^e ligne.

En effet, la dose d'entretien du Ticagrelor est de **90 mg deux fois par jour** et non de 90 mg par jour.

La rédaction s'excuse de cette erreur auprès des auteurs et de nos lecteurs.

DOI de l'article original : <http://dx.doi.org/10.1016/j.ancard.2013.06.002>.

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : etiennepuymirat@yahoo.fr (E. Puymirat).