

greß im Juli 1913 in London demonstriert worden und hat dort ungeteilte Anerkennung gefunden. Auch die farbigen Aufnahmen der Gebäude der Kolonie sind vorzüglich gelungen. Es besteht nur eine Schwierigkeit, sie können bisher nur im Sommer angefertigt werden, da sie eine lange Exposition und viel Sonne verlangen.

Kreibich demonstriert Präparate seiner Nervenfärbung, deren Technik im Bd. CXV des Archivs beschrieben ist.

Vierte Sitzung.

Samstag, den 20. September 1913, nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Herr Finger — Wien.

I. Aus der Klinik Finger.

1. *Atrophia cutis idiopathica diffusa* (6 Fälle).
- 1a. *Atrophica cutis maculosa*.
2. *Dermatitis herpetiformis* (Dühring), 2 Fälle.
3. *Xantho erythrodermie en plaques dissennées*. (Gleichzeitig *Gummata cutanea cruris dextr.*)
4. Ein Fall mit ausgedehntem *Favus* der Kopfhaut.
5. *Granulosis rubra nasi*.
6. *Lepra tuberosa* (Spaniolin aus Konstantinopel).
7. *Lepra ulcerosa et anaesthetica* (Spaniolin aus Konstantinopel).
8. *Lichen ruber planus* (2 Fälle).
9. *Naevus striatus ichthyosiformis* an Handtellern und Fußsohlen mit angeborener Nagelveränderung (durch Kohlensäureschneebehandlung bedeutend gebessert).
10. Systemisierter halbseitiger *Naevus*.
11. *Erythema induratum* (Bazin) mit Tuberkulin behandelt.
12. *Lichen scrophulosorum* (mit ausgedehnten konfluierenden Herden an den Unterschenkeln), gleichzeitig Lues, dzt. *Neuritis optica luetica*.
13. *Lupus vulgaris disseminatus acutus* (2 Fälle).
14. *Lupus vulgaris universalis* (2 Fälle).
15. *Lupus vulgaris tumidus et exulcerans*.
16. *Lupus vulgaris faciei* et *Lichen scrophulosorum*.
17. Ausgedehnter *Lupus vulgaris* der linken oberen und unteren Extremität mit *Fungus* des Sprunggelenkes.
18. *Osteoperiostitis tuberculosa*, *Lichen scrophulosorum*, papulo-nekrotisches Tuberkulid und *Lupus vulgaris faciei*.
19. *Lyphomata colli*, papulo nekrotisches Tuberkulid.
20. *Lupus erythematodes faciei* (mit positiver Reaktion auf Tuberkulin — fast geheilt mit Tuberkulin und Kohlensäureschnee) seit 2 Jahren *Abscessus frigidi* am Sternum und Humerus.
21. *Lupus erythematodes discoides faciei et capillitii* mit teilweiser spontaner Heilung und sehr intensiver Pigmentierung am Rande.
22. *Lupus erythematodes discoides* (2 Fälle).