

การให้ข้อมูลก่อนการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด

วัตถุประสงค์หลักของการฉีดสีสวนหัวใจ (Coronary Angiography หรือ CAG) เป็นการตรวจหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน โดยจะฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจและถ่ายภาพเอกซเรย์ เพื่อดูสภาพของหลอดเลือด และสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมทันที

ประเมินการทำงานของหัวใจ : นอกจากจะดูหลอดเลือดแล้ว ยังสามารถประเมินการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจได้ด้วย

วางแผนการรักษา : หากพบว่ามี การตีบตัน แพทย์จะพิจารณาการรักษาต่อไปได้ทันที เช่น การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน (PTCA) การใส่ขดลวดค้ำยัน (Stent)

ขั้นตอนการฉีดสีหัวใจ

1. พยาบาลทำความสะอาด และทายาฆ่าเชื้อบริเวณที่จะทำการเจาะใส่สายสวนหัวใจ
2. แพทย์ฉีดยาชาเฉพาะที่ก่อนทำการเจาะหลอดเลือดแดงที่บริเวณข้อมือ ข้อพับ หรือขาหนีบ โดยไม่วางยาสลบ
3. แพทย์ใส่ท่อพลาสติกก่อนชนิดพิเศษขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม. ไปตามแนวหลอดเลือดแดงจนถึงขั้วหัวใจ บริเวณจุดเริ่มต้นหลอดเลือดหัวใจ (หลอดเลือดแดงโคโรนารี) ด้านซ้ายหรือขวา โดยผู้รับการตรวจจะรู้สึกตัวตลอดเวลา แต่จะไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใด
4. แพทย์ฉีดสารทึบรังสีซึ่งเป็นสารละลายไอโอดีนผ่านสายสวนไปตามหลอดเลือดหัวใจ
5. แพทย์ทำการถ่ายภาพเอกซเรย์สภาพช่องทางเดินหลอดเลือดหัวใจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เห็นสภาพภายในหลอดเลือดหัวใจอย่างละเอียด เพื่อตรวจดูตำแหน่งหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน โดยจะใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที
6. ในกรณีที่แพทย์พบหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน แพทย์จะพิจารณาทำการรักษาทันที ด้วย **วิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวดถ่างขยาย** ด้วยเทคนิคการทำให้บอลลูนขยายตัวออก เพื่อดันให้ไขมันหรือหินปูนสะสมแนบชิดติดกับผนังหลอดเลือด ช่วยขยายทางเดินหลอดเลือดหัวใจออกให้กว้างขึ้น และช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ขดลวดถ่างขยายยังช่วยตรึงให้ไขมันหรือหินปูนยึดติดกับผนังหลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา และช่วยลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรักษาค่าใช้จ่ายประมาณ 45-60 นาที
7. เมื่อการรักษาแล้วเสร็จ แพทย์จะค่อยๆ ดึงสายสวนกลับออกมาและกดบริเวณแผลประมาณ 15 นาที เพื่อห้ามเลือด ทั้งนี้ แพทย์และพยาบาลจะคอยสอบถามอาการและวัดสัญญาณชีพเป็นระยะเพื่อประเมินอาการ

****ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น**** บริเวณที่ทำการสวนหลอดเลือด เช่น เจ็บปวดบริเวณที่ทำการสวนหลอดเลือด การติดเชื้อ เลือดออก หรือมีจ้ำเลือด อาจเกิดผื่นขึ้นตามร่างกาย แพ้สารทึบรังสี ไตวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวายเฉียบพลัน หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต (0.2%) หรืออาจเสียชีวิต (0.1%) อาจต้องมีการผ่าตัดฉุกเฉิน ซึ่งมีโอกาสเกิดได้น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยมีทีมแพทย์พยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้อย่างครบถ้วน และทันทั่วทั้งที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

4. ขั้นตอนหลังการฉีดสีสวนหัวใจ

ผู้ป่วยจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจ อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงวันในการพักฟื้นขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคน

ผู้ให้ข้อมูล.....ตำแหน่ง.....หน่วยงาน.....
ผู้รับข้อมูล.....เกี่ยวข้องเป็น.....ของ.....