

การให้ข้อมูลก่อนการให้ยาละลายลิ่มเลือด (fibrinolytic drug)

จากการตรวจร่างกาย, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจแล้ว ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน หากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วจะสามารถเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้ ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ถึง 35% หากไม่รักษา ซึ่งขณะนี้การรักษาที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่ง โอกาสเปิดหลอดเลือดสำเร็จมากกว่า 60 - 70%

ผลข้างเคียงจากการได้รับยา ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น

1. เลือดออกรุนแรงน้อยกว่า 1% (สมอง)
2. ความดันโลหิตต่ำจากยา 10-20 %
3. แพ้ยา 1-2%
4. อาจมีเลือดออกในระบบต่างๆ ได้ เช่น อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด

ข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือดโดยเด็ดขาด (Contraindication)

1. มีประวัติเลือดออกในสมอง (hemorrhagic stroke)
2. มีประวัติสมองขาดเลือด (ischemic stroke) ภายใน 6 เดือน
3. ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเคยผ่าตัดใหญ่ภายใน 1 เดือน
4. เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร หรือในช่องท้อง ภายใน 6 สัปดาห์
5. สงสัยว่าอาจมี aortic dissection
6. ได้รับการเจาะในตำแหน่งที่ไม่สามารถกดหยุดเลือดได้ภายใน 24 ชั่วโมง เช่น การเจาะขึ้นเนื้อตับ การเจาะตรวจน้ำไขสันหลัง เป็นต้น
7. ห้ามให้ SK ซ้ำในกรณีที่เคยได้ SK มาก่อน

โรคหรือภาวะที่ไม่ควรให้ยาละลายลิ่มเลือดโดยเด็ดขาด (Relative contraindication)

1. มีประวัติเป็น transient ischemic attack (TIA) ภายใน 6 เดือน
2. ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant therapy) เช่น warfarin, apixaban, edoxaban, dabigatran, enoxaparin, heparin
3. ได้รับการช่วยกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) นาน >10 นาที
4. มีความดันโลหิตสูงมากกว่า 180/110 มม.ปรอท (แม้จะได้รับยาลดความดันโลหิตอย่างเหมาะสมแล้ว)
5. มีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ (infective endocarditis)
6. ผู้ป่วยตั้งครรภ์

ผู้ให้ข้อมูล.....ตำแหน่ง.....หน่วยงาน.....
ผู้รับข้อมูล.....เกี่ยวข้องเป็น.....ของ.....