



หนังสือแสดงความยินยอมอนุญาต ยอมรับบริการวิสัญญีขณะผ่าตัดหรือทำหัตถการ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว อายุ.....ปี

☐ ผู้ป่วย ☐ ผู้แทนโดยชอบธรรม มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับฐานะ.....ผู้ป่วย

☐ บัตรประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง ☐ อื่นๆ เลขที่.....

โปรดแสดงเหตุผลที่ผู้ป่วยไม่สามารถลงนามยินยอมเพื่อรับการรักษาด้วยตนเองได้

☐ ผู้ป่วยอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยสถานภาพสมรส

☐ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต (ระบุ).....

☐ อื่นๆ (ระบุ).....

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงความจำเป็นในการรับบริการวิสัญญีโดยการระงับความรู้สึกเพื่อทำผ่าตัดหรือทำหัตถการและยินยอมโดยสมัครใจให้วิสัญญีแพทย์/ทีมวิสัญญีสามารถดำเนินการตามขั้นตอน และมีการอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการระงับความรู้สึก ความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน รวมถึงภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นถึงแม้จะเกิดขึ้นได้ยากจากการระงับความรู้สึกแต่ละประเภท ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ไม่สามารถคาดการณ์แม้ทำการป้องกันอย่างดีแล้วได้ เช่น การติดเชื้อ การเสียเลือด ปฏิกริยาการแพ้ยา ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน การสูญเสียความรู้สึกชั่วคราว การสูญเสียการมองเห็นชั่วคราว การบาดเจ็บของเส้นประสาท อัมพาต หลอดเลือดสมองแตกหรือสมองขาดเลือด หัวใจวายหรือเสียชีวิต ข้าพเจ้าเข้าใจว่าความเสี่ยงเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับการระงับความรู้สึกทุกประเภท ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าประเภทของการระงับความรู้สึกที่ใช้สำหรับการผ่าตัด/ทำหัตถการ เทคนิคการระงับความรู้สึกที่จะใช้นั้นพิจารณาจากหลายปัจจัยรวมถึงสภาพร่างกายของข้าพเจ้า ประเภทของการผ่าตัด/หัตถการของศัลยแพทย์โดยจะมีการเฝ้าระวังตลอดการระงับความรู้สึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ข้าพเจ้าได้รับคำอธิบายและรับทราบรายละเอียดจากวิสัญญีแพทย์ในการรับบริการวิสัญญีโดยระงับความรู้สึกและ/หรือระงับปวดเพื่อทำผ่าตัดหรือทำหัตถการคือ ☐ General anesthesia ☐ Regional anesthesia ☐ Total intravenous anesthesia ☐ Monitor anesthesia care

☐ อื่นๆ

ข้าพเจ้าเข้าใจว่ากรณีฉุกเฉินอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนการระงับความรู้สึกตามวิจรรย์ญาณของวิสัญญีแพทย์

ในบางกรณีอาจมีการให้ระงับความรู้สึกแบบทั่วไปไปรวมกับการให้ระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วนเพื่อหวังผลระงับปวดหลังการผ่าตัดชนิดของการระงับความรู้สึก

การให้ระงับความรู้สึกแบบทั่วไป (GA)	ข้อดี	สามารถทำผ่าตัดได้สะดวก รวดเร็ว ควบคุมการระงับความรู้สึกได้ดี ผู้ป่วยหลับ ไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างผ่าตัดได้ ใช้ได้กับการผ่าตัดที่นาน ควบคุมความดันโลหิตไม่ให้ต่ำได้ดีกว่า
	ข้อจำกัด	ผู้ป่วยได้รับยาหลายชนิดทำให้อาจได้รับผลข้างเคียงจากยาหลายตัว ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของสมอง ตับ ไต อาจฟื้นจากการระงับความรู้สึกช้า การควบคุมอาการเจ็บปวดหลังการผ่าตัดได้ไม่ดีเท่าการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน
	ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด	คลื่นไส้ อาเจียน หนาวสั่น คอแห้ง เจ็บคอ เสียงแหบ บาดเจ็บในช่องปาก/ปาก/ฟัน เช่น ฟันโยก คลอน/ฟันหัก ใส่ท่อช่วยหายใจยาก ทางเดินหายใจอุดกั้น หอบหืดโดยเฉพาะในรายที่มีประวัติโรคหอบหรือสูบบุหรี่ สำลักอาหารหรือสิ่งแปลกปลอม กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาการสับสน วุ่นวายในผู้สูงอายุหรือมีโรคสมอง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(เคยเป็นใน 6 เดือน) รู้สึกตัวหรือได้ยินเสียงระหว่างได้รับยาสลบ(ในรายที่กังวลมาก หรือรับประทานยาระงับประสาทบ่อย) ภาวะแพ้ยา ภาวะโคม่า/โรคหลอดเลือดสมอง/ชัก ภาวะหัวใจหยุดเต้น เสียชีวิต
การให้ระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำทั้งหมด (Total intravenous anesthesia : TIVA)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ช่วยลดความกังวล ลดความปวด และไม่สามารถจำเหตุการณ์ หรือ จำเหตุการณ์ระหว่างผ่าตัดได้บางส่วน
	ความเสี่ยง	การหายใจถูกกด หยุดหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือดถูกกด ภาวะสำลัก ปอดอักเสบ ภาวะหัวใจหยุดเต้น

Sticker Patient



Page



หนังสือแสดงความยินยอมอนุญาต ยอมรับบริการวิสัญญีขณะผ่าตัดหรือทำหัตถการ

การเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยบุคลากรทางวิสัญญี (Monitored anesthesia care : MAC)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ติดตามวัดสัญญาณชีพต่อเนื่องขณะทำการผ่าตัด/หัตถการ
	ความเสี่ยง	ความรู้สึกตัว ความวิตกกังวลและ/หรือภาวะไม่สุขสบาย
การให้ยาระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วน (RA)	ข้อดี	ควบคุมอาการปวดหลังผ่าตัดได้ดีกว่าการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ควบคุมระบบหายใจน้อย เพิ่มความผูกพัน ความรัก ระหว่างมารดาและบุตรในกรณีผ่าตัดคลอด สามารถประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยได้
	ข้อจำกัด	ผู้ป่วยอาจมีความวิตกกังวล การฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังอาจทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำได้ ยาชาแต่ละชนิดมีระยะเวลาออกฤทธิ์นานไม่เท่ากัน อาจหมดฤทธิ์ก่อนเสร็จการผ่าตัดในกรณีที่เติมยาชาไม่ได้ ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ยาแก้ปวดที่ผสมในยาชาอาจทำให้เกิดอาการคัน คลื่นไส้อาเจียน หรือกดการหายใจได้
	ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด	การฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง หรือช่องเหนือเยื่อหุ้มไขสันหลัง : ภาวะความดันโลหิตต่ำ ปัสสาวะคั่งหลังผ่าตัด คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ปวดเมื่อยหลังในช่วงสัปดาห์แรก ภาวะหัวใจหยุดเต้น การฉีดยาชาเข้ากลุ่มเส้นประสาทส่วนปลาย : การชาไม่สมบูรณ์ ฉีดยาเข้าสู่เส้นเลือดข้างเคียง มีภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด การบาดเจ็บต่อเส้นประสาทที่ฉีดยาชาซึ่งอาจทำให้มีอาการชาบางส่วนของอวัยวะที่เส้นประสาทนั้นไปเลี้ยงชั่วคราวหรือถาวร

ผลที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังการระงับความรู้สึก

- ภาวะแทรกซ้อน/ผลข้างเคียง ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนการเซ็นยินยอม แปรตามชนิดของการให้ยาระงับความรู้สึกดังที่ได้อธิบายไว้เบื้องต้น
- ความสามารถในการรับรู้ และตัดสินใจลดลงชั่วคราวจึงต้องการขบขันยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจในการรับบริการระงับความรู้สึกเพื่อทำผ่าตัด/ทำหัตถการ ในขณะที่ข้าพเจ้าได้รับยาระงับความรู้สึกในครั้งนี้ กรณีเกิดภาวะวิกฤติกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ คณะแพทย์ พยาบาล ดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หากข้าพเจ้าไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยตนเอง ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (ชื่อ-สกุล)หมายเลขโทรศัพท์.....

ซึ่งเป็น ☐ สามี ☐ ภรรยา ☐ บิดา ☐ มารดา ☐ บุตร ☐ ผู้แทนโดยชอบธรรม ☐ อื่นๆ ระบุของข้าพเจ้า

เป็นผู้รับข้อมูลการตรวจรักษา อาการและอาการเปลี่ยนแปลงของโรคและสื่อสารแทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าทราบว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันอบรมบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจจะเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแล ตรวจ วินิจฉัย และรักษาพยาบาล

ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยละเอียดจึงลงลายมือชื่อ หรือลงลายพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ

กรณีไม่สามารถเขียนหนังสือได้

ลายพิมพ์นิ้ว.....ข้าง.....
☐ ผู้ป่วย ☐ ผู้แทนโดยชอบธรรม

ลงชื่อ.....

☐ ผู้ป่วย ☐ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

วันที่.....เวลา.....

ลงชื่อ.....

☐ วิสัญญีแพทย์ ☐ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(.....)

วันที่.....เวลา.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....เวลา.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

วันที่.....เวลา.....

Sticker Patient



Page