

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อสามัญและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แนวทางการประเมินสัญญาณเตือนภาวะวิกฤติ (Modified Early Warning Sign)

☐ post- op/ Intervention 24 Hr. แรก ☐ มีโรคประจำตัว 2 โรคขึ้นไป ระบุ ..DM , HT , DLP , Asthma , COPD , CKD , heart

☐ อายุ 60 ปีขึ้นไป ☐ มีภาวะ acute infectious disease ☐ รับย้ายจาก ICU ใน 24 ชั่วโมงแรก

symptom	3	2	1	0	1	2	3	วันที่.....					
								น.	น.	น.	น.	น.	น.
Respiratory rate/ bpm.		≤ 8		9-14	15-20	21-29	≥30						
Heart rate/ bpm.		≤40	40-50	51-100	101-110	111-129	≥130						
Systolic BP (mmHg)	≤70	71-80	81-100	101-199		≥200							
Conscious		Confuse		Alert	Responds to voice	Responds to pain	ไม่ตอบสนอง						
Oxygen sat (ขณะให้ Oxygen)	< 90 %	91-93 %		94-100 %									
Temperature (C°)		≤35	35.1-36	36.1-38	38.1 - 38.5	≥38.6							
Urine output	≤30 cc/hr												
total													

แนวทางการพยาบาล

Total score	Nursing care	Nursing care
0-2	1.	สังเกตอาการอย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง
3	2	สังเกตอาการอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ติดต่อกัน 3 ครั้ง
	3	ถ้า MEWS score เท่ากับ 3 ติดต่อกัน 3 ครั้งรายงานหัวหน้าเวร ให้หัวหน้าเวรพิจารณาการพยาบาลตามความเหมาะสม
4	4	รายงานพยาบาลหัวหน้าเวร และรายงานแพทย์ 1 st. call มาประเมินอาการ
	5	พิจารณาปรึกษา 2° call / แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
		สังเกตอาการอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ติดต่อกัน 3 ครั้ง
	6	ถ้า MEWS score เท่ากับ 4 ติดต่อกัน 3 ครั้งรายงานพยาบาลหัวหน้าเวร
	7	เพิ่มการบันทึกปริมาณน้ำเข้า-ออกให้ถี่เป็นทุก 4 ชั่วโมง ถ้าน้อยกว่า 100 ใน 4 ชั่วโมง
	8	พิจารณาย้ายผู้ป่วยมาใกล้ nurse station
5-6	9	รายงานพยาบาลหัวหน้าเวรเพื่อประเมิน MEWS ซ้ำ และรายงานแพทย์เพื่อประเมินอาการ
	10	พยาบาลรีบขอความช่วยเหลือจากทีมการดูแล เพื่อเตรียมรถ Emergency
	11	เพิ่มความถี่ในการสังเกตอาการทุก 1 ชั่วโมง ติดต่อกัน 3 ครั้ง
	12	พิจารณาย้ายหอผู้ป่วยวิกฤติ/เฉพาะทาง
≥6	13	รายงานแพทย์ทันที
	14	พิจารณาย้ายหอผู้ป่วยวิกฤติ