

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR AMPLIA

Producto	Sitagliptina 100 mg, tableta
Trámite	TR-2026-032 · COFEPRIS-04-004-B
Fecha de emisión	9 de septiembre de 2026
Sección CTD	1.4.2 – Información para prescribir amplia (IPPA)

1. Denominación distintiva

No aplica (medicamento genérico).

2. Denominación genérica

Sitagliptina

3. Forma farmacéutica y formulación

Tableta. Cada tableta contiene: Fosfato de sitagliptina monohidratado equivalente a 100 mg de sitagliptina. Excipiente cbp.

4. Indicaciones terapéuticas

Coadyuvante de la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2.

5. Farmacocinética y farmacodinamia

Clase terapéutica: Inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4). Tiempo al pico de concentración: 1.0 – 4.0 h. Vida media de eliminación aproximada: 12.4 h. La información farmacocinética corresponde a la del medicamento de referencia y a la obtenida en el estudio de intercambiabilidad del expediente.

6. Contraindicaciones

Hipersensibilidad a la sitagliptina o a cualquiera de los excipientes. No debe usarse en diabetes tipo 1 ni en cetoacidosis diabética.

7. Precauciones generales

Vigilar la función renal y hepática antes y durante el tratamiento. Suspender ante signos de reacción de hipersensibilidad grave y valorar alternativas terapéuticas.

8. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia

No se recomienda su uso durante el embarazo ni la lactancia, salvo que el beneficio potencial justifique el riesgo, a juicio del médico.

9. Reacciones secundarias y adversas

Infección de vías respiratorias altas, nasofaringitis, cefalea; casos poco frecuentes de pancreatitis aguda y reacciones de hipersensibilidad.

10. Interacciones medicamentosas

Pueden presentarse interacciones con medicamentos que modifiquen su metabolismo o su eliminación renal. Consultar la información del medicamento de referencia.

11. Dosis y vía de administración

100 mg una vez al día, con o sin alimentos. Ajustar la dosis en insuficiencia renal moderada a grave. Vía de administración: oral.

12. Manifestaciones y manejo de la sobredosificación

Instaurar medidas generales de soporte y vigilancia clínica. No se conoce antídoto específico.

13. Presentaciones

Caja con 28 tabletas

14. Recomendaciones de almacenamiento

Consérvese a no más de 30 °C. Consérvese la caja bien cerrada.


15. Leyendas de protección

Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

16. Nombre y domicilio del laboratorio

Laboratorios Altamira, S.A. de C.V.. Av. de los Laboratorios No. 1200, Parque Industrial Santa Clara, Toluca, Estado de México, C.P. 50071.

Aprobaciones




Elaboró

Antonio Cardenas Alba

Especialista de Asuntos Regulatorios

Fecha: 09/09/2026



Revisión médica

Gonzalo de la Cruz Reyna

Gerente Médico

Fecha: 09/09/2026