

all strains, wk1
R^2: 0.01, p = 9.3e-02
$\log_{10}(FC_{2,1})$
$\frac{[\text{effector}]}{[\text{Treg}]}$
top 20% within clusters, wk1
R^2: 0.56, p = 8.9e-11
$\log_{10}(FC_{2,1})$
$\frac{[\text{effector}]}{[\text{Treg}]}$
strains $\geq \varepsilon \times$ cluster max
slope:
$\log_{10}(FC_{2,1}) = m\log_{10}\left(\frac{[\text{effector}]}{[\text{Treg}]}\right) + b$
within-cluster cut-off parameter, ε
strains $\geq \varepsilon \times$ cluster max
R^2:
$\log_{10}(FC_{2,1}) = m\log_{10}\left(\frac{[\text{effector}]}{[\text{Treg}]}\right) + b$
within-cluster cut-off parameter, ε
strains $\geq$ cut-off
slope:
$\log_{10}(FC_{2,1}) = m\log_{10}\left(\frac{[\text{effector}]}{[\text{Treg}]}\right) + b$
relative abundance cut-off
strains $\geq$ cut-off
R^2:
$\log_{10}(FC_{2,1}) = m\log_{10}\left(\frac{[\text{effector}]}{[\text{Treg}]}\right) + b$
relative abundance cut-off