


神経線維


- 末梢神経：シュワン細胞が髄鞘をつくる
- 中枢神経：オリゴデンドロサイトが髄鞘をつくる



1. 伝導速度による分類 (速い順)

分類 (順位)	伝導する情報	主な神経線維
$A\alpha$ 1位	体性運動神経、筋紡錘の一次終末 (らせん型終末)	運動神経
$A\beta$ 2位	触・圧受容器、筋紡錘の二次終末 (散形終末)	知覚神経
$A\gamma$ 3位	筋紡錘への錘運動神経	運動神経
$A\delta$ 4位	侵害受容器 (1次痛)、冷受容器 (温受容器はない)	知覚神経
B 5位	自律神経節前線維 (節後線維あり)	自律神経
C 6位	自律神経節後線維、侵害受容器 (2次痛)、温受容器、冷受容器	自律神経・知覚神経

速い




遅い


2. 直径による分類 (太い順)

分類	伝導情報	該当
Ia	筋紡錘の一次終末	$A\alpha$
Ib	腱器官	$A\alpha$
II	筋紡錘の二次終末、触・圧覚受容器	$A\beta$
III	侵害受容器・冷受容器	$A\delta$
IV	侵害受容器	C

太い(速い)



細い(遅い)



3. 書く分類まとめ

	A (有髄)				B (有髄) (自律神経)	C (無髄) (自律神経)
	α	β	γ	δ		
運動神経	$A\alpha$ (1位)	$A\beta$ (2位)	$A\gamma$ (3位)	$A\delta$ (4位)	B (5位)	C (6位)
知覚神経	Ia, Ib	II	—	III	IV	IV

ルールで覚えよう!

★ 太くて有髄 → 速い ($A\alpha$ が最速) 細くて無髄 → 遅い (C が最遅)