

## VI. osztály

Összeállította és szerkesztette: Polcz Zita

### 1) Tétel

Négy különböző prímszám összege 33.

- Igazold, hogy a szorzatuk páros szám!
- Keress négy ilyen prímszámot, ha szorzatuk osztható az összegükkel!
- Mennyi lehet négy ilyen prímszám szorzatának legkisebb és legnagyobb értéke?

### 2) Tétel

- Egy négyjegyű természetes szám utolsó számjegye 7. Ha a 7-es számjegyet az egyes helyi értékről áthelyezzük az ezres helyi értékre, akkor a kapott szám 2826-tal nagyobb, mint az eredeti szám. Mennyi a számjegyek összege a kapott számban?
- Határozd meg az  $5^{5^n}$  szám 13-mal való osztási maradékát! ( $n \in \mathbb{N}$ )

### 3) Tétel

Adott az  $AOB$  hegyesszög.  $[OC$  és  $[OD$  olyan félegyenesek, amelyekre  $[OC \perp [OA$  és  $[OD \perp [OB$  úgy, hogy az  $\widehat{AOC}$  és  $\widehat{BOD}$  belső tartományának nincs közös pontja.

- Igazold, hogy az  $\widehat{AOB}$  és  $\widehat{COD}$  kiegészítő szögek!
- Ha  $[OM$  az  $\widehat{AOB}$  szögfelezője,  $[ON$  pedig a  $\widehat{COD}$  szögfelezője, akkor az  $M$ ,  $O$  és  $N$  kollineáris pontok.
- Legyen  $[OP$  az  $\widehat{BOC}$  szögfelezője. Igazold, hogy az  $\widehat{NOP}$  mértéke állandó, függetlenül az  $\widehat{AOB}$  mértékétől!

Minden helyes megoldásért 10 pont jár.  
Munkaidő 2 óra.  
Feladatonként egy pont jár hivatalból.

2016 EMKV

6. Meglepetés, 25 p  
Egy ilyen úton történt, hogy  
ért, a fiút becsapott ezen az  
- Itt van olyan ember,  
szálljon le a következő megá  
Az első két megállónál  
néhányan felálltak és leszállt  
Megjegyzés: Az utasok  
látják, de a többiekét igen.

atlap 2016/3  
a vonatokat.  
az alagútba  
az arca, az  
adikhoz érve  
arcukat nem

ERDÉLYI MAGYAR ÁLTALÁNOS ISKOLÁK MATEMATIKAVERSENYE  
Szatmár megye, 2016. január 22.

V. osztály

Szerkesztette és összeállította: Koczinger Éva

1. a) Oldd meg az egyenletet:  $10^3 : \{26 + 2[4^3 + 12^2 : (15 - 3x)]\} = 4$ .
- b) Határozd meg az  $a, b, c$  számjegyeket, melyekre  $\overline{abba} + \overline{abab} + c = 2016$ .
2. a) Benő ebben az évben ünnepli a 12. születésnapját. Amikor a testvére, Anna annyi éves lesz, mint Benő most, akkor együtt 27 évesek lesznek. Melyik évben született Anna?
- b) Határozd meg azokat a nullától különböző természetes számokat, amelyeket 15-tel, illetve 12-vel osztva, hányadosul  $a$  és  $b$  számjegyet kapunk, maradékul pedig 9-et, illetve 6-ot.
3. Tekintsük a következő sorozatot:

$\square$ ,  $\begin{matrix} \square & \square \\ \square & \end{matrix}$ ,  $\begin{matrix} \square & \square & \square \\ \square & \square & \end{matrix}$ ,  $\begin{matrix} \square & \square & \square & \square \\ \square & \square & \square & \end{matrix}$ , ...

- a) Folytasd a sorozatot a következő két taggal!
- b) Hány kis négyzetből áll a 63. tag?
- c) Hányadik az a tag, amelyik 231 kis négyzetből áll?
4. Egy képernyőn kezdetben a 27-es szám jelenik meg, majd 1 perc után mindig a szám számjegyeinek a szorzatánál 23-mal nagyobb szám jelenik meg. Hányas szám lesz a képernyőn 1 óra múlva? Az 1 óra alatt hányszor jelenik meg a képernyőn a 3-as számjegy?

Megoldások

1. a) Az egyenlet rendre így alakítható:  $26 + 2[4^3 + 12^2 : (15 - 3x)] = 1000 : 4 \Leftrightarrow 2[64 + 144 : (15 - 3x)] = 224 \Leftrightarrow 64 + 144 : (15 - 3x) = 112 \Leftrightarrow 144 : (15 - 3x) = 48 \Leftrightarrow 15 - 3x = 3 \Leftrightarrow x = 4$ .
- b) A feladat alapján  $a \leq 1$ ,  $a \neq 0$ , tehát  $a = 1$ .  
Az adott egyenlet egyenértékű a következővel:  $\overline{b1b} + \overline{bb1} + c = 16$ , ahonnan  $b = 0$ ,  $c = 5$ .



2. a) Amikor Anna 12 éves lesz, akkor kettőjük életkorának összege 27, ami 3-mal több, mint 24, tehát Benő 3 évvel idősebb. Ezért Anna idén 9 éves, tehát 2007-ben született.


b) A maradékos osztás tételét alkalmazva, az  $n$  szám  $15a + 9$ , illetve  $12b + 6$  alakú, ahol  $a$  és  $b$  számjegyek.

Az első esetben  $n$  lehetséges értékei:  $15 \cdot 1 + 9 = 24$ ,  $15 \cdot 2 + 9 = 39$ , 54, 69, 84, 99, 114, 129, 154.


A második esetben  $n$  értékei:  $12 \cdot 1 + 6 = 18$ ,  $12 \cdot 2 + 6 = 30$ , 42, 54, 66, 78, 90, 102, 114.

Tehát  $n$  értékei: 54 és 114.

3. a) A következő két tag:



és



b) Az 1. tag 1, a 2. tag  $1 + 2 = 3$ , a 3. tag  $1 + 2 + 3 = 6$ , a 63. tag  $1 + 2 + 3 + \dots + 63 = \frac{63 \cdot 64}{2} = 2016$  kis négyzetből áll.

c) Az  $n$ . tag  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} = 231 \iff n(n+1) = 462 = 21 \cdot 22$ , tehát  $n = 21$ .

4. Az 1. percben a **27** jelenik meg, a 2. percben  $14 + 23 = \mathbf{37}$ , a 3. percben  $21 + 23 = \mathbf{44}$ , a 4. percben  $16 + 23 = \mathbf{39}$ , az 5. percben  $27 + 23 = \mathbf{50}$ , a 6. percben  $0 + 23 = \mathbf{23}$ , a 7. percben  $6 + 23 = \mathbf{29}$ , a 8. percben  $18 + 23 = \mathbf{41}$ , a 9. percben  $4 + 23 = \mathbf{27}$  ismét.

A kapott nyolc szám ismétlődik nyolc percenként. Mivel 1 óra = 60 perc,  $60 = 8 \cdot 7 + 4$ , ezért a sorozat 4. száma, 39 lesz látható.

Nyolc perc alatt háromszor jelenik meg a 3-as. A számsorozat hétszer ismétlődik meg, és még megjelenik az első négy szám 27, 37, 44, 39. Összesen  $7 \cdot 3 + 2 = 23$ -szor jelenik meg a 3-as az első óra alatt.

## VI. osztály

Szerkesztette és összeállította: Polcz Zita

1. Végezzük el a következő műveleteket:

a)  $(2^{2016} - 2^{2015}) : 2^{2014} =$

b)  $\left[ 2, 1(6) + 1\frac{1}{2} : 0, (3) \right] \left( 2 - \frac{4}{5} \right)^2 - 9 \cdot 2016^0 =$

2. Két háromjegyű szám összege osztható 37-tel. Ha ezt a két számot egymás mellé írjuk, egy hatjegyű számot kapunk. Igazoljuk, hogy ez a hatjegyű szám is osztható 37-tel!

3. Adottak az  $A_1, A_2, \dots, A_{2016}$  pontok egy egyenesen úgy, hogy  $A_1A_2 = 2$  cm,  $A_2A_3 = 2^2$  cm,  $\dots$ ,  $A_{2015}A_{2016} = 2^{2015}$  cm.

a) Számítsuk ki az  $[A_1A_6]$  és  $A_1A_{2016}$  szakaszok hosszát!

b) Számítsuk ki az  $[A_8A_{28}]$  szakasz hosszát, és igazoljuk, hogy a kapott szám osztható 15-tel!

4. Az  $A, O$  és  $D$  pontok kollineárisak,  $O \in (AD)$ ,  $\widehat{AOB}$  és  $\widehat{BOC}$  egymás melletti szögek,  $(OC \in \text{Int}(\widehat{BOD}))$ ,  $m(\widehat{BOC}) = 5m(\widehat{AOB})$ ,  $3m(\widehat{BOC}) = 5m(\widehat{COD})$ ,  $\widehat{AOM} \equiv \widehat{MOC}$ ,  $OQ \perp OM$ , ahol  $Q \in \text{Int}(\widehat{MOD})$ .

a) Számítsuk ki az  $\widehat{AOB}$ ,  $\widehat{BOC}$  és  $\widehat{COD}$  mértékét!

b) Igazoljuk, hogy  $(OQ)$  szögfelezője a  $\widehat{COD}$ -nek!

## Megoldások

1. a)  $2^{2015}(2-1) : 2^{2014} = 2$ ,  
 b)  $\left(\frac{13}{6} + \frac{9}{2}\right) \cdot \frac{36}{25} - 9 = \frac{48}{5} - 9 = \frac{3}{5}$ .
2. Tudjuk, hogy  $37 \mid \overline{abc} + \overline{def}$ . Legyen  $A = \overline{abcdef}$ , akkor  $A = \overline{abcdef} = \overline{abc000} + \overline{def} = 1000 \cdot \overline{abc} + \overline{def} = 999 \cdot \overline{abc} + (\overline{abc} + \overline{def}) = 27 \cdot 37 \cdot \overline{abc} + (\overline{abc} + \overline{def})$ , ami osztható 37-tel.
3. a)  $A_1A_6 = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 = 2^6 - 2 = 62$  (cm),  
 $A_1A_{2016} = 2 + 2^2 + \dots + 2^{2015} = 2^{2016} - 2$  (cm).  
 b)  $A_8A_{28} = A_1A_{28} - A_1A_8 = (2^{28} - 2) - (2^8 - 2) = 2^{28} - 2^8 = 2^8(2^{20} - 1)$  (cm).  
 Mivel  $u(2^{28}) - u(2^8) = 0$ , ezért  $2^{28} - 2^8$  osztható 5-tel (1).  
 Továbbá  $A_8A_{28} = 2^8 + 2^9 + \dots + 2^{27} = 2^8(1 + 2) + 2^{10}(1 + 2) + \dots + 2^{26}(1 + 2) = 3(2^8 + 2^{10} + \dots + 2^{26})$ , ami osztható 3-mal (2).  
 Mivel  $(3, 5) = 1$ , ezért (1) és (2) alapján következik, hogy az  $[A_8A_{28}]$  szakasz hossza egy olyan természetes szám, amely osztható 15-tel.
4. a) Legyen  $m(\widehat{AOB}) = x$ . Ekkor  $m(\widehat{BOC}) = 5x$ ,  $m(\widehat{COD}) = 3x \Rightarrow x + 5x + 3x = 180^\circ \Rightarrow x = 20^\circ \Rightarrow m(\widehat{AOB}) = 20^\circ$ ,  $m(\widehat{BOC}) = 100^\circ$ ,  $m(\widehat{COD}) = 60^\circ$ .  
 b)  $m(\widehat{MOQ}) = 60^\circ \Rightarrow m(\widehat{COQ}) = 30^\circ$ ,  $m(\widehat{QOD}) = 30^\circ$ , tehát  $(OQ)$  szögfelező.

## VII. osztály

Szerkesztette és összeállította: Koczinger Éva

1. a) Számítsd ki:  $\left[ \left(-\frac{1}{3}\right)^3 \cdot (-3)^5 + \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \cdot (-2)^5 \right] : 13 =$   
 b) Igazold, hogy:  $|1 - \sqrt{2}| + |\sqrt{2} - \sqrt{3}| + \dots + |\sqrt{99} - \sqrt{100}| \in \mathbb{N}$ .  
 c) Határozd meg a  $|2016 - |x + 1|| = 1$  egyenlet megoldásainak összegét!  
 d) Egy téglalap alakú telket négyzet alakúvá egészítettünk (a lehető legkisebbre, az egyik oldala mentén). Ha a négyzet területe  $36 \text{ m}^2$ -rel nagyobb, mint az eredeti terület, határozd meg a téglalap méreteit, tudva, hogy azok természetes számok!
2. a) Ha  $a = 2 - \sqrt{3}$  és  $b = 2 + \sqrt{3}$ , számítsd ki a két szám számtani és mértani közepét, majd hasonlítsd össze a kapott eredményeket!  
 b) Igazold, hogy  $\sqrt{20} + \sqrt{30} < 10$ .  
 c) Igazold, hogy  $\sqrt{1 \cdot 2} + \sqrt{2 \cdot 3} + \dots + \sqrt{99 \cdot 100} < 5000$ .
3. Az  $ABCD$  trapézban  $AD = BC$ ,  $O$  az átlók metszéspontja. Ha  $m(\widehat{AOD}) = 120^\circ$ , és  $M, N, P$  az  $[OA]$ ,  $[OD]$ , illetve  $[BC]$  szakasz felezőpontja, igazold, hogy  $MNP$  háromszög egyenlő oldalú.
4. Az  $ABC$  háromszögben  $m(\widehat{B}) = 45^\circ$  és  $m(\widehat{C}) = 30^\circ$ . Legyenek  $A', B'$  és  $C'$  az  $A, B, C$  pontoknak a szemben fekvő oldalakra vonatkozó szimmetrikusai. Tudjuk, hogy  $BB' \cap CC' = \{P\}$ . Igazoljuk, hogy:  
 a) a  $P, A, A'$  pontok kollineárisak;  
 b) a  $B'BC$  háromszög egyenlő oldalú;  
 c)  $ABA'\Delta \equiv AB'C'\Delta$ .



# Megoldások

1. a)  $(3^2 + 2^2) : 13 = 1$ .

b)  $S = \sqrt{2} - 1 + \sqrt{3} - \sqrt{2} + \dots + \sqrt{100} - \sqrt{99} = 10 - 1 = 9 \in \mathbb{N}$ .

c) Az egyenlet egyenértékű a következővel:

$$2016 - |x + 1| = \pm 1 \iff |x + 1| = 2015 \text{ vagy } |x + 1| = 2017.$$

Ha  $|x + 1| = 2015$ , akkor  $x + 1 = 2015$  vagy  $x + 1 = -2015$ , ahonnan  $x_1 = 2014$  és  $x_2 = -2016$ . Ha  $|x + 1| = 2017$ , akkor  $x_3 = 2016$  és  $x_4 = -2018$ .

A megoldások összege  $2014 - 2016 + 2016 - 2018 = -4$ .

d) A téglalap méretei  $y < x$ , a téglalap területe  $xy$ , a négyzet területe  $x^2$ . Ekkor  $x^2 = 36 + xy \iff (x - y)x = 36$ , ahol  $x - y < x$ . Mivel  $36 = 1 \cdot 36 = 2 \cdot 18 = 3 \cdot 12 = 4 \cdot 9$ , a téglalap lehetséges méretei:  $(36, 35)$ ,  $(18, 16)$ ,  $(12, 9)$ ,  $(9, 5)$ .


2. a)  $m_a = \frac{a+b}{2} = 2$ ,  $m_g = \sqrt{ab} = 1$ ,  $m_a > m_g$ .

b) Alkalmazva a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenséget, kapjuk, hogy

$$\sqrt{20} < \frac{4+5}{2} = \frac{9}{2} \text{ és } \sqrt{30} < \frac{5+6}{2} = \frac{11}{2}, \text{ ahonnan } \sqrt{20} + \sqrt{30} < \frac{9}{2} + \frac{11}{2} = 10.$$

c) Hasonlóan a b) ponthoz:

$$\sqrt{1 \cdot 2} + \sqrt{2 \cdot 3} + \dots + \sqrt{99 \cdot 100} < \frac{3}{2} + \frac{5}{2} + \frac{7}{2} + \dots + \frac{199}{2} = \frac{(3+199) \cdot 99}{4} = \frac{101 \cdot 99}{2} = \frac{10000 - 1}{2} < 5000.$$



3. Legyen  $Q$  az  $[OB]$  felezőpontja. A feltevés alapján az  $OMQ$  háromszög egyenlő oldalú, így  $m(\widehat{MQO}) = 60^\circ$ , valamint  $QP \parallel OC$  (középvonal a  $BOC$  háromszögben), ezért  $m(\widehat{OQP}) = 60^\circ$ . Ekkor  $\widehat{PQM} \equiv \widehat{MON}$ .

$$\text{Továbbá } QM = OM = \frac{OA}{2} \text{ és } QP = ON = \frac{OD}{2}.$$

Tehát  $QMP\Delta \equiv OMN\Delta$  (1), így  $(MP) \equiv (MN)$ .

Az (1) alapján  $\widehat{QMP} \equiv \widehat{OMN} \Rightarrow m(\widehat{NMP}) = m(\widehat{OMQ}) = 60^\circ$ .


Tehát az  $MNP$  háromszög egyenlő szárú, és egyik szögének mértéke  $60^\circ$ , így a háromszög egyenlő oldalú.

4. a) A feladat alapján  $BB' \perp AC$ ,  $CC' \perp AB$  és  $BB' \cap CC' = \{P\}$ , tehát  $P$  az  $ABC$  háromszög magasságpontja. Mivel  $AA' \perp BC$  és a magasságok összefutó egyenesek, ezért az  $A$ ,  $A'$  és  $P$  pontok kollineárisak.

b) A  $CBB'$  háromszögben  $AC$  oldalfelező merőleges, ezért  $[B'C] \equiv [BC]$ , tehát a háromszög egyenlő szárú és  $m(\widehat{BCB'}) = 2 \cdot 30^\circ = 60^\circ$ , így  $B'BC$  egyenlő oldalú háromszög.

c) Tudjuk, hogy  $[AB'] \equiv [AB]$  és  $[C'A] \equiv [AC] \equiv [AA']$ .

$$\text{Továbbá } m(\widehat{B'AB}) = 2 \cdot 75^\circ = 150^\circ \text{ és } m(\widehat{C'AA'}) = 360^\circ - (m(\widehat{C'AC}) + m(\widehat{CAA'})) = 360^\circ - (150^\circ + 60^\circ) = 150^\circ \Rightarrow$$





$$\Rightarrow m(\widehat{C'AB}) = m(\widehat{C'AA'}) - m(\widehat{BAA'}) = 150^\circ - 45^\circ = 105^\circ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m(\widehat{B'AC'}) = m(\widehat{B'AB}) - m(\widehat{C'AB}) = 150^\circ - 105^\circ = 45^\circ = m(\widehat{BAA'}).$$

Tehát  $ABA'\Delta \equiv AB'C'\Delta$ .

## VIII. osztály

Szerkesztette és összeállította: Polcz Zita

1. Igazold, hogy az  $n = 2009^3 + 2010^3 + 2011^3 + 2012^3 + 2013^3 + 2014^3 + 2015^3 + 2016^3$  szám osztható 161-gyel!

2. a) Oldd meg a valós számok halmazán az  $5(2x^2 + y^2) + 6y(2x + 1) = 4x - 13$  egyenletet!

b) Igazold, hogy  $(x + 2)(2y + 3)(3z + 4) \geq 96\sqrt{xyz}$ , bármely  $x, y, z \in \mathbb{R}_+$  esetén!

3. Az  $ABCD$  téglalap síkjára a  $D$  pontban egy  $MD$  merőlegest emelünk. Legyen  $N$  az  $[MB]$ ,  $P$  pedig az  $[MC]$  felezőpontja. Igazold, hogy:

a) az  $NDC$  háromszög egyenlő szárú;

b) az  $AM$  egyenes párhuzamos a  $(BPD)$  síkkal.

4. Az  $ABCD A'B'C'D'$  kockában  $M$  az  $[AB]$ ,  $N$  pedig a  $[B'C]$  felezőpontja. Igazold, hogy az  $MN$  egyenes

a) párhuzamos a  $(DAB')$  síkkal;

b) merőleges a  $(CB'D')$  síkra.

## Megoldások

1. Ismert az  $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$  képlet, ahonnan  $(a^3 + b^3) : (a + b)$ . Tehát

$A = (2009^3 + 2016^3) : (2009 + 2016) \Rightarrow A : 4025 \Rightarrow A : (161 \cdot 25) \Rightarrow A : 161$ . Hasonlóan

$B = (2010^3 + 2015^3) : (2010 + 2015) \Rightarrow B : 4025 \Rightarrow B : (161 \cdot 25) \Rightarrow B : 161$ ,

$C = (2011^3 + 2014^3) : 161$  és  $D = (2012^3 + 2013^3) : 161$ .

Ekkor  $n = 2009^3 + 2010^3 + 2011^3 + 2012^3 + 2013^3 + 2014^3 + 2015^3 + 2016^3 = A + B + C + D$ .

Tehát  $n : 161$ .

2. a) Az egyenlet egyenértékű a következő egyenlettel:

$$(x - 2)^2 + (3x + 2y)^2 + (y + 3)^2 = 0 \iff x = 2 \text{ és } y = -3.$$

b) Mivel  $x, y, z \in \mathbb{R}_+$  és  $m_a \geq m_g$ , ezért

$$(x + 2) \geq 2\sqrt{2x}, \quad (2y + 3) \geq 2\sqrt{6y}, \quad (3z + 4) \geq 2\sqrt{12z}.$$


A három egyenlőtlenségből következik, hogy  $(x + 2)(2y + 3)(3z + 4) \geq 8\sqrt{144xyz} = 96\sqrt{xyz}$ .

3. a) Az  $MDB$  derékszögű háromszögben  $(DN)$  az átfogóhoz tartozó oldalfelező, így  $DN = \frac{BM}{2}$ . Hasonlóan


az  $MCB$  derékszögű háromszögben  $CN = \frac{BM}{2}$ . Tehát

az  $NDC$  háromszög egyenlő szárú,  $(DN) \equiv (CN)$ .

b) Legyen  $AC \cap BD = \{O\}$ . A  $CAM$  háromszögben  $P$  az  $(MC)$ ,  $O$  pedig az  $(AC)$  oldal felezőpontja, ezért  $(PO)$  középvonal, tehát  $PO \parallel AM$ . De  $PO \subset (BPD)$ , így  $AM \parallel (BPD)$ .







4. a) Legyen  $CM \cap DA = \{P\}$ .

Ekkor  $PAM\Delta \equiv CBM\Delta$ , ahonnan  $(PM) \equiv (CM)$ .

A  $CPB'$  háromszögben  $(MN)$  középvonal, így  $MN \parallel PB'$ , de  $PB' \subset (DAB')$ , ezért  $MN \parallel (DAB')$ .

b) Az  $MB'C$  háromszög egyenlő szárú,  $(MB') \equiv (MC)$ ,  $N$  a  $B'C$  felezőpontja, ezért  $MN$  magasság is az  $MB'C$  háromszögben. Ebből következik, hogy  $MN \perp B'C$  (1).

A kocka élhossza  $a$ , akkor  $MN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ ,  $D'N = \frac{a\sqrt{6}}{2}$ ,

$$D'M = \frac{3a}{2}.$$

A  $D'MN$  háromszögben  $D'M^2 = D'N^2 + MN^2$ , így Pitagorász tételének fordított tétele alapján a háromszög derékszögű,  $MN \perp D'N$  (2).

Az (1) és (2) merőlegességek alapján  $MN \perp (CB'D')$ .

## Műhelysarok

### CSUKLÓS NÉGYSZÖGEK

Olosz Ferenc tanár, Szatmárnémeti

Tanulmányozva Reiman István könyvét ([2].), felfigyeltem a csuklós sokszögekre, és ott olyan tulajdonságokra is leltem, amelyek IX. osztályban, mint feladatok, jól hasznosíthatók.

Abból indulunk ki, hogy a síkmértanban egyedüli merev sokszög a háromszög. Ez azt jelenti, hogy ha adott három olyan szakasz, amelyeknél bármelyik kisebb a másik kettő összegénél, akkor az ezekből alkotható háromszögek kongruensek egymással (ha megadjuk e szakaszok összerakási sorrendjét, akkor egy és csak egy háromszög építhető). A háromszögekkel történő merevítésre az általános iskolai tankönyvek is adnak példát (hidak, fém tartógerendák, kertkapuk). A tanár felhívhatja arra is a figyelmet, hogy napjainkban az építészetben elterjedt az acélból vagy vasbetonból készült diagrid (diagonal grid rövidítése) szerkezetek használata. E sajátos elrendezésű háromszög alakzatok elsősorban a külső felszínen biztosítják az épületek stabilitását, s ezáltal jelentős belső terek szabadulnak fel, s maga a szerkezet látványa is esztétikai élményt nyújt. Példaként a New York-i Hearst Tower felhőkarcolót említhetjük, de az interneten a diagrid címszónál számos ilyen épület és tetőszerkezet képe megtekinthető.

A háromnál többoldalú sokszögeknél az oldalak és azok sorrendje már nem határozza meg egyértelműen a sokszöget. Ez azt jelenti, hogy ha négy vagy több adott hosszúságú szakaszt adott sorrendben csuklókkal rögzítjük egymáshoz, akkor az oldalak csuklók körüli forgatásával változtathatjuk a sokszöget. A csuklós sokszög létezésének az a feltétele, hogy bármely oldal kisebb legyen, mint a többi oldal összege.

*Ha egy csuklós négyszög egy helyzetében paralelogramma, akkor minden helyzetében az.*

Ez azzal igazolható, hogy a paralelogramma szemben fekvő oldalai kongruensek és az oldalak csuklók körüli forgatása során azok hossza nem változik, így a négyszögben a szemköztí oldalak kongruensek maradnak, tehát a négyszög megmarad paralelogrammának.