



## Esercizi per l'esame di MSSC

Anno Accademico 2015/2016

Tommaso PAPINI  
tommaso.papini1@stud.unifi.it  
5537529

### Esercizio 3.9

Scrivere una grammatica dipendente da contesto per il linguaggio  $L \triangleq \{a^n b a^n c a^n \mid n \geq 1\}$ .

La grammatica  $G$  che genera il linguaggio  $L$  richiesto è una quadrupla  $G \triangleq \langle A, V, S, P \rangle$ . Seguendo la convenzione nota per rappresentare le grammatiche in forma compatta<sup>1</sup>, proponiamo di seguito le produzioni della grammatica  $G$  di interesse:

$$S ::= AF \quad (1)$$

$$A ::= abTC|aABC \quad (2)$$

$$TF ::= Tc \quad (3)$$

$$Tc ::= ac \quad (4)$$

$$swap(C, B) \quad (5)$$

$$swap(T, B) \quad (6)$$

$$swap(C, F) \quad (7)$$

$$bB ::= ba \quad (8)$$

$$aB ::= aa \quad (9)$$

$$cC ::= ca \quad (10)$$

$$aC ::= aa \quad (11)$$

L'idea generale è quella di usare due nonterminali segnaposto  $B$  e  $C$  che, intuitivamente, rappresentano i simboli  $a$  dopo la  $b$  e dopo la  $c$ , rispettivamente. Per riordinare le  $B$  e le  $C$  e farle andare nella loro posizione finale (ovvero prima tutte le  $B$  e poi tutte le  $C$ ) si usano due nonterminali delimitatori,  $T$  ed  $F$ : la  $T$  rappresenta l'ultima  $a$  dopo la  $b$  e serve a spostare tutte le  $B$  verso sinistra, mentre la  $F$  rappresenta il simbolo  $c$  ed ha lo scopo di spostare tutte le  $C$  verso destra. Una volta che le  $B$  risulteranno a sinistra della  $T$ , esse saranno nella loro posizione finale e potranno trasformarsi in una  $a$  (regole (8) e (9). Analogamente per le  $C$ , con la differenza che per trasformarsi in  $a$  avranno bisogno del simbolo  $c$  (regola (10)), che comparirà solo dopo aver messo tutte le  $B$  e le  $C$  in ordine (ovvero quando i delimitatori  $T$  ed  $F$  si toccano, regola (3)). Una volta riordinate tutte le  $B$  e le  $C$ , esse potranno essere trasformate in  $a$  (si osservi che le  $B$  possono essere trasformate anche prima di questo punto, ma questo non ci disturba), mentre i delimitatori  $T$  ed  $F$  potranno essere trasformati in  $a$  e  $c$ , rispettivamente (regole (3) e (4).

Le regole (5), (6) e (7) servono, intuitivamente, a scambiare nonterminali tra loro, sfruttan-

<sup>1</sup>Le lettere minuscole indicano simboli terminali, le maiuscole indicano nonterminali ed il nonterminale nel lato sinistro della prima produzione rappresenta il simbolo iniziale (solitamente  $S$ ).

do la potenza delle *grammatiche context-sensitive* (questo trucco non sarebbe infatti possibile usando *grammatiche context-free*). La regola (5) serve a riordinare le coppie  $CB$  in  $BC$ , mettendole nell'ordine corretto. La regola (6) serve a “mettere al sicuro” una  $B$  ogni volta che viene trovata dal delimitatore  $T$ . Analogamente per la regola (7).

Le regole dalla (5) alla (7) sono state proposte in questa forma compatta per migliorare la chiarezza e la leggibilità dell'insieme di produzioni della grammatica. Di seguito, la loro implementazione formale con grammatiche context-sensitive:

$$\begin{aligned} \text{swap}(C, B) = \{ \\ & CB ::= XB \\ & XB ::= XY \\ & XY ::= BY \\ & BY ::= BC \\ \} \end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned} \text{swap}(T, B) = \{ \\ & TB ::= MB \\ & MB ::= MN \\ & MN ::= BN \\ & BN ::= BT \\ \} \end{aligned} \tag{13}$$

$$\begin{aligned} \text{swap}(C, F) = \{ \\ & CF ::= IF \\ & IF ::= IJ \\ & IJ ::= FJ \\ & FJ ::= FC \\ \} \end{aligned} \tag{14}$$

### Esercizio 3.15

Dimostrare che, per ogni espressione aritmetica  $E$  descritta nella Sezione 3.3,

$$E \rightarrow E_1, E \rightarrow E_2 \text{ implica } E_1 \twoheadrightarrow n, E_2 \twoheadrightarrow n.$$

Quello che si richiede in questo esercizio è di dimostrare che quando una stessa espressione aritmetica  $E$  (generata tramite la grammatica in Tabella 3.3) viene *computata* in due modi distinti, producendo le nuove espressioni  $E_1$  ed  $E_2$ , allora possiamo dire che queste due nuove espressioni vengono *valutate* entrambe lo stesso numero  $n$ .

Ragioniamo per induzione sul numero di operatori in  $E$ :

- **Caso base:**

Supponiamo che in  $E$  ci sia un solo operatore (se non ci fossero operatori allora  $E$  sarebbe composto da un solo numero e non potrebbe essere computato in un'altra espressione, ma

soltanto valutato), allora l'unica regola applicabile è  $(op)$ . Dal fatto che l'unica regola applicabile è  $(op)$ , segue che  $E_1 = E_2 = n$ , per un  $n$  opportuno. Allora per la prima regola in Tabella 3.5 si ottiene banalmente:

$$E_1 = n \rightarrow n$$

$$E_2 = n \rightarrow n$$

• **Passo induttivo:**

Supponiamo che in  $E$  ci siano  $k + 1$  operatori, con  $k \geq 1$ , e che la proposizione valga per tutte le espressioni con  $k$  operatori. Allora  $E$  sarà della forma  $E = E_a \text{ op } E_b$ , per  $E_a$ ,  $E_b$  e  $op$  opportuni, e potrà essere computata tramite  $(redl)$  oppure  $(redr)$ .

Se  $E_1$  ed  $E_2$  sono state computate tramite la stessa regola, allora per quanto detto prima esse risultano uguali e banalmente vengono valutate nello stesso numero.

Supponiamo allora di aver ottenuto  $E_1$  tramite  $(redl)$  e  $E_2$  tramite  $(redr)$ . Questo significa che se  $E_a \rightarrow E'_a$  ed  $E_b \rightarrow E'_b$ , allora  $E_1$  ed  $E_2$  hanno la forma:

$$E_1 = E'_a \text{ op } E_b$$

$$E_2 = E_a \text{ op } E'_b$$

Possiamo osservare come ogni computazione tramite le tre regole fornite implichi sempre il decremento unitario del numero di operatori rispetto all'espressione originale. Ovvero ogni regola elimina sempre uno ed un solo operatore. Questo implica che la proposizione risulta vera, per ipotesi induttiva, per  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_a$ ,  $E_b$ ,  $E'_a$  e  $E'_b$ . Questo ci assicura che, indipendentemente da quali regole di computazione verranno utilizzate, queste espressioni verranno valutate sempre nello stesso numero.

Possiamo quindi dire che  $E'_a \rightarrow x$  e  $E'_b \rightarrow y$ , per certi  $x$  e  $y$ .

Sfruttando adesso l'equivalenza tra semantica di computazione e semantica di valutazione<sup>2</sup> notiamo che, avendo  $E'_a \rightarrow x$ , allora  $E_a \xrightarrow{*} x$ . Ricordiamo anche che per definizione  $E_a \rightarrow E'_a$ , ovvero  $E_a \xrightarrow{*} x$  e quindi, applicando nuovamente l'equivalenza tra le due semantiche, otteniamo che  $E_a \rightarrow x$ . Ovvero sia  $E_a$  che  $E'_a$  vengono valutate entrambe  $x$ .

Lo stesso discorso si applica ad  $E_b$  e  $E'_b$ , ricavando che entrambi sono valutati in  $y$ .

Sia quindi  $x \text{ op } y = n$ , allora

$$\frac{E'_a \rightarrow x \quad E_b \rightarrow y}{E'_a \text{ op } E_b \rightarrow n} (x \text{ op } y = n)$$

$$\frac{E_a \rightarrow x \quad E'_b \rightarrow y}{E_a \text{ op } E'_b \rightarrow n} (x \text{ op } y = n)$$

da cui la tesi ricordando la forma di  $E_1$  ed  $E_2$ .

Se, alternativamente,  $E_1$  fosse stato ottenuto tramite  $(redr)$  ed  $E_2$  tramite  $(redl)$  i passaggi sarebbero stati del tutto analoghi.

## Esercizio 4.7

Costruire gli automi associati alle espressioni regolari  $a; b + c$  e  $a; b + a; c$ .




Figura 1: Automa a stati finiti dell'espressione regolare  $a; b + c$ .

L'automa a stati finiti relativo all'espressione regolare  $a; b + c$  è rappresentato in Figura 1. Le transizioni dell'automa in Figura 1 sono giustificate dalle seguenti derivazioni:

$$\frac{\frac{}{a \xrightarrow{a} 1} (Atom)}{a; b + c \xrightarrow{a} 1; b + c} (Seq1) \quad (15)$$

$$\frac{\frac{}{1 \xrightarrow{\varepsilon} 1} (Tic)}{1; b + c \xrightarrow{\varepsilon} b + c} (Seq2) \quad (16)$$

$$\frac{\frac{}{b \xrightarrow{b} 1} (Atom)}{b + c \xrightarrow{b} 1} (Sum1) \quad (17)$$

$$\frac{\frac{}{c \xrightarrow{c} 1} (Atom)}{b + c \xrightarrow{c} 1} (Sum2) \quad (18)$$

$$\frac{}{1 \xrightarrow{\varepsilon} 1} (Tic) \quad (19)$$

Vediamo adesso in Figura 2 l'automa relativo all'espressione  $a; b + a; c$ .




Figura 2: Automa a stati finiti dell'espressione regolare  $a; b + a; c$ .

Come prima, proponiamo di seguito le derivazioni che giustificano le transizioni del secondo automa:

---

<sup>2</sup>Questo risultato verrà dato per buono ai fini di questo esercizio in quanto la sua dimostrazione è già obiettivo di un altro esercizio, l'Esercizio 3.14

$$\frac{\frac{}{a \xrightarrow{a} 1} (Atom)}{a; b + a; c \xrightarrow{a} a; b + a; c} (Seq1) \quad (20)$$

$$\frac{\frac{\frac{}{a \xrightarrow{a} 1} (Atom)}{b + a \xrightarrow{a} 1} (Sum2)}{b + a; c \xrightarrow{a} 1; c} (Seq1) \quad (23)$$

$$\frac{\frac{}{1 \xrightarrow{\varepsilon} 1} (Tic)}{1; b + a; c \xrightarrow{\varepsilon} b + a; c} (Seq2) \quad (21)$$

$$\frac{\frac{}{1 \xrightarrow{\varepsilon} 1} (Tic)}{1; c \xrightarrow{\varepsilon} c} (Seq2) \quad (24)$$

$$\frac{\frac{\frac{}{b \xrightarrow{b} 1} (Atom)}{b + a \xrightarrow{b} 1} (Sum1)}{b + a; c \xrightarrow{b} 1; c} (Seq1) \quad (22)$$

$$\frac{}{c \xrightarrow{c} 1} (Atom) \quad (25)$$

$$\frac{}{1 \xrightarrow{\varepsilon} 1} (Tic) \quad (26)$$

## Esercizio 4.10

Si dimostrino le seguenti uguaglianze usando il sistema di inferenza della semantica assiomatica:

- c)  $E = F \implies E^* = F^*$
- d)  $E^* + 1 = E^*$
- e)  $E^* + E = E^*$

Sfruttando gli assiomi e le due regole in Tabella 4.4 delle dispense, si dimostrano le uguaglianze proposte.

c)  $E = F \implies E^* = F^*$

Come già mostrato nelle dispense, si può dimostrare che l'uguaglianza  $=$  è riflessiva e simmetrica:

$$\frac{E + E = E \quad E + E = E}{E = E \quad E = E + E} (regola1) \quad (27)$$

$$\frac{E = F \quad E = F}{F = F \quad F = E} (regola1) \quad (28)$$

Da qui in avanti useremo i risultati della (27) e della (28) come fossero regole, indicandole con *(rifl)* e *(simm)*, rispettivamente.

Per dimostrare quindi che  $E = F \implies E^* = F^*$  basta applicare la regola della sostituzione assumendo riflessività e simmetria della relazione  $=$ .

$$\frac{E = F \quad \frac{}{E^* = E^*} (rifl)}{F^* = E^*} (regola1) \quad (29)$$

$$\frac{}{E^* = F^*} (simm)$$

d)  $E^* + 1 = E^*$

Dimostriamo innanzitutto la sostitutività rispetto alla somma (che indicheremo con *(sost+)*)

come suggerito dalla Proposizione 4.13 delle dispense:

$$\frac{G = H \quad \frac{E = F \quad \overline{E + G = E + G}^{(rifl)}}{F + G = E + G}^{(regola1)}}{F + H = E + G}^{(regola1)} \quad \frac{}{E + G = F + H}^{(simm)} \quad (30)$$

La dimostrazione che  $E^* + 1 = E^*$  si ottiene quindi come segue (abbiamo diviso la dimostrazione in quattro parti per questioni di leggibilità):

$$\frac{\overline{E^* = 1 + E^*E}^{(unfolding)} \quad \frac{}{1 = 1}^{(rifl)}}{E^* + 1 = 1 + E^*E + 1}^{(sost+)} \quad \frac{}{1 + E^*E + 1 = E^* + 1}^{(simm)} \quad (31)$$

$$\frac{\overline{1 + E^*E + 1 = 1 + 1 + E^*E}^{(comm+)} \quad \frac{}{1 + E^*E + 1 = E^* + 1}^{(31)}}{1 + 1 + E^*E = E^* + 1}^{(regola1)} \quad (32)$$

$$\frac{\frac{}{1 + 1 = 1}^{(idem+)} \quad \frac{}{1 + 1 + E^*E = E^* + 1}^{(32)}}{1 + E^*E = E^* + 1}^{(regola1)} \quad (33)$$

$$\frac{\overline{E^* = 1 + E^*E}^{(unfolding)} \quad \frac{}{1 + E^*E = E^*}^{(simm)} \quad \frac{}{1 + E^*E = E^* + 1}^{(33)}}{E^* = E^* + 1}^{(regola1)} \quad \frac{}{E^* + 1 = E^*}^{(simm)} \quad (34)$$

In parole povere, si è fatto un primo passo di unfolding di  $E^*$ , ci si è sommato 1 e si è fatto vedere che i due 1 si riducono ad un solo 1. Quindi abbiamo rimesso le cose a posto per avere la formulazione finale richiesta.

e)  $E^* + E = E^*$

L'idea di quest'ultima dimostrazione è sulla falsariga della dimostrazione precedente, ovvero si dimostra facendo un passo di unfolding e poi rimettendo tutto a posto. Ad un certo punto sarà molto utile anche sfruttare il risultato della dimostrazione precedente.

$$\frac{\overline{E^* = 1 + E^*E}^{(unfolding)} \quad \frac{\overline{1E = E}^{(neutro;)} \quad \frac{}{E = 1E}^{(simm)}}{E^* + E = 1 + E^*E + 1E}^{(sost+)} \quad \frac{}{1 + E^*E + 1E = E^* + E}^{(simm)} \quad (35)$$

$$\frac{\overline{E^*E + 1E = (E^* + 1)E}^{(distribD)} \quad \frac{}{1 + E^*E + 1E = E^* + E}^{(35)}}{1 + (E^* + 1)E = E^* + E}^{(regola1)} \quad (36)$$

$$\frac{\overline{E^* + 1 = E^*}^{(34)} \quad \frac{}{1 + (E^* + 1)E = E^* + E}^{(36)}}{1 + E^*E = E^* + E}^{(regola1)} \quad (37)$$

$$\frac{\overline{E^* = 1 + E^*E}^{(unfolding)} \quad \frac{}{1 + E^*E = E^*}^{(simm)} \quad \frac{}{1 + E^*E = E^* + E}^{(37)}}{E^* = E^* + E}^{(regola1)} \quad \frac{}{E^* + E = E^*}^{(simm)} \quad (38)$$

Esercizio 7.6

Esercizio 8.6

Esercizio 9.6

Esercizio 11.3

Esercizio 11.5

Esercizio 12.2