
```

clear all
clc

% Parameters
syms m1 m2 L g real
% Force
u = sym('u',[3,1]);

% Positions of point masses
pm1 = sym('pm1',[3,1]);
pm2 = sym('pm2',[3,1]);
dpm1 = sym('dpm1',[3,1]);
dpm2 = sym('dpm2',[3,1]);
ddpm1 = sym('d2pm1',[3,1]);
ddpm2 = sym('d2pm2',[3,1]);
% Generalized coordinates
q = [pm1;pm2];
dq = [dpm1;dpm2];
ddq = [ddpm1;ddpm2];
% Algebraic variable
z = sym('z');

% Generalized forces
Q = [u; 0; 0; 0];
% Kinetic energy (function of q and dq)
W = [m1*eye(3), zeros(3); zeros(3), m2*eye(3)];
T = 0.5*dq'*W*dq;
% Potential energy
G = [0 0 m1*g 0 0 m2*g]';
V = G'*q;
% Lagrangian (function of q and dq)
Lag = T - V;
% Constraint
dpm = pm1 - pm2; % difference of positions
C = 0.5 * (dpm'*dpm - L^2);

% Derivatives of constrained Lagrangian
Lag_q = simplify(jacobian(Lag,q)).';
Lag_qdq = simplify(jacobian(Lag_q.',dq));
Lag_dq = simplify(jacobian(Lag,dq)).';
Lag_dq dq = simplify(jacobian(Lag_dq.',dq)); % W
C_q = simplify(jacobian(C,q)).';

% Matrices for problem 1
M = Lag_dq dq;
b = Q - Lag_q - z*C_q;

% Matrices for problem 2
Mimplicit = [Lag_dq dq, C_q; C_q', 0];
c = [Q - Lag_q; -dq'*C_q];
% MexPLICIT = simplify(inv(Mimplicit));
rhs = simplify(Mexplicit*c);

```

Undefined function or variable 'Mexplicit'.

Error in HoveringMassConstraintTemplate (line 52)
*rhs = simplify(Mexplicit*c);*

Published with MATLAB® R2019a