

Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Ketepatan Swamedikasi Obat Anti Jamur di Apotek

Ferika Indrasari^{1*}, Novita Indah Permata Dewi¹, Agustina Ratna Wulandari¹, Ayu Ina Solichah¹

¹Program Studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera, Semarang, Indonesia

*corresponding author

Email: ferikaindrasari89@gmail.com

Diterima : 12 Desember 2023

Direvisi : 20 Desember 2023

Publikasi : 28 Desember 2023

doi: 10.52216/jfsi.vol6no2p174-179

Abstract

Antifungal is a class of drugs that are fungicidal or fungistatic, these drugs can be used to treat and prevent mycoses such as water fleas, ringworm. People around Wahyu Farma Pharmacy often experience itching caused by fungi or allergies. One treatment that is often done by the community is self-medication (self-medication). In self-medication, the community needs good knowledge so that self-medication can have a positive impact. The purpose of this study was to determine the level of public knowledge about the accuracy of self-medication of antifungal drugs at the Wahyu Farma Pharmacy in the Jepon area of Blora City. This type of research is a non-experimental descriptive with a quantitative approach. This study uses purposive sampling method with a questionnaire measuring instrument to 95 respondents. The data obtained is primary data from the results of filling out questionnaires distributed to the community who are self-medication of antifungal drugs. The results of the study showed that the level of knowledge about self-medication was 67.37% classified as sufficient, the right category of drugs 71.58% was sufficient, the right dose was 73.16% sufficient category, on time 67.37% sufficient category, alert for side effects 62, 11% is sufficient. The total percentage of self-medication, right drug, right dose, right drug, on time, alert for side effects is 68.32% which means that they are knowledgeable enough.

Keywords: Knowledge level, self-medication, antifungal drug

Intisari

Anti jamur merupakan suatu golongan obat yang bersifat fungisida atau fungistatik, obat ini dapat digunakan untuk mengobati dan mencegah mikosis seperti kutu air, kurap. Masyarakat disekitar Apotek Wahyu Farma sering mengalami gatal – gatal yang disebabkan oleh jamur maupun alergi. Salah satu pengobatan yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan tindakan pengobatan sendiri (swamedikasi). Dalam tindakan swamedikasi masyarakat membutuhkan pengetahuan yang baik agar tindakan swamedikasi dapat berdampak positif. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ketepatan swamedikasi obat anti jamur di Apotik Wahyu Farma daerah Jepon Kota Blora. Jenis penelitian ini adalah non eksperimental yang bersifat deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan alat ukur kuesioner kepada 95 responden. Data yang diperoleh adalah data primer dari hasil pengisian lembar kuesioner yang dibagikan pada masyarakat yang sedang melakukan swamedikasi obat anti jamur. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang swamedikasi yaitu 67.37% tergolong cukup baik, kategori tepat obat 71,58% tergolong cukup baik, tepat dosis 73,16% kategori cukup baik, tepat waktu 67,37% kategori cukup baik, waspada efek samping 62,11% tergolong cukup baik. Total

presentase tentang swamedikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat obat, tepat waktu, waspada efek samping diperoleh 68.32% yang berarti berpengetahuan cukup baik.

Kata kunci: Tingkat pengetahuan, Swamedikasi, Obat anti jamur

1. Pendahuluan

Salah satu kebiasaan manusia yang diwarisi dari nenek moyang ialah melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri jika menderita sakit (Wardoyo *et al*, 2019). Swamedikasi (*self medication*) merupakan tindakan yang dilakukan masyarakat dalam mengobati dirinya sendiri (Asnasari, 2017). Tindakan ini mempunyai kecenderungan untuk meningkat dari waktu ke waktu. Swamedikasi disebabkan oleh beberapa hal faktor antara lain karena perkembangan teknologi informasi, sehingga masyarakat menjadi lebih mudah mengakses informasi, termasuk informasi mengenai kesehatan (Izzatin, 2015).

Pengetahuan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam tindakan swamedikasi. Pengetahuan yang seharusnya dimiliki masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tindakan tersebut. Pengetahuan merupakan salah satu ranah perilaku selain sikap dan tindakan atau praktik (Notoatmodjo, 2014). Khalid (2014) menguatkan bahwa pengetahuan merupakan determinan terhadap perubahan perilaku seseorang, ketersediaan fasilitas, sikap dan perilaku para tugas kesehatan juga sangat mendukung dan memperkuat terbentuknya pengetahuan masyarakat dalam swamedikasi penyakit.

Penyakit ringan yang dapat diobati dengan swamedikasi salah satunya adalah dermatitis. Salah satu yang paling sering dialami oleh masyarakat adalah infeksi jamur kulit. Dari data-data penyakit kulit akibat jamur yang pernah dilaporkan oleh pusat-pusat pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa insiden penyakit jamur kulit merupakan insiden nomor tiga dari seluruh kasus penyakit kulit setelah penyakit infeksi oleh bakteri dan penyakit kulit karena alergi (Widati, 2015). Jamur memang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Jenis fungi-fungian bisa hidup dan tumbuh di mana saja, baik di udara, tanah, air, pakaian,

bahkan tubuh manusia. Hal ini dikarenakan faktor Indonesia sebagai negara tropis sehingga menjadi lahan subur tumbuhnya jamur. Penyakit akibat jamur sering kali menjangkiti masyarakat. Jamur bisa mengenai manusia dari kepala hingga ujung kaki, dari bayi, orang dewasa hingga lanjut usia. Penyakit ini bisa menular lewat sentuhan kulit, atau juga dari pakaian yang terkontaminasi spora jamur. Untuk mengatasinya bahan aktif yang digunakan biasanya mengandung ketoconazole, miconazole, itraconazole karena obat-obat ini berkhasiat sebagai anti fungi atau anti jamur.

2. Metode Penelitian

2.1. Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Populasi adalah pasien yang datang untuk melakukan swamedikasi obat anti jamur baik oral maupun topikal di Apotek pada periode maret-mei 2021. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien yang datang untuk membeli obat ketoconazole sebagian individu yang diteliti. Banyak sampel yang dibutuhkan, dihitung menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2016).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{125}{1 + 125(0,0025)}$$

$$n = 95.4198, \text{dibulatkan } 95 \text{ responden}$$

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini secara *purposive sampling* dengan penentuan responden didasari dengan kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan (Sugiyono, 2016). Kriteria inklusi adalah kriteria dimana subjek peneliti dapat mewakili dalam

sampel penelitian yang mempengaruhi syarat sampel (Notoatmodjo, 2018), yaitu:

- Pasien yang datang ke Apotek untuk melakukan swamedikasi
- Pasien dewasa berumur 20 - 60 tahun
- Pasien yang dapat baca tulis

Sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria di mana subjek penelitian dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai peneliti (Notoatmodjo, 2018). Kriteria eklusi penelitian ini adalah pasien yang datang ke Apotek tetapi tidak melakukan swamedikasi.

2.2. Analisis Data

Analisa ini digunakan terhadap dua variabel yang berhubungan atau berkorelasi dan berskala nominal dalam penelitian ini yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Menggunakan uji dengan melihat *cronbach alpha*. Setelah dilakukan uji validitas dan reabilitas data diolah menggunakan statistik deskriptif dengan prosentase. Pengukuran tingkat pengetahuan masyarkat dilakukan dengan cara menghitung persentase masing-masing indikator pertanyaan (*responsiveness*, *reliability*, *empathy*, *assurance*, dan *tangible*) menggunakan Rumus (Sugiyono, 2016).

$$\% = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{\text{Jumlah Skor Maksimal}} \times 100\%$$

Range Skala Tingkat Pengetahuan Masyarakat (Arikunto, 2019):

- Kategori baik : 76% - 100%
- Kategori cukup : 56% - 75%
- Kategori kurang : <56%

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan profil terhadap obyek penelitian yang dapat memberikan hasil penelitian. Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan tabel 1, karakteristik umur responden penelitian menunjukkan bahwa umur produktif 20-40 tahun sebanyak 62 responden 65,3%. Menurut Budiman & Riyanto (2013), usia tersebut termasuk usia produktif keringat dengan aktifitas yang besar sehingga produksi keringat yang dihasilkan juga mempengaruhi kelembapan kulit. Usia produktif juga sangat memperhatikan penampilan. Penyakit dermatomikosis tentunya

juga mempengaruhi penampilan, dimana penderita penyakit seperti yang terkena panu (*Pitiriasis versikolor*), kutu air (*Tinea pedis*) merasa penyakitnya membuat tidak percaya diri dan sangat mengganggu.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Jumlah	%
Usia		
20-30	26	27.4
31-40	36	37.9
41-50	17	17.9
51-60	16	16.8
Total	95	100
Jenis Kelamin		
Laki-laki	53	55.8
Perempuan	42	44.2
Total	95	100
Tingkat Pendidikan		
SD	40	42.1
SM	8	8.4
SMk/SMA	30	31.6
D3	5	5.3
S1	12	12.6
Total	95	100
Pekerjaan		
Pedagang	2	2.1
Pengusaha	3	3.2
Petani	38	40
PNS	7	7.4
Wiraswasta	30	31.6
Tidak bekerja	12	12.6
TNI/ POLRI	3	3.2
Total	95	100

Responden pria merupakan responden terbanyak yang menderita penyakit jamur, hal ini sangat dipengaruhi oleh aktifitas dan kebersihan, dimana pria cenderung kurang memperhatikan kebersihan kulit. Salah satunya hubungan faktor sosiodemografi tentang penggunaan obat anti jamur yang tepat. Faktor umur dan pendidikan diketahui berhubungan secara bermakna dengan tindakan swamedikasi obat anti jamur yang sesuai dengan aturan.

Berdasarkan tabel 1 menurut tingkat pendidikan, dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan (Notoatmodjo, 2012). Berdasarkan pekerjaan mayoritas responden adalah seorang petani yaitu sebanyak 38 orang (40%).

3.2. Tingkat Pengetahuan

3.2.1. Pengetahuan tentang swamedikasi

Ruiz (2010) mendefinisikan swamedikasi sebagai pemilihan dan penggunaan obat-obatan oleh seseorang atau anggota keluarga untuk mengatasi kondisi atau gejala penyakit yang dikenali sendiri. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang swamedikasi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Swamedikasi

Pertanyaan	Skor	Skor max	Jumlah (%)	Kategori
Apakah Anda tahu tentang penyakit jamur?	56	95	58.95	Cukup
Apakah penyakit jamur sangat mengganggu sehingga harus segera diobati?	72	95	75.79	Cukup
Total	128	190	134.74	
Rata-rata			67.37	Cukup

Berdasarkan data tabel di atas diketahui rata-rata tingkat pengetahuan pasien tentang swamedikasi sebesar 67.37% yang termasuk dalam kategori cukup baik. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian di Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pengetahuan masyarakat tergolong cukup baik (Sherlyta, 2018). Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan responden mengenai resiko dari pengobatan yang tidak tepat sehingga menganggap informasi tentang obat tidak begitu penting. Oleh karena itu, upaya untuk membekali masyarakat agar mempunyai keterampilan mencari informasi obat secara tepat dan benar perlu dilakukan.

3.2.2. Pengetahuan tentang tepat obat

Penggunaan obat dikatakan rasional menurut WHO apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis, dalam dosis yang memenuhi. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang tepat obat dapat dilihat pada tabel 3.

Berdasarkan tabel 3 diketahui rata-rata tingkat pengetahuan masyarakat tentang tepat obat sebesar 71,58% yang berarti pengetahuan cukup baik. Kesalahan yang umumnya dilakukan masyarakat adalah menggunakan obat yang seharusnya digunakan dengan pengawasan dokter dan tidak sesuai dengan indikasi obat yang dipilih

dengan keluhan pasien. Masyarakat mutlak memerlukan informasi obat yang jelas dan dapat dipercaya oleh masyarakat agar penentuan jenis obat yang dibutuhkan lebih tepat dengan keluhan pasien (Restiyono, 2016).

Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Tepat Obat

Pertanyaan	Skor	Skor max	Jumlah (%)	Kategori
Apakah anda menggunakan obat ketoconazole untuk mengatasi jamur?	69	95	72.63	Cukup
Setelah menggunakan obat tersebut apakah penyakit jamur yang anda alami sembuh?	67	95	70.53	Cukup
Total	136	190	143.16	
Rata-rata			71.58	Cukup

3.2.3. Pengetahuan tentang tepat dosis

Tepat saat pemberian obat merupakan ketepatan menentukan saat terbaik pemberian obat sesuai dengan sifat obat dan kondisi pasien. Apakah obat diberikan sebelum makan, sesudah makan, saat makan, sebelum operasi atau sesudah operasi. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang tepat dosis dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Tepat Waktu

Pertanyaan	Skor	Skor max	Jumlah (%)	Kategori
Apakah boleh jika dihentikan meminum obat ketoconazole jika infeksi sudah sembuh?	56	95	58.95	Cukup
Apakah anda tahu jika obat ketoconazole dapat diminum menggunakan susu?	72	95	75.79	Cukup
Total	128	190	134.74	
Rata-rata			67.37	Cukup

Berdasarkan tabel di atas rata-rata tingkat pengetahuan masyarakat tentang tepat dosis obat sebesar 73.16% yang berarti tingkat pengetahuan masyarakat tergolong dalam kategori cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Sherlyta (2018) di Daerah Sumbermanjing Kabupaten Malang yang menyatakan ketidak tepatan penggunaan

dosis obat anti jamur. Hasil penelitian terhadulu menyebutkan bahwa tindakan pengobatan sendiri yang tidak sesuai aturan terutama terjadi pada ketidak tepatan dosis pada penggunaan obat-obatan, adalah karena responden hanya fokus pada pengalaman pribadi/keluarga dalam penggunaan obat seperti dosis yang digunakan untuk mendapatkan efek samping terapi yang cepat, aturan pakai obat dan lama pemakaian obat. Hal ini didukung karena minimnya pengetahuan responden tentang pengobatan sendiri sehingga mengesampingkan informasi-informasi penting untuk mendapatkan pengobatan terbaik dengan efek samping minimal. Dosis dari beberapa obat yang dapat digunakan secara bebas terkadang tidak sekuat obat dengan resep dokter. Oleh karenanya, seseorang sering menggunakan obat bebas lebih dari dosis yang direkomendasikan jika merasa obat tersebut tidak menimbulkan efek yang diinginkan berdasarkan perasaannya, dan tentunya hal tersebut juga dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya efek samping, reaksi merugikan lainnya, dan karacunan.

3.2.4. Pengetahuan tentang tepat waktu

Waktu pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang tertera pada catatan pemberian obat, misalnya obat diberikan 2x sehari maka catatan pemberian obat akan tertera waktu pemberian misalnya jam 6 pagi dan 6 sore. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang tepat waktu dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Tepat Dosis

Pertanyaan	Skor	Skor max	Jumlah (%)	Kategori
Apakah anda menggunakan obat ketoconazole oral 200-400 mg/hari?	73	95	76.84	Baik
Apakah anda menggunakan obat ketoconazole salep sehari 2x selama 2-3 minggu	66	95	69.47	Cukup
Total	139	190	146.31	
Rata-rata			73.16	Cukup

Berdasarkan data dari tabel di atas diperoleh data tingkat pengetahuan masyarakat tentang tepat waktu penggunaan obat diperoleh rata-rata sebesar 67.37% yang berarti berpengetahuan cukup baik. Meminum obat anti jamur biasanya diminum

sehari sekali. Obat diminum sebelum atau sesudah makan. Meminum obat setelah makan dapat membantu terhindar dari sakit perut. Jika pasien sedang mengkonsumsi obat antasida, maka ketoconazole diminum minimal 2 jam atau 1 jam setelah makan. Informasi ini yang perlu didapatkan oleh masyarakat ketika sedang melakukan swamedikasi obat anti jamur.

3.2.5. Pengetahuan tentang waspada efek samping

Efek samping obat merupakan semua efek yang tidak dikehendaki yang membahayakan atau merugikan pasien (*adverse reactions*) akibat penggunaan obat. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang waspada efek samping dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Waspada Efek Samping

Pertanyaan	Skor	Skor max	Jumlah (%)	Kategori
Apakah anda mengetahui efek samping ketoconazole, misalnya muntah, diare?	56	95	58.95	Cukup
Apakah anda mengetahui jika ketoconazole salep dapat menyebabkan gatal atau ruam ringan?	62	95	65.26	Cukup
Total	118	190	124.21	
Rata-rata			62.11	Cukup

Berdasarkan data di atas, tingkat pengetahuan masyarakat tentang waspada efek samping sebesar 62.11%, yang berarti pengetahuan masyarakat tentang efek samping obat masuk di dalam kategori cukup baik. Selain efek samping obat yang ditimbulkan, obat juga mempunyai efek samping yang paling umum dialami responden adalah jantung berdebar dan nyeri lambung. Kejadian polifarmasi ini terjadi karena kesadaran masyarakat untuk membaca label pada kemasan obat masih kecil. Pemilihan obat bermerek yang digunakan bersamaan harus memperhatikan juga kandungannya karena obat bermerek dapat mengandung lebih dari satu macam obat (Margarita dan Hanindito, 2019).

3.2.6. Rekapitulasi pengetahuan masyarakat

Penggunaan obat dalam pengobatan sendiri (swamedikasi) harus mengikuti prinsip penggunaan obat secara umum.

Tabel 7. Rekapitulasi Pengetahuan Masyarakat

Sub Variabel	Skor	Skor max	Jumlah (%)	Kategori
Swamedikasi	128	190	67.37	Cukup
Tepat obat	136	190	71.58	Cukup
Tepat dosis	139	190	73.16	Cukup
Tepat waktu	128	190	67.37	Cukup
Waspada efek samping	118	190	62.11	Cukup
Total	649	950	341.59	
Rata-rata			68.32	Cukup

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang swamedikasi obat ketoconazole di Apotek Wahyu Farma Blora diperoleh rata-rata persentase sebesar 68.32% yang termasuk cukup baik, hal ini dikarenakan banyak sumber informasi yang bisa di dapatkan oleh responden untuk melakukan swamedikasi obat anti jamur di antaranya iklan baik dari media cetak maupun media elektronik dan itu merupakan informasi yang paling berkesan, sangat mudah di tangkap serta sifatnya komersial.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di apotek dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ketepatan swamedikasi obat antijamur di Apotek diperoleh presentase tingkat pengetahuan tentang swamedikasi yaitu 67.37% tergolong cukup baik, kategori tepat obat 71,58% tergolong cukup baik, tepat dosis 73,16% kategori cukup baik, tepat waktu 67,37% kategori cukup baik, waspada efek samping 62,11% tergolong cukup baik. Total presentase tentang swamedikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat obat, tepat waktu, waspada efek samping diperoleh 68.32% yang berarti berpengetahuan cukup baik.

5. Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Asnasari, L. (2017). Hubungan Pengetahuan Tentang Swamedikasi Dengan Pola Penggunaan Obat Pada Masyarakat Dusun Kenaran, Sumberharjo, Prambanan, Sleman,

Yogyakarta [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Budiman & Riyanto A. 2013. *Kapita Selekta Kuisisioner Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Salemba Medika pp

Izzatin, Immas. (2015). Persepsi Pasien Mengenai Peran Apoteker dalam Pelayanan Swamredikasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*.

Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Notoatmodjo, Soekidjo. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Rehatta, N Margarita, Elizeus Hanindito, dan Aida R Tantri. (2019). *Anestesiologi Dan Terapi Intensif Buku Teks KATI-PERDATIN*.

Sherlyta M, Wardani R, Susilawati S. Tingkat kebersihan gigi dan mulut siswa Sekolah Dasar Negeri di desa tertinggal Kabupaten Bandung. *J Ked Gi Unpad*.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian*. Metode Penelitian. Bandung:alfabeta.

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung:alfabeta.

Wardoyo, Asyraf. (2019). Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Analgesik Pada Swamedikasi Untuk Mengatasi Nyeri Akut. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*.

Widati S dan Budimulja U. 2015. Dalam: Djuanda A, Hamzah Ha. *Dermatofitosis s, Aisah S, editor. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*. Edisi ketujuh. Jakarta: Balai Penerbit FKUI