

# Auswertung

June 20, 2024

## 1 Auswertung B3.1

```
[1]: using CSV
      using DataFrames
      using Plots
      using LaTeXStrings
      using Measurements
      using Statistics
```

### 1.1 Rechnungen zur Vorbereitung

```
[2]: T_12 = 30.08 * 365.25 * 24 * 60 * 60 # s
```

```
[2]: 9.492526079999999e8
```

```
[3]: log(2) / T_12
```


```
[3]: 7.302030826339804e-10
```

### 1.2 0: Rohe Messdaten

Sample 6, 500 V, 45min:


```
[4]: #  $\Delta T = 0.2$ , binning = 1
      zerfälle_6_500_1 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
      anzahl_6_500_1 = [
        ↪ [3,50,167,477,1056,1707,2308,2482,2159,1493,916,424,165,69,19,2,2]
      ]
      plot(bar(zerfälle_6_500_1,anzahl_6_500_1,label=""), title=L"Sample 6, ↪
        ↪  $500\mathrm{\,V}$ ,  $45\mathrm{\,min}$ , binning =  $1\mathrm{\,s}$ ")
      xlabel!(L"Zerfälle in  $0.2\mathrm{\,s}$ ")
      ylabel!(L"Anzahl an Messungen")
```

```
[4]:
```



```
[5]: # ΔT = 5s, binning = 8
zerfälle_6_500_2 = □
↳ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26]
anzahl_6_500_2 = □
↳ [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,18,47,107,123,120,80,29,8,1]
plot(bar(zerfälle_6_500_2,anzahl_6_500_2,label=""), title=L"Sample 6, □
↳ $500\mathrm{\,V}$, $45\mathrm{\,min}$, binning = $8$")
xlabel!(L"Zerfälle in $5\mathrm{\,s}$")
ylabel!("Anzahl an Messungen")
```


[5]:



Sample 6, 600V, 45min:


```
[6]: #  $\Delta T = 0.2s$ , binning = 1
zerfälle_6_600_1 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21]
anzahl_6_600_1 = [
    ↪ [8,26,96,238,553,1021,1441,1775,1946,1822,1552,1148,796,532,265,150,74,38,12,5,0,1]
]
plot(bar(zerfälle_6_600_1,anzahl_6_600_1,label=""), title=L"Sample 6, ↪
    ↪ $600\mathrm{\,V}$, $45\mathrm{\,min}$, binning = $1$")
xlabel!(L"Zerfälle in $0.2\mathrm{\,s}$")
ylabel!("Anzahl an Messungen")
```

[6]:



```
[7]: # ΔT = 5s, binning = 8
zerfälle_6_600_2 = □
↳ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32]
anzahl_6_600_2 = □
↳ [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,9,28,70,103,129,104,59,22,8,3,2]
plot(bar(zerfälle_6_600_2,anzahl_6_600_2,label=""), title=L"Sample 6, □
↳ $600\mathrm{\,V}$, $45\mathrm{\,min}$, binning = $8$")
xlabel!(L"Zerfälle in $5\mathrm{\,s}$")
ylabel!("Anzahl an Messungen")
```

[7]:




Sample 6+7, 500V, 45min:

```
[8]: # ΔT = 0.2s, binning = 1
zerfälle_6und7_500_1 = ␣
↪ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
anzahl_6und7_500_1 = ␣
↪ [0,0,0,0,1,5,26,78,227,443,875,1373,1917,2175,2140,1712,1193,768,375,139,38,11,2,1]
plot(bar(zerfälle_6und7_500_1,anzahl_6und7_500_1,label=""), title=L"Samples 6 +  

↪ 7, $500\mathrm{\,V}$, $45\mathrm{\,min}$, binning = $1$")
xlabel!(L"Zerfälle in $0.2\mathrm{\,s}$")
ylabel!("Anzahl an Messungen")
```

[8]:

[illegible]

[9] :



### 1.3 1: Poisson-Verteilung

```
[10]: # Poissonverteilung:
lambda = 10 # (Testwert) Mittelwert lambda
N = 10 # (Testwert) Normierungsfaktor N = Summe der Höhe aller Balken
P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))
```

[10]: P (generic function with 1 method)

Sample 6, 500V, 45min,  $\Delta T = 0.2s$ , binning = 1:

```
[11]: # Messdaten mit  $\Delta T = 0.2$ , binning = 1
zerfälle_6_500_1 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
anzahl_6_500_1 = ↵
↵ [3,50,167,477,1056,1707,2308,2482,2159,1493,916,424,165,69,19,2,2]

# Passende Poissonverteilung:
lambda = 7.1
N = sum(anzahl_6_500_1)
P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))


#Plot
poisson1 = bar(zerfälle_6_500_1,anzahl_6_500_1,label=L"\mathrm{Messdaten}")
```

```

bar!(0:25,P,color=:green,label=LaTeXString("\$\\mathrm{Poisson}\\ mit\\ }_\\lambda = \$\\lambda\$"),alpha=0.5)
xlabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Zerflle\ in\ }0.2\mathrm{\,s}")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")

```

[11]:



[12]: `savefig(poisson1, "../media/B3.1/poisson1.pdf");`

Sample 6, 600V, 45min,  $\Delta T = 0.2s$ , binning = 1:

```

[13]: # Messdaten mit  $\Delta T = 0.2s$ , binning = 1
zerflle_6_600_1 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21]
anzahl_6_600_1 = [8,26,96,238,553,1021,1441,1775,1946,1822,1552,1148,796,532,265,150,74,38,12,5,0,1]

# Passende Poissonverteilung:
lambda = 8.5
N = sum(anzahl_6_600_1)
P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))


# Plot
poisson2 = bar(zerflle_6_600_1,anzahl_6_600_1,label=L"\mathrm{Messdaten}")
bar!(0:25,P,color=:green,label=LaTeXString("\$\\mathrm{Poisson}\\ mit\\ }_\\lambda = \$\\lambda\$"),alpha=0.5)

```



```
xlabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Zerfälle\ in\ }0.2\mathrm{\,s}")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")
```

[13]:



[14]: `savefig(poisson2, "../media/B3.1/poisson2.pdf");`

Sample 6 + 7, 500V, 45min,  $\Delta T = 0.2s$ , binning = 1:


```
[15]: # Messdaten mit  $\Delta T = 0.2s$ , binning = 1
zerfälle_6und7_500_1 = ␣
    ␣[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]
anzahl_6und7_500_1 = ␣
    ␣[0,0,0,0,1,5,26,78,227,443,875,1373,1917,2175,2140,1712,1193,768,375,139,38,11,2,1]

# Passende Poissonverteilung:
lambda = 13.5
N = sum(anzahl_6und7_500_1)
P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))

# Plot
poisson3 = ␣
    ␣bar(zerfälle_6und7_500_1,anzahl_6und7_500_1,label=L"\mathrm{Messdaten}")
bar!(0:25,P,color=:green,label=LaTeXString("\$\\mathrm{Poisson\\ mit\\ }␣
    ␣\\lambda = \$lambda\$"),alpha=0.5)
```

```
xlabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Zerfälle\ in\ }0.2\mathrm{\,s}")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")
```

[15]:



[16]: `savefig(poisson3, "../media/B3.1/poisson3.pdf");`

Alle Poisson-Verteilungen zusammen:

```
[17]: # Messdaten mit  $\Delta T = 0.2$ , binning = 1
zerfälle_6_500_1 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
anzahl_6_500_1 =
    ↳ [3,50,167,477,1056,1707,2308,2482,2159,1493,916,424,165,69,19,2,2]

# Passende Poissonverteilung:
lambda = 7.1
N = sum(anzahl_6_500_1)
P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))

#Plot
allePoisson = bar(0:25,P,label=LaTeXString("\$\lambda = \$lambda, ↳
    ↳ "\mathrm{Probe\ } A, 500\mathrm{\,V}\$"),alpha=0.5)

# Messdaten mit  $\Delta T = 0.2s$ , binning = 1
zerfälle_6_600_1 = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21]
```

```

anzahl_6_600_1 =  $\square$ 
 $\hookrightarrow$  [8, 26, 96, 238, 553, 1021, 1441, 1775, 1946, 1822, 1552, 1148, 796, 532, 265, 150, 74, 38, 12, 5, 0, 1]

# Passende Poissonverteilung:
lambda = 8.5
N = sum(anzahl_6_600_1)
P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))

# Plot
bar!(0:25, P, label=LaTeXString("\$\\lambda = \$lambda, \\mathrm{Probe}\\ } A,  $\square$ 
 $\hookrightarrow$  600\\mathrm{\\,V}\\$"), alpha=0.5)

# Messdaten mit  $\Delta T = 0.2s$ , binning = 1
zerfälle_6und7_500_1 =  $\square$ 
 $\hookrightarrow$  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
anzahl_6und7_500_1 =  $\square$ 
 $\hookrightarrow$  [0, 0, 0, 0, 1, 5, 26, 78, 227, 443, 875, 1373, 1917, 2175, 2140, 1712, 1193, 768, 375, 139, 38, 11, 2, 1]

# Passende Poissonverteilung:
lambda = 13.5
N = sum(anzahl_6und7_500_1)
P(n) = N * lambda^big(n) * exp(-lambda) / factorial(big(n))


# Plot
bar!(0:25, P, label=LaTeXString("\$\\lambda = \$lambda, \\mathrm{Proben}\\ } A+B,  $\square$ 
 $\hookrightarrow$  500\\mathrm{\\,V}\\$"), alpha=0.5)

xlabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Zerfälle\ in\ }0.2\mathrm{\,s}")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")

# Plot Faustregel
vline!([10], color=:red, label="")

```

[17]:



```
[18]: savefig(allePoisson, "../media/B3.1/allePoisson.pdf");
```

## 1.4 2: Gaußverteilung

```
[19]: n = 8 # Binning (für alle Messungen gleich)
      Δt = 5 # (für alle Messungen gleich)

      G(x, m, F, n=8) = 1/sqrt(2 * pi * m) * F * sqrt(n) * exp(- (x - m)^2 / (2 * m / n))
```

[19]: G (generic function with 2 methods)

Sample 6, 500V, 45min,  $\Delta T = 5s$ , binning = 8:

```
[20]: # Messdaten mit ΔT = 5s, binning = 8
      anzahl_6_500_2 = [2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,3,18,47,107,123,120,80,29,8,1,0,0,0]

      # Schneide interessanten Bereich hereaus
      zerfälle_6_500_2 = 16:28
      anzahl_6_500_2 = anzahl_6_500_2[zerfälle_6_500_2]

      # Passende Gaußverteilung:
```

```


z_strich = 11044/300 # Aus Kurzmessung
m = z_strich * Δt / n
F = sum(anzahl_6_500_2)
G(x) = G(x, m, F)

# Plot
gauß1 = plot(bar(zerfälle_6_500_2.
    ↪-1,anzahl_6_500_2,label=L"\mathrm{Messdaten}"), legend=:none)
plot!(G,color=:red,label=L"\mathrm{Gauß}")

xlabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Zerfälle\ in\ }5\mathrm{\,s}")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")

```

[20]:



[21]: [m,F,z\_strich]

[21]: 3-element Vector{Float64}:  
 23.008333333333333  
 539.0  
 36.81333333333333

[22]: savefig(gauß1, "../media/B3.1/gauss1.pdf");

Sample 6, 600V, 45min,  $\Delta T = 5\text{s}$ , binning = 8:




```
[24]: 3-element Vector{Float64}:  
      26.910416666666666  
      539.0  
      43.056666666666665
```

```
[25]: savefig(gauß2, "../media/B3.1/gauss2.pdf");
```

Sample 6 + 7, 500V, 45min,  $\Delta T = 5s$ , binning = 8:

```
[26]: # Messdaten mit  $\Delta T = 5\text{s}$ , binning = 8  
anzahl_6und7_500_2 =  
    [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,  
     5,12,63,101,130,  
     29,7,4,0,0]  
  
# Schneide interessanten Bereich hereaus  
zerfälle_6und7_500_2 = 37:48  
anzahl_6und7_500_2 = anzahl_6und7_500_2[zerfälle_6und7_500_2]  
  
# Passende Gaußverteilung:  
z_strich = 20300/300 # Aus Kurzmessung  
m = z_strich *  $\Delta t$  / n  
F = sum(anzahl_6und7_500_2)  
G(x) = G(x, m, F)  
  
# Plot  
gauß3 = plot(bar(zerfälle_6und7_500_2.  
    [-1, anzahl_6und7_500_2], label=L" $\mathrm{Messdaten}$ ", legend=:none)  
plot!(G,color=:red,label=L" $\mathrm{Gauß}$ ")  
xlabel!(L" $\mathrm{Anzahl}\ \mathrm{der}\ \mathrm{Zerfälle}\ \mathrm{in}\ 5\ \mathrm{s}$ ")  
ylabel!(L" $\mathrm{Anzahl}\ \mathrm{der}\ \mathrm{Messungen}$ ")
```

[26] :



```
[27]: [m,F,z_strich]
```

```
[27]: 3-element Vector{Float64}:
      42.29166666666667
      539.0
      67.66666666666667
```

```
[28]: savefig(gauß3, "../media/B3.1/gauss3.pdf");
```

```
[29]: G(x) = G(x, m, F)
      m = 1
      plot(G, xaxis=[-1,15], label="m=$m")
      m=2
      plot!(G, label="m=$m")
      m=3
      plot!(G, label="m=$m")
      m=4
      plot!(G, label="m=$m")
      m=5
      plot!(G, label="m=$m")
      m=6
      plot!(G, label="m=$m")
      m=7
```




```

plot!(G, label="m=$m")
m=8
plot!(G, label="m=$m")
m=9
plot!(G, label="m=$m")
m=10
plot!(G, label="m=$m")

```

[29]:



### 1.5 3: Intervall-Verteilung

#### Plotten der Messwerte

```

[30]: interval0 = CSV.read("sample_6/500V_45min/interval_0.001_1.csv", DataFrame)
interval1 = CSV.read("sample_6/500V_45min/interval_0.001_2.csv", DataFrame)
interval2 = CSV.read("sample_6/500V_45min/interval_0.001_3.csv", DataFrame)
;

```


```

[31]: # Sample 6, 500V, 45min
interval = bar(interval0[1:200, :intervall], interval0[1:200, :count], alpha=0.
    ↪5, label=L"n = 0")
bar!(interval1[1:200, :intervall], interval1[1:200, :count], alpha=0.5, ↪
    ↪label=L"n = 1")
bar!(interval2[1:200, :intervall], interval2[1:200, :count], alpha=0.5, ↪
    ↪label=L"n = 2")

```

```
xlabel!(L"\mathrm{Zeitdifferenz\ } [\mathrm{ms}]]")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\ der\ Messungen}")
```

[31]:




[32]: `savefig(interval, "../media/B3.1/interval.pdf");`

### Fitten für $n=0$

- Alle Messwerte im Bereich  $t \in [0, \text{totzeit}]$  abschneiden und den Rest fitten

```
[33]: # Plot
totzeitIndex = 8
intervalFit = bar(interval0[1:totzeitIndex, :intervall], interval0[1:
    ↪totzeitIndex, :count],
    color=:red, alpha=0.3, label=L"\mathrm{Für\ Fit\ ausgeschlossene\ }
    ↪Messwerte}", title="", legend=:topright)
bar!(interval0[(totzeitIndex+1):100, :intervall],
    interval0[(totzeitIndex+1):100, :count], color=:blue, alpha=0.5,
    ↪label=L"\mathrm{Für\ Fit\ betrachtete\ Messwerte}", title="")
```

[33]:




```
[34]: # Intervallverteilung mit skaliertem N (für n = 0)
a = 0.043 # Fitparameter zwischen 0.042 und 0.044
T = 2700 # s Gesamtdauer der Messung = 45 min oder letzter gemessener Zeitpunkt?
N = 1000*T * a # Normierungskonstante
I(t) = N * a * exp(- a * t)
```

```
[34]: I (generic function with 1 method)
```

```
[35]: plot!(totzeitIndex:100,I,label=LaTeXString("\$\\mathrm{Theoretische\\_}
↪Intervallfunktion\\ mit\\ } a = \$a \\mathrm{\\,ms^{-1}}\$"), color=:red)

xlabel!(L"\mathrm{Zeitdifferenz\\ } [\mathrm{ms}]")
ylabel!(L"\mathrm{Anzahl\\ der\\ Messungen}")
```

```
[35]:
```



```
[36]: T/1000
```

```
[36]: 2.7
```

```
[37]: savefig(intervalFit, "../media/B3.1/intervalFit.pdf");
```

## 1.6 4: Totzeit

### 1.6.1 Aus Intervallverteilung

$$a = a' / (1 - a' * \tau)$$

$$\Leftrightarrow \tau = 1/a' - 1/a$$

Benötigt  $a$  aus der Intervallverteilung. Falls  $a$  nicht schon definiert ist, wird es hier definiert:

```
[38]: if ! isdefined(Main, :a)
      a = 0.043
    end
```

```
[39]: a_strich = 11044/300 * 10^(-3) # ms Gemessene Zählrate aus Kurzzeitmessung
      tau = 1/a_strich - 1/a # ms
```

```
[39]: 3.908257035283807
```

### Aus kurzen Messungen

```
[40]: short_measures = CSV.read("short_measurements.csv", DataFrame)
short_measures.rates = short_measures.count ./ short_measures.seconds
short_measures.rate_errors = sqrt.(short_measures.rates);

short_measures.rate_w_error = measurement.(short_measures.rates, short_measures.
↳rate_errors)
short_measures
```

```
[40]:
```

|    | sample_name | seconds | voltage | count | rates   | rate_errors | rate_w_error   |
|----|-------------|---------|---------|-------|---------|-------------|----------------|
|    | String15    | Int64   | Int64   | Int64 | Float64 | Float64     | Measurem...    |
| 1  | sample_6_7  | 300     | 500     | 20300 | 67.6667 | 8.22598     | $67.7 \pm 8.2$ |
| 2  | sample_6_7  | 300     | 550     | 25509 | 85.03   | 9.22117     | $85.0 \pm 9.2$ |
| 3  | sample_6_7  | 300     | 600     | 28522 | 95.0733 | 9.75056     | $95.1 \pm 9.8$ |
| 4  | sample_6    | 300     | 500     | 11044 | 36.8133 | 6.0674      | $36.8 \pm 6.1$ |
| 5  | sample_6    | 300     | 550     | 12260 | 40.8667 | 6.3927      | $40.9 \pm 6.4$ |
| 6  | sample_6    | 300     | 600     | 12917 | 43.0567 | 6.56176     | $43.1 \pm 6.6$ |
| 7  | sample_7    | 300     | 500     | 15833 | 52.7767 | 7.26476     | $52.8 \pm 7.3$ |
| 8  | sample_7    | 300     | 550     | 17914 | 59.7133 | 7.72744     | $59.7 \pm 7.7$ |
| 9  | sample_7    | 300     | 600     | 19421 | 64.7367 | 8.04591     | $64.7 \pm 8.0$ |
| 10 | no_sample   | 300     | 500     | 2396  | 7.98667 | 2.82607     | $8.0 \pm 2.8$  |
| 11 | no_sample   | 300     | 550     | 2513  | 8.37667 | 2.89425     | $8.4 \pm 2.9$  |
| 12 | no_sample   | 300     | 600     | 2550  | 8.5     | 2.91548     | $8.5 \pm 2.9$  |

```
[41]: function totzeit_in_milliseconds(data, voltage)
    filtered_voltage = short_measures[short_measures.voltage .== voltage, :]

    n6 = filtered_voltage[filtered_voltage.sample_name .== "sample_6", :
↳rate_w_error][1]
    n7 = filtered_voltage[filtered_voltage.sample_name .== "sample_7", :
↳rate_w_error][1]
    n67 = filtered_voltage[filtered_voltage.sample_name .== "sample_6_7", :
↳rate_w_error][1]
    n0 = filtered_voltage[filtered_voltage.sample_name .== "no_sample", :
↳rate_w_error][1]

    A = n0*n67*n7-n6*n67*n7+n0*n67*n6-n0*n6*n7
    B = -2*n67*n0+2*n6*n7
    C = n67-n6+n0-n7

    t1 = (-B+sqrt(B^2 - 4*A*C))/(2*A) * 1000
    t2 = (-B-sqrt(B^2 - 4*A*C))/(2*A) * 1000

    return t1, t2
end
```

```
[41]: totzeit_in_milliseconds (generic function with 1 method)
```

Ermittle realistische Totzeiten

```
[42]: tau_1 = totzeit_in_milliseconds(short_measures, 500)[1]
      tau_2 = totzeit_in_milliseconds(short_measures, 550)[1]
      tau_3 = totzeit_in_milliseconds(short_measures, 600)[1];
```

Stelle alle Totzeiten als L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Tabelle dar

```
[43]: digits = 2

      for voltage in (500, 550, 600)
        print("\$${voltage}\$")
        for t in totzeit_in_milliseconds(short_measures, voltage)
          value = round(Measurements.value(t), digits=digits)
          uncert = round(Measurements.uncertainty(t), digits=digits)
          print(" & \$${value} \pm \$${uncert}\$")
          perc = round(Integer, uncert / value * 100)
          print(" \$$(\pm \$${perc} \%,\%)$\$")
        end
        println(" \\\\")
      end
```

```
$500$ & $6.41 \pm 5.72$ $(\pm 89 \%,\%)$ & $22.04 \pm 2.62$ $(\pm 12 \%,\%)$ \\\
$550$ & $2.32 \pm 4.4$ $(\pm 190 \%,\%)$ & $19.79 \pm 2.12$ $(\pm 11 \%,\%)$ \\\
$600$ & $1.13 \pm 3.85$ $(\pm 341 \%,\%)$ & $18.51 \pm 1.91$ $(\pm 10 \%,\%)$ \\\
```


## 1.7 5: Aufgaben zum $\chi^2$ -Test

Benötigt Totzeit.

Daten einlesen

```
[44]: data = CSV.File("sample_6_7/500V_45min/divide_10.csv")
      scatter(0:length(data), data.Zerfälle_in_10_sec)
```

[44]:



```
[45]: pos_min = 0
      pos_max = 50
      x_data = pos_min:pos_max
      decays = data.Zerfälle_in_10_sec[x_data.+1]

      avg_decays = mean(decays)
```

```
[45]: 653.8039215686274
```

```
[46]: std(decays)
```

```
[46]: 16.509415020336895
```

```
[47]: avg_decays
```

```
[47]: 653.8039215686274
```

```
[48]: avg_decays_corrected = avg_decays / (1 - a_strich*tau)
```

```
[48]: 763.6789739437968
```

```
[49]: avg_decays_corrected/avg_decays
```

```
[49]: 1.1680550525172038
```

```
[50]: decays_corrected = decays ./ (1 .- a_strich*tau);
```

### 1.7.1 1. Hypothesen

Zeigen Sie zeichnerisch, was die Hypothesen a, b und c besagen.

- a: Die Präparatstärke ist konstant im betrachteten Zeitraum und gleicht dem Mittelwert der 51 Messwerte.
- b: Die Präparatstärke ist konstant im betrachteten Zeitraum und gleicht dem Mittelwert der 51 Messwerte minus 10%.
- c: Die Präparatstärke nimmt im betrachteten Zeitraum linear mit der Zeit ab (als erste Näherung eines exponentiellen Abfalls). Die Anfangszählrate ist der Mittelwert, und der Abfall von einer Messung zur anderen sei 1.

Hypothese  $H_1$ : “Die Präparatstärke ist konstant im betrachteten Zeitraum und gleicht dem Mittelwert der 51 Messwerte.”

Diese Hypothese besagt, jeder erwartete Zählmenge  $n_1(i)$  sei gleich dem Mittelwert der 51 Messungen  $n_i$ .

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \bar{n} \\ n_1(i) &= \frac{1}{51} \sum_{i=1}^{51} n_i \\ \chi_1^2 &= \sum_i \frac{(n_i - \bar{n})^2}{\bar{n}}\end{aligned}$$

Hypothese  $H_2$ : “Die Präparatstärke ist konstant im betrachteten Zeitraum und gleicht dem Mittelwert der 51 Messwerte minus 10%.”

Dies bedeutet, dass die erwarteten Zählungen  $n_2(i)$  um 10% kleiner als die Zählungen nach  $H_1$  sein müssen.

$$\begin{aligned}n_2(i) &= \frac{9}{10} \cdot n_1(i) \\ \chi_2^2 &= \sum_i \frac{(n_i - 0.9\bar{n})^2}{0.9\bar{n}}\end{aligned}$$

Hypothese  $H_3$ : “Die Präparatstärke nimmt im betrachteten Zeitraum linear mit der Zeit ab (als erste Näherung eines exponentiellen Abfalls). Die Anfangszählrate ist der Mittelwert, und der Abfall von einer Messung zur anderen sei 1.”

Die erwarteten Ereignisse starten demnach bei  $n_1(0)$  und fallen dann linear mit einer Steigung von 1 ab.

$$\begin{aligned}n_3(i) &= n_1(0) - i \\ \chi_3^2 &= \sum_i \frac{(n_i - (n - i))^2}{(n - i)}\end{aligned}$$



```

[51]: function plot_hypotheses(x_data, decays, title; legend_pos)
    scatter(x_data, decays, label=L"\mathrm{Messwerte}", legend=legend_pos,
    ↪yrange=[580, 830])

    title!(title)
    xlabel!(L"\mathrm{Zeit}\ [10\mathrm{\,s}]")
    ylabel!(L"\mathrm{Ereignisse}\ \left[(10\,\mathrm{s})^{-1}\right]")

    h1_results = fill(mean(decays), length(x_data))

    plot!(
        x_data,
        h1_results,
        label=L"H_1",
        color=:red4,
        lw=2
    )

    plot!(
        x_data,
        0.9 .* h1_results,
        label=L"H_2",
        color=:darkgreen,
        lw=2
    )

    plot!(
        x_data,
        h1_results .- x_data,
        label=L"H_3",
        color=:navy,
        lw=2
    )
end

```

[51]: plot\_hypotheses (generic function with 1 method)


```

[52]: plot_hypotheses(x_data, decays, L"\mathrm{unkorrigierte\ Messwerte\ und\,
    ↪Hypothesen\ } H_i", legend_pos=:topright)

```

[52]:

# unkorrigierte Messwerte und Hypothesen $H_i$




```
[53]: savefig("../media/B3.1/Hypothesen_plot.svg")
      savefig("../media/B3.1/Hypothesen_plot.pdf");
```

```
[54]: plot_hypotheses(x_data, decays_corrected, L"\mathrm{totzeitkorrigierte\_\_}
      ↪Messwerte\ und\ Hypothesen\ } H_i"; legend_pos=:bottomright)
```

```
[54]:
```

### totzeitkorrigierte Messwerte und Hypothesen $H_i$



```
[55]: savefig("../media/B3.1/Hypothesen_plot_corr.svg")
      savefig("../media/B3.1/Hypothesen_plot_corr.pdf");
```

Man Erkennt, dass  $H_1$  die Messwerte am besten beschreibt.

#### 1.7.2 2. Hypothesentest

Nun werden die drei Hypothesen  $H_i$  mithilfe des  $\chi^2$ -Tests geprüft. Hierzu werden 51 Messwerte aus der 45 min-Messung beider Proben gewählt, deren Zählungen über 10s gemittelt werden. Dies wird sowohl für die nicht-totzeitkorrigierten als auch für die totzeitkorrigierten Daten durchgeführt.

Durch die Bildung des Mittelwertes gibt es noch 50 statistische Freiheitsgrade. Dadurch können die erlaubten Grenzen für  $\chi^2$  für ein System mit 50 Freiheitsgraden und einer Signifikanz von 5% verwendet werden [6].

$$\chi_{\min}^2 = 32.357$$

$$\chi_{\max}^2 = 71.420$$

unkorrigiert

$$\chi_1^2 = \sum_i \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\bar{x}}$$

$$\chi_2^2 = \sum_i \frac{(x_i - 0.9 \bar{x})^2}{0.9 \bar{x}}$$

$$\chi_3^2 = \sum_i \frac{(x_i - (\bar{n} - i))^2}{(\bar{n} - i)}$$

```
[56]: chi_squared_1 = sum((decays .- avg_decays).^2 ./ avg_decays)
```

```
[56]: 20.84422984644914
```

```
[57]: (1 - chi_squared_1 / 32.357)*100
```

```
[57]: 35.58046219844504
```

```
[58]: chi_squared_2 = sum((decays .- 0.9*avg_decays).^2 ./ (0.9*avg_decays))
```

```
[58]: 393.6491442738329
```

```
[59]: chi_squared_2 / 71.420
```

```
[59]: 5.511749429765232
```

```
[60]: chi_squared_3 = sum((decays .- (avg_decays .- x_data)).^2 ./ (avg_decays .-  
↪x_data))
```

```
[60]: 106.02106295610936
```

```
[61]: chi_squared_3 / 71.420
```

```
[61]: 1.4844730181477088
```

totzeitkorrigiert

$$\chi_{i,\text{kor}}^2 = \frac{1}{1 - \frac{m}{\Delta t} \tau} \cdot \chi_i^2$$

```
[62]: chi_squared_1_corrected = 1 / (1-a_strich*tau) * chi_squared_1
```

```
[62]: 24.34720798797481
```

```
[63]: (1 - chi_squared_1_corrected / 32.357)*100
```

```
[63]: 24.75443339007074
```

```
[64]: chi_squared_2_corrected = 1 / (1-a_strich*tau) * chi_squared_2
```

```
[64]: 459.80387188812415
```

```
[65]: chi_squared_2_corrected / 71.420
```

```
[65]: 6.438026769646095
```

```
[66]: chi_squared_3_corrected = 1 / (1-a_strich*tau) * chi_squared_3
```

```
[66]: 123.83843825912807
```

```
[67]: chi_squared_3_corrected / 71.420
```

```
[67]: 1.7339462091728937
```

### 1.7.3 3. Halbwertszeit

Welche Halbwertszeit ergibt sich aus der Hypothese c, wenn Sie einen zeitlichen Abstand der Messungen von 10 Sekunden annehmen als Näherung eines exponentiellen Zerfalls?

Nun soll nach Hypothese  $H_3$  die Halbwertszeit  $T_{1/2}$  der Proben bestimmt werden. Hierzu wird der exponentielle Zerfall durch eine lineare Kurve beschrieben. Es wird erwartet, dass diese Halbwertszeit deutlich geringer als die ca. 30yr der Probe ist.

Dabei wird davon ausgegangen, dass innerhalb der Messdauer  $\Delta t = 10\text{s}$  der Wert  $N_0$  um 1 sinkt. Weiterhin wird die Halbwertszeit nach Gleichung ?? bestimmt. Nach Hypothese  $H_3$  ist  $N(0) = \bar{n}$  der Mittelwert der Zählraten.

```
[68]: T_12 = Integer(round(10 * log(2) / log(avg_decays/(avg_decays-1)))) # seconds
println(T_12, " seconds")
```

```
T_12_str = string("\$T_{1/2}(m^\prime)=", Integer(round(T_12/3600)), "\u2192", "\u2192", "\mathrm{h}\u2192", Integer(round(T_12%60)), "\u2192", "\mathrm{min}\u2192", "\$")
println(T_12_str)
latexstring(T_12_str)
```

4528 seconds

$\$T_{1/2}(m^\prime)=1\backslash,\mathrm{h}\backslash,28\backslash,\mathrm{min}\backslash\$$

```
[68]:  $T_{1/2}(m') = 1\text{ h }28\text{ min}$ 
```

```
[69]: T_12_corr = Integer(round(10 * log(2) / log(avg_decays_corrected/
    \u2192(avg_decays_corrected-1)))) # seconds
println(T_12_corr, " seconds")
```

```
T_12_corr_str = string("\$T_{1/2}(m)=", Integer(round(T_12_corr/3600)), "\u2192", "\u2192", "\mathrm{h}\u2192", Integer(round(T_12_corr%60)), "\u2192", "\mathrm{min}\u2192", "\$")
println(T_12_corr_str)
latexstring(T_12_corr_str)
```

5290 seconds

$\$T_{1/2}(m)=1\backslash,\mathrm{h}\backslash,10\backslash,\mathrm{min}\backslash\$$

```
[69]:  $T_{1/2}(m) = 1\text{ h }10\text{ min}$ 
```