

E判定逆転30日プログラム | 特典PDF ①

TOKUTEN PDF 01

夜食対策表

意志力ゼロで「夜の崩れ」を止める
状況別・完全対処マニュアル

5

欲求タイプ

3

分プロトコル

30+

置き換え食品

Longevity Navigator / マーシー | -32kg × サブ3

このPDFの使い方

読み込む必要はありません。困ったときに開くリファレンスです。

このPDFは、「**夜食を食べたくなった瞬間**」に開くためのものです。スマホのホーム画面に保存、または印刷してキッチンに貼るのが最も効果的な活用法です。

パート	内容	使うタイミング
PART 1	夜食欲求の正体	「なぜ食べたくなるか」を理解したいとき
PART 2	状況別・対処マップ	「今夜食べたい」と思った瞬間
PART 3	置き換えフード完全リスト	「何を食べればいいのか」迷ったとき

ルール：完璧にやろうとしなくていいです。このシートを開いた時点で、すでに一歩踏み留まっています。それだけで十分です。

PART 1 夜食欲求の正体を知る

意志力の問題ではなく、ホルモンと環境の問題です

夜に食欲が増すのは体の設計上、当然のことです。理由は4つあります。

1

コルチゾールの蓄積

日中のストレスでコルチゾール（ストレスホルモン）が蓄積されます。コルチゾールは高カロリー食（脂質＋糖質の組み合わせ）への欲求を強く引き起こします。忙しい日ほど夜の食欲が強いのはこのためです。

2

グレリンの上昇（睡眠不足）

睡眠6時間未満でグレリン（食欲促進ホルモン）が24%増加、レプチン（満腹ホルモン）が18%減少します（Spiegel et al., 2004）。睡眠が少ない夜ほど夜食欲求が強くなる直接の原因です。

3

血糖値の底打ち

夕食後3〜4時間で血糖値が下降し「軽い低血糖状態」になります。脳はエネルギー不足と判断し緊急食欲信号を送ります。夜10〜11時の「甘いものが無性に欲しい」の正体です。

4

習慣の自動起動（条件反射）

「帰宅→ソファ→お菓子」が習慣化されると、帰宅ただけで食欲回路が起動します。これはパブロフの条件反射と同じメカニズムです。食べたいのではなく、ルーティンが勝手に動いているだけです。

**意志力で止めようとするから止まらない。
原因がわかれば、仕組みで対処できます。**

今夜の欲求はどのタイプ？

タイプによって対処法が変わります

タイプ	特徴・サイン	主な原因
A ストレス食 い	イライラ・もやもやしている。甘い・脂っこいものが欲しい	コルチゾール蓄積
B 習慣食い	特に食べたいわけじゃないが手が動く。帰宅後の流れで	条件反射・習慣の自動起動
C 本物の空腹	胃がキュルキュル言っている。何でも食べたい	夕食量が少なかった
D 口寂しい	何かを口に入れたいだけ。退屈・手持ち無沙汰	刺激不足・習慣
E 睡眠不足型	眠いののに目が冴えている。甘いものを強烈に求めている	グレリン上昇・睡眠不足

本物の空腹かどうかの確認法：

「ブロッコリーが食べたいか」と自問してください。何でもいいから食べたいなら本物の空腹。チョコやポテチなど特定のものだけ食べたいなら、別タイプの欲求です。

PART 2 状況別・対処マップ

タイプA ストレス食い

まず3分やること

- ① スマホを伏せて置く
- ② 4-7-8呼吸を3回（4秒吸う→7秒止める→8秒で吐く）
- ③ 「今夜のストレスの原因」を1行メモに書く
→ 呼吸でコルチゾールが低下。メモで感情を外に出す。

それでも食べたい場合

PART 3「Aタイプ向け」置き換えリストから選ぶ

● 環境チェック

視界にお菓子が見えていないか確認 → 見えている場合は棚の奥に移動

タイプB 習慣食い

● まず10分やること

- ① 歯を磨く（これだけで食べる気が大幅に低下します）
 - ② 部屋を暗くして横になる
 - ③ スマホを寝室と別の部屋に置く
- 帰宅→ソファ→お菓子の連鎖の「きっかけ」を断ち切る

● 明日以降の設計改善

帰宅後すぐ着替えてシャワーを浴びるルーティンを挿入する → 従来の条件反射を書き換える

タイプC 本物の空腹

まず確認

水を200ml飲む → 20分待つ。それでも空腹なら本物の空腹として食べてOK。

食えるときのルール

PART 3「Cタイプ向け」から選ぶ。食べる量は「手のひら1杯分」を目安に。

タイプD 口寂しい

まず試すこと（カロリーゼロ）

- ① 強炭酸水を飲む（ウィルキンソン推奨）
- ② キシリトールガムを噛む
- ③ ハーブティーを淹れる（準備の時間で欲求が収まることも）

それでも口寂しい場合

PART 3「Dタイプ向け」から選ぶ。食べることを責めない。カロリーへの影響を最小化しながら欲求を満たすことが目標。

タイプE 睡眠不足型

今夜の最優先事項：寝ること

睡眠不足型の夜食欲求は、食べても解消されません。グレリンは睡眠によってしか正常化しないからです。

今すぐやること

- ① スマホを別の部屋に置く
- ② 部屋の照明を最も暗い設定にする
- ③ 布団に入る（眠れなくてもOK。横になるだけでいい）

どうしても眠れない場合

ホットミルク1杯（トリプトファンが睡眠促進）またはバナナ1/2本を食べてから就寝してください。

PART 3 置き換えフード完全リスト

3基準：低GI / 高タンパク or 高食物繊維 / コンビニで買える

タイプA ストレス食い向け

食べたいもの	置き換え	理由
ポテチ	素焼きミックスナッツ（一握り・約30g）	血糖値スパイクなし。良質な脂質
チョコ	カカオ72%以上のチョコ（2〜3片）	ポリフェノールで抗ストレス効果
アイス	冷凍ブルーベリー（50g）	自然な甘み・低GI・抗酸化物質豊富
スナック菓子	焼き海苔（3〜4枚）	低カロリー・ミネラル豊富・咀嚼満足感
揚げ物	ゆで卵1個＋からし少量	タンパク質で10分後に食欲が落ち着く

タイプB 習慣食い向け

置き換え	おすすめ商品・作り方	効果
強炭酸水	ウィルキンソン炭酸水（レモン）	口の刺激を代替。食欲抑制
ハーブティー	カモミール or ペパーミントティー	副交感神経優位・食欲抑制
スルメ（細く）	細く裂いて1〜2本	咀嚼回数多く満足感高い・低カロリー
寒天ゼリー	砂糖不使用の寒天ゼリー	カロリーほぼゼロ・食べた感あり
キシリトールガム	どの銘柄でも可	噛む行為への欲求を直接満たす

タイプC 本物の空腹向け

食品	量の目安	選ぶ理由
ギリシャヨーグルト	100〜150g	高タンパク・腹持ちが良い
ゆで卵	1〜2個	タンパク質で空腹を素早く満たす
豆腐（冷奴）	1/2丁	低カロリー・高タンパク

食品	量の目安	選ぶ理由
納豆	1パック	発酵食品・腸内環境にも良い
バナナ	1/2本	素早いエネルギー補給・半分で止める
タイプD 口寂しい向け		タイプE 睡眠不足型向け
☐ 強炭酸水（最優先）		☐ ホットミルク200ml（トリプトファン）
☐ スルメ（咀嚼欲求を直接満たす）		☐ バナナ1/2本（マグネシウム）
☐ 焼き海苔（低カロリー）		☐ カモミールティー（GABA作用）
☐ キシリトールガム		最優先は「寝ること」です。
☐ お茶を淹れる（準備時間で欲求消化）		

⚡ 緊急時3分プロトコル

1 水を1杯飲む（30秒）

空腹感の多くは脱水です。水200mlで血糖値も少し安定します。

2 歯を磨く（1分）

歯磨き後の食欲は心理的に大幅に低下します。これだけで解決することも多い。

3 4-7-8呼吸を3回（1分30秒）

4秒吸う→7秒止める→8秒で吐く。コルチゾールが下がり食欲への切迫感が和らぎます。

4 それでも食べたいなら置き換えリストから選ぶ

ここまでやって食べるなら、それは本物の欲求。責めずに置き換えを。

今週やること：環境設計チェックリスト

一度やれば、毎晩の意志力が不要になります

▶ 買い物リスト（置き換えフードの備蓄）

☐ 素焼きミックスナッツ（大袋。小分けして保存）

☐ カカオ70%以上チョコレート

☐ ウィルキンソン強炭酸水（ケース買い推奨）

☐ ギリシャヨーグルト（複数個ストック）

☐ カモミールティー or ハーブティー

☐ ゆで卵（週初めに5個まとめてゆでておく）

▶ 冷蔵庫の配置変え

☐ 目線の高さ → ゆで卵・ギリシャヨーグルト・野菜を置く

☐ 目線より上 → チョコ・ナッツ（食べてもいいが見えにくく）

☐ 冷凍庫の一番奥・一番下 → アイス類を移動

▶ リビングの整理

☐ テーブルの上：食べ物をゼロにする

☐ 炭酸水をリビングのすぐ手の届く場所に置く

☐ お菓子のストックをリビングから別の部屋へ移動

マーシーより

環境を変えるのに意志力は要りません。最初の10分だけ集中してください。棚を整理して、冷蔵庫を並び替えて、炭酸水を買ってくる。それだけで、毎晩の「戦い」がなくなります。

僕は環境を変えた週から、夜食を一切我慢せずにほぼゼロになりました。意志は使っていません。環境が自動的に行動を変えてくれたからです。