

E判定逆転30日プログラム | 特典PDF ②

TOKUTEN PDF 02

崩れ復帰 チェックシート

「また失敗した」を「データが取れた」に変える
72時間リセットガイド

72

時間で戻る

7

セクション

0

自己嫌悪

Longevity Navigator / マーシー | -32kg × サブ3

このシートを使う前に

崩れたことは、失敗ではありません。

意志が弱かったわけでも、プログラムが終わったわけでも、あなたがダメな人間なわけでもありません。特定のコンディションと環境が重なったとき、人間は誰でも崩れます。僕も今でも崩れます。

このシートの目的は「反省して気合を入れ直すこと」ではありません。「なぜ崩れたかのデータを取り、次の設計を1つだけ変えること」です。

セクション	内容	所要時間
SECTION 1	崩れの記録	2分
SECTION 2	原因分析チェック	3分
SECTION 3	深刻度の確認	30秒
SECTION 4	感情の処理（重い場合のみ）	5分
SECTION 5	72時間リセットプロトコル	実行するだけ
SECTION 6	崩れパターン分析（繰り返し使用）	5分
SECTION 7	再スタートガイド（1週間以上崩れた場合）	5分

SECTION 1 崩れの記録（2分）

感情は書かなくていいです。事実だけ書きます。

記録日

年 月 日

何を食べました
か？

何時頃ですか？

食べた量

☐ 少し ☐ 普通 ☐ 多め ☐ かなり多い

SECTION 2 崩れの原因分析（3分）

当てはまるものに✓をつけてください（複数可）

▶ コンディション系

☐ 睡眠が6時間未満だった

☐ 仕事・人間関係でストレスが高かった

☐ 体調が優れなかった

☐ 疲労度が特に高い1日だった

▶ 環境系

☐ 家に「崩れの原因」食品があった

☐ コンビニや飲食店に立ち寄った

☐ 視界に食べ物があった

☐ 飲み会・外食があった

▶ 習慣・トリガー系

☐ 帰宅後の習慣でつい食べた

☐ テレビ・スマホを見ながら食べた

☐ 「今日だけいいや」と思った

☐ 最初の1口が止まらなかった

▶ その他

☐ 夕食の量が少なかった（本物の空腹）

☐ 理由がわからない

☐ その他： _____

SECTION 3 深刻度の確認（30秒）

 レベル1：1回、置き換えできないものを食べた

→ 気にしなくてOK。次の食事だけ整えましょう。このシートの残りは読まなくていいです。

 レベル2：夜食を複数回食べた（1日）

→ SECTION 5の72時間プロトコルを実行してください。

 レベル3：2～3日連続で崩れている

→ SECTION 4の「感情処理」から始めてください。

 レベル4：1週間以上崩れ続けている

→ SECTION 7の「再スタートガイド」を使用してください。

SECTION 4 感情の処理

感情が重い場合のみ。行動より先に感情を処理します。

自己嫌悪が強い場合は、行動より先に感情を処理します。以下の質問に、思ったことをそのまま書いてください。正解はありません。

Q1. 今、自分に対してどんな言葉が浮かびますか？

Q2. もし親友が同じ状況だったら、あなたは何と言いますか？

Q3. Q2の言葉を、今の自分に言ってみてください。（頭の中だけでOK）

自分に厳しすぎる人は、他人には優しい言葉をかけられるのに自分にだけ残酷になります。あなたが親友に言える言葉は、あなた自身にも言っているいい言葉です。

SECTION 5 72時間リセットプロトコル

崩れた翌日から72時間、この順番で動いてください。

崩れた当日（夜）

☐ これ以上食べるのをやめる（「今日はもう終わり」ではなく「今夜はここで止める」）

☐ 歯を磨く

☐ 炭酸水か白湯を1杯飲む

☐ 就寝時間を通常より30分早める

☐ 「明日の朝食に何を食べるか」だけ決めておく（例：卵2個と味噌汁）

翌朝（D+1）

☐ 体重計に乗る（増えていてもOK。多くは水分の重さ。脂肪は2～3日後に正確な値が出ます）

☐ SECTION 1～2の記録を書く（まだの場合）

☐ 朝食を「食べる順番ルール」で食べる（野菜orタンパク→最後に炭水化物）

☐ 水を500ml飲む（午前中）

☐ いつも通りの1日を過ごす（特別なことは何もしなくてOK）

翌々日（D+2）

☐ 昨日の食事は整えられたか確認 → NoならYes今日の昼食だけ整える

☐ 就寝時間を守れたか確認 → Noなら今夜だけ30分早く寝る

☐ 体が重ければ15分だけ歩く（運動ではなく気分転換として）

☐ 置き換えフードの在庫を確認・補充する

72時間後（D+3）

☐ SECTION 6の「崩れパターン分析」を記入する

☐ 設計の改善点を1つだけ決める（例：チョコを棚の奥に移動する）

☐ 「戻れた」と自分に言う

☐ 次の1週間を始める

SECTION 6 崩れパターン分析

繰り返し使用してください。5回分記録するとパターンが見えます。

#	日付	曜日	睡眠時間	ストレス度	主な原因	戻るまでの日数
1				高 / 中 / 低		
2				高 / 中 / 低		
3				高 / 中 / 低		
4				高 / 中 / 低		
5				高 / 中 / 低		

5回分記録できたら書いてください

崩れやすい曜日・時間帯：

崩れる前日・当日の共通点：

最速で戻れたときにやっていたこと：

SECTION 7 再スタートガイド

1週間以上崩れ続けている場合

1

今日を「Day 1」に設定し直す

これまでの崩れをすべてリセット。帳消し。ゼロからのスタートです。

2

Week 1の「睡眠を整える」だけに戻る

食事運動も今週は全部手放す。就寝時間を固定することだけをやります。

3

3日間だけ就寝時間を守る

3日間続けられたら、食事の順番を再開する。それ以上は求めない。

4

また崩れてもOK → またSTEP 1に戻るだけ

このループに終わりはありません。何度でも戻ってきていいです。

自分への手紙

未来の自分から、今日の自分へ

未来のあなたより