## Analízis II F ZH 1 2021.10.21

1. Keresse meg azokat az  $a, b \in \mathbb{R}$  paramétereket, hogy differenciálható legyen az alábbi függvény minden  $x \in \mathbb{R}$  esetén! (10 pont)

$$f(x) = \begin{cases} a \cdot \arctan(bx) + (x+a)e^x, & \text{ha } x \le 0, \\ x^2 + 2x + 3a - \frac{b}{x+1}, & \text{ha } x > 0. \end{cases}$$

2. Keresse meg azt a maximális területű téglalapot amelynek egyik oldala az x tengelyen fekszik, és két csúcsa az

$$f(x) := \frac{1}{1 + x^2} \qquad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonján helyezkedik el! (10 pont)

3. L'Hospital-szabály segítségével számítsuk ki az alábbi határértékeket!(4+6 pont)

$$a)\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\frac{\pi}{2}-x)}{x^2+\sin(2x)},$$

$$b)\lim_{x\to 0+0} (\sin x)^{\operatorname{tg} x}.$$

4. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázolja az

$$f(x) := \frac{x}{2} + \frac{2}{x^2} - \frac{3}{2} \qquad (x \in \mathbb{R} \setminus \{0\})$$

függvény grafikonját! (12 pont)

5. Írja fel az alábbi függvény 0 középpontú másodfokú Taylor-polinomját, és adjon becslést a közelítés hibájára a  $[0, \frac{1}{8}]$  intervallumon! (8 pont)

$$f(x) := \sqrt[3]{1+4x}$$
  $\left(x > -\frac{1}{4}\right)$ .