



3. előadás

FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KAPCSOLATA A DERIVÁLTAL 2.

Konvex és konkáv függvények

A konvex és konkáv függvények fogalmát már az Analízis I. kurzuson bevezettük. Ezzel az volt a célunk, hogy néhány alapfüggvény konvexitási tulajdonságát vizsgáljuk, és így teljes képet kapjunk ezekről a függvényekről. Nevezetesen a hatvány-, a reciprok és a gyökfüggvények esetében sikerült ezt „ügyes” számításokkal megvalósítani a definíció alapján. Azonban az exponenciális függvénynél azt mondtuk, hogy szigorú konvexitása elemi úton igazolható ugyan, de a differenciálszámítás eszköztárával ezt az állítást jóval egyszerűbben tudjuk bizonyítani.

Emlékezzünk, hogy egy függvény konvexitása bizonyos „alaki” tulajdonságaival van összefüggésben. Az mondtuk, hogy egy függvény szigorúan konvex (konkáv) egy I intervallumon, ha tetszőleges $a, b \in I$, $a < b$ pontpár esetén a függvény (a, b) intervallumhoz tartozó része az $(a, f(a))$ és $(b, f(b))$ pontokat összekötő húr alatt (felett) van. Az alábbi ábrák ezt illusztrálják. Az f függvény szigorúan konvex, és a g függvény szigorúan konkáv.



A szóban forgó húr egyenesének egyenlete:

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a), \quad \text{vagy} \quad y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b) + f(b).$$

A konvex és konkáv függvények pontos fogalma a következő:

1. Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $I \subseteq \mathcal{D}_f$ egy intervallum. Ha $\forall a, b \in I$, $a < b$ esetén igaz az, hogy

- ha $\forall x \in (a, b): f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$, akkor azt mondjuk, hogy az f függvény **konvex az I intervallumon**,
- ha $\forall x \in (a, b): f(x) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$, akkor azt mondjuk, hogy az f függvény **konkáv az I intervallumon**,

Szigorú egyenlőtlenségek esetén **szigorúan konvex**, illetve **szigorúan konkáv** függvényekről beszélünk.

Megjegyzés. Mivel a húr egyenesének egyenlete kétféle módon írható fel, így a fenti definícióban szereplő

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a) \quad \text{kifejezés helyett az} \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b) + f(b)$$

kifejezés is írható.

Most tegyük fel, hogy az f függvény konvex az I nyílt intervallumon, és $x \in I$ egy tetszőleges pont. Legyen tovább $u, v \in I$, $u < x < v$ két tetszőleges pont. Ekkor a fenti megjegyzés miatt egyszerre igaz, hogy

$$f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u) \quad \text{és} \quad f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - v) + f(v),$$

ami egyszerű ekvivalens átalakításokkal a következő módon írható át


$$(*) \quad \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \frac{f(x) - f(v)}{x - v}.$$

Ha a függvény konkáv, szigorúan konvex vagy szigorúan konkáv, akkor a $(*)$ -ban szereplő relációk irányán és élességén kell megfelelően változtatni.

Az ábra szemlélteti $(*)$ geometriai jelentését. Látható, hogy az e_1 , az e_2 és az e_3 húrok meredekségei rendre a $(*)$ -ban szereplő különbséghányadosok, és ezek nagysága megfelelnek a $(*)$ -ban szereplő egyenlőtlenségeknek.

Megjegyzés. Legyen $a \in I$ és

$$F_a(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in I \setminus \{a\}).$$



Mivel $u < x < v$ tetszőleges pontok, így $(*)$ -ból következik, hogy f akkor és csak akkor (szigorúan) konvex, ha az $F_a(x)$ különbséghányados-függvény (szigorúan) monoton növekvő. Konkáv függvények esetén csökkenő monotonitás lép fel.

1. Tétel (A konvexitás és a deriválhatóság kapcsolata). Legyen $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy $f \in D^2(a, b)$. Ekkor

1. f konvex [illetve f konkáv] (a, b) -n $\iff f'' \geq 0$ [illetve $f'' \leq 0$] (a, b) -n;
2. ha $f'' > 0$ [illetve $f'' < 0$] (a, b) -n $\implies f$ szigorúan konvex [illetve f szigorúan konkáv] (a, b) -n.

Bizonyítás. Igazolható, hogy

- f konvex (a, b) -n $\iff f' \nearrow (a, b)$ -n,
- f szigorúan konvex (a, b) -n $\iff f' \uparrow (a, b)$ -n,
- f konkáv (a, b) -n $\iff f' \searrow (a, b)$ -n,
- f szigorúan konkáv (a, b) -n $\iff f' \downarrow (a, b)$ -n.

Ekkor a tétel állítása a monotonitás és a derivált kapcsolatáról szóló tételből következik, ha a tételt alkalmazzuk az f' függvényre, hiszen $f'' = (f')'$.

A négy állításból csak az elsőt fogjuk igazolni. A többi hasonlóan igazolható. Tegyük fel, hogy f konvex (a, b) -n, $u, v \in (a, b)$, $u < v$ két tetszőleges pont és $u < x < v$ egy tetszőleges pont. Ekkor (*) miatt határátmenettel:

$$f'(u) = \lim_{x \rightarrow u} \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \quad \text{és} \quad f'(v) = \lim_{x \rightarrow v} \frac{f(x) - f(v)}{x - v} \geq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}$$

amiből $f'(u) \leq f'(v)$ következik, azaz f' monoton növekvő az (a, b) intervallumon.

Fordítva, tegyük fel, hogy az f' derivált függvény monoton növekvő az (a, b) intervallumon és vegyük az $a < u < x < v < b$ tetszőleges pontokat. Ekkor a Lagrange-féle közéérték-tétel szerint létezik egy $u < \xi_1 < x$ és egy $x < \xi_2 < v$ szám, hogy

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(u)}{x - u}, \quad f'(\xi_2) = \frac{f(v) - f(x)}{v - x}.$$

A monotonitás miatt $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, azaz

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(x)}{v - x},$$

ami a következő módon alakítható át:

$$\begin{aligned} (f(x) - f(u))(v - x) &\leq (f(v) - f(x))(x - u) \\ f(x)((v - x) + (x - u)) &\leq f(u)(v - x) + f(v)(x - u) \\ f(x)(v - u) &\leq f(u)((v - u) - (x - u)) + f(v)(x - u) \\ f(x)(v - u) &\leq (f(v) - f(u))(x - u) + f(u)(v - u) \\ f(x) &\leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u). \end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy f konvex függvény.

Megjegyzés. Az előző tétel értelmében az exponenciális függvény szigorúan konvex \mathbb{R} -n azért, mert $\forall x \in \mathbb{R}: (\exp)''(x) = \exp(x) > 0$.

2. Definíció. Legyen $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D(a, b)$. Ekkor azt mondjuk, hogy a $c \in (a, b)$ pont az f függvénynek **inflexiós pontja**, ha

$$\exists \delta > 0: f \text{ konvex } (c - \delta, c] \text{-n és konkáv } [c, c + \delta) \text{-n, vagy fordítva.}$$

Megjegyzések.

1. A konvexitás és a deriválhatóság kapcsolatáról szóló tétel értelmében, ha $f \in D^2(a, b)$ és $c \in (a, b)$ inflexiós pont, akkor f'' előjele különbözik c egy bal és egy jobb oldali környezetében. Ha még $f'' \in C\{c\}$, akkor ez csak akkor lehetséges, ha $f''(c) = 0$. Ezt hívjuk **az inflexiós pontra vonatkozó másodrendű szükséges feltételnek**.
2. Igazolható, hogy a függvény inflexiós pontjain az érintő „átszeli” a függvény grafikonját szigorú konvexitási váltás mellett. Pontosabban, ha e jelöli az f függvény érintőjét a c pontban, akkor a $\varphi := f - e$ függvénynek előjelváltása van a c pontban. Ez a jelenség könnyen megfigyelhető az $f(x) := x^3$ ($x \in \mathbb{R}$) függvény esetén a $c = 0$ pontban, ahol a függvénynek inflexiós pontja van, és ott az érintő egyenlete $e(x) = 0$ ($x \in \mathbb{R}$).

1. Feladat. Vizsgáljuk meg konveritás szempontjából a következő függvényt

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2} \quad (x \neq 0),$$

és határozzuk meg az inflexiós pontjait!

Megoldás. Előjelvizsgálatot fogunk végezni a függvény második deriváltjával, amelyet már kiszámoltunk egy korábbi előadásban:

$$f''(x) = \frac{2x+6}{x^4}, \quad (x \neq 0).$$

Ennek egyetlen zérushelye az $x = -3$. Ekkor a monotonitáshoz hasonló táblázatot készítünk, de ennek első sorában f'' szerepel. A \smile szimbólummal jelöljük azt, hogy a függvény konvex, a \frown szimbólummal pedig azt, hogy a függvény konkáv az adott intervallumon.

	$x < -3$	-3	$-3 < x < 0$	$x > 0$
f''	$-$	0	$+$	$+$
f	\frown	$-2/9$	\smile	\smile
		infl.		

A táblázatból rögtön leolvasható, mely intervallumokon lesz konvex vagy konkáv a függvény, illetve az, hogy f -nek inflexiós pontja van az $x = -3$ helyen, ahol a függvény értéke $f(-3) = -2/9$.

Aszimptoták

Ha egy függvény grafikonja nem korlátos, akkor úgy kell ábrázolni, hogy érzékelhető legyen az a tendencia, amit a függvény követ, amikor „elhagyja” a rajzterületet. Ehhez a függvény határérték nagyon fontos segítséget nyújt. Előfordul, hogy a grafikon pontjai tetszőleges közelségbe kerülnek egy adott egyeneshez, ún. **aszimptotához**. A legegyszerűbb ilyen eset, amikor a függvénynek egy a pontban van bal vagy jobb oldali határértéke, és ez $-\infty$ vagy $+\infty$. Ekkor az $x = a$ egyenletű egyenes egy függőleges aszimptotája lesz a függvénynek.

Ha a függvény értelmezési tartománya nem korlátos, akkor lehet vízszintes aszimptotája is. Ez akkor fordul elő, amikor létezik a függvény határértéke a $-\infty$ -ben vagy a $+\infty$ -ben, és ez egy A számmal egyenlő. Ekkor $y = A$ az aszimptota egyenlete. De előfordulnak más esetek is.

3. Definíció. Legyen $a \in \mathbb{R}$ és $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Azt mondjuk, hogy az f függvénynek van aszimptotája $(+\infty)$ -ben, ha

$$\exists l(x) = Ax + B \quad (x \in \mathbb{R})$$

elsőfokú függvény, amelyre

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - l(x)) = 0.$$

Ekkor az $y = Ax + B$ egyenletű egyenes az f függvény **aszimptotája** $(+\infty)$ -ben.

A függvény $(-\infty)$ -beli aszimptotáját is hasonló módon értelmezzük.

2. Tétel. Legyen $a \in \mathbb{R}$. Az $f : (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek akkor és csak akkor van aszimptotája $(+\infty)$ -ben, ha léteznek és végesek a következő határértékek:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} =: A \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - Ax) =: B \in \mathbb{R}.$$

Ekkor az

$$l(x) = Ax + B \quad (x \in \mathbb{R})$$

egyenes az f függvény aszimptotája $(+\infty)$ -ben.

Bizonyítás. A tétel könnyen igazolható a határérték alaptulajdonságai alapján.

Megjegyzés. Hasonló állítás érvényes a $(-\infty)$ -beli aszimptoták meghatározására.

A L'Hospital-szabály

Ebben a fejezetben láttuk, hogy a differenciálszámítás eszköztárával milyen hatékonyan tudunk meghatározni több függvénytulajdonságot. Az aszimptoták kivételnek tűnnek, mert ehhez határértékszámítás szükséges. Most megmutatjuk, hogy a differenciálszámítás is remek módon alkalmazható függvények határértékének kiszámításában.

Először lássuk hogyan számítjuk a következő határértéket az eddigi ismereteink alapján:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^8 + 3x^5 - 2x^2 - 2}{x^4 - 6x^2 + 5x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)}(x^7 + x^6 + x^5 + 4x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 2x + 2)}{\cancel{(x-1)}(x^3 + x^2 - 5x)} = -\frac{19}{3}.$$

Egy $0/0$ típusú kritikus határértékről van szó. A számlalóból és a nevezőből kiemeltük az $x - 1$ tényezőt, és egyszerűsítés után kiértékeljük $x = 1$ -re a fennmaradó kifejezést. Itt a problémát a kiemelés jelenti, amire több módszer ismert, de ezek általában sok számítással járnak. Most megpróbálkozunk valami mással. Legyen $a = 1$, illetve

$$f(x) := x^8 + 3x^5 - 2x^2 - 2 \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g(x) := x^4 - 6x^2 + 5x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Tudjuk, hogy f és g differenciálható függvények,

$$f'(x) = 8x^7 + 15x^4 - 4x \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és} \quad g'(x) = 4x^3 - 12x + 5 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Mivel $f, g \in D\{a\}$, $f(a) = g(a) = 0$ és $g'(a) \neq 0$, így

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}{\frac{g(x)-g(a)}{x-a}} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \frac{f'(a)}{g'(a)}.$$

Ha az $f'(a) = f'(1) = 19$ és a $g'(a) = g'(1) = -3$ értékeket egymással elosztjuk, akkor megkapjuk a már ismert végeredményt. A határérték kiszámításához „csak” külön kellett deriválni a számlalót és a nevezőt, és az így kapott hányadost kiértékelni az $x = a$ pontban.

A most bemutatott módszer csak a fent megadott feltételek mellett alkalmazható. Több olyan eset van, amikor az \mathbb{R} -beli műveletek és a határérték kapcsolatára vonatkozó tételek nem alkalmazhatók, ezek az ún. **kritikus határértékek**. Ilyenek például a következők:

$$(+\infty) + (-\infty), \quad 0 \cdot (\pm\infty), \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad 0^0.$$

Szerencsére a bemutatott módszer csak egy speciális esete egy jóval általánosabb állításnak, amit L'Hospital-szabálynak nevezünk.

3. Tétel (L'Hospital-szabály a 0/0 esetben). Legyen $(-\infty \leq a < b < +\infty)$, illetve $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} \bullet f, g \in D(a, b), \\ \bullet \forall x \in (a, b): g'(x) \neq 0, \\ \bullet \lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = 0, \\ \bullet \exists \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}. \end{array} \right\} \implies \exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \text{ és } \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'}.$$

Bizonyítás. Először vegyük észre, hogy a Rolle-tétel alapján, ha $g' \neq 0$ (a, b) -n, akkor g -nek legfeljebb egy zérushelye van (a, b) -n. Ekkor választhatunk olyan $b > a$ számot, hogy $g \neq 0$ (a, b) -n.

Két esetet fogunk megkülönböztetni

1. $a > -\infty$ (véges). Legyen $A := \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$. Azt kell igazolni, hogy $\lim_{a+0} \frac{f}{g} = A$, azaz

$$(\#) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in (a, a + \delta) \subseteq (a, b): \frac{f(x)}{g(x)} \in K_\varepsilon(A).$$

Az $A = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'}$ feltétel azt jelenti, hogy

$$(\#\#) \quad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall y \in (a, a + \delta) \subseteq (a, b): \frac{f'(y)}{g'(y)} \in K_\varepsilon(A).$$

Értelmezzük az f és a g függvényt az a pontban úgy, hogy

$$f(a) := 0 \quad \text{és} \quad g(a) := 0.$$

A $\lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = 0$ feltételből következik, hogy ekkor $f, g \in C[a, a + \delta)$.

Legyen most $x \in (a, a + \delta)$ tetszőleges pont. A Cauchy-féle középértéktétel feltételei az f és a g függvényre az $[a, x]$ intervallumon teljesülnek. Így $\exists \xi_x \in (a, x)$, amelyre

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} \quad (\text{és ez } (\#\#) \text{ miatt}) \in K_\varepsilon(A).$$

A $(\#)$ állítást tehát bebizonyítottuk. A $\lim_{a+0} \frac{f}{g}$ határérték létezik, és $\lim_{a+0} \frac{f}{g} = A$.

2. $a = -\infty$. Legyen $-\infty < c < \min\{0, b\}$, $d := -1/c$ és

$$F(x) := f(-1/x), \quad G(x) := g(-1/x) \quad (x \in (0, d)).$$

Ekkor F és G kielégítik a 0/0 esetre vonatkozó L'Hospital-szabály feltételeit $(0, d)$ -n, illetve az összetett függvény deriváltja szerint

$$F'(x) := f'(-1/x) \cdot \frac{1}{x^2}, \quad G'(x) := g'(-1/x) \cdot \frac{1}{x^2} \quad (x \in (0, d)).$$

Így az $x = -1/y$ helyettesítéssel

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{f(y)}{g(y)} &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{F(x)}{G(x)} = (\text{L'Hospital}) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{F'(x)}{G'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\frac{1}{x^2} f'(-1/x)}{\frac{1}{x^2} g'(-1/x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{f'(-1/x)}{g'(-1/x)} = \lim_{y \rightarrow -\infty} \frac{f'(y)}{g'(y)}.\end{aligned}$$

Most megfogalmazzuk a $(+\infty)/(+\infty)$ kritikus határértékre vonatkozó L'Hospital-szabályt.

4. Tétel (L'Hospital-szabály a $(+\infty)/(+\infty)$ esetben). Legyen $(-\infty \leq a < b < +\infty)$, illetve $f, g \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ekkor

$$\left. \begin{array}{l} \bullet f, g \in D(a, b), \\ \bullet \forall x \in (a, b): g'(x) \neq 0, \\ \bullet \lim_{a+0} f = \lim_{a+0} g = +\infty, \\ \bullet \exists \lim_{a+0} \frac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}. \end{array} \right\} \implies \exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \text{ és } \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'}.$$

Bizonyítás. Nem bizonyítjuk.

Megjegyzések.

1. Ha $(-\infty < a < b \leq +\infty)$, akkor a L'Hospital-szabály minkét esete átfogalmazható a ***b* pontbeli bal oldali határértékre** (így tehát $+\infty$ -ben vett határértékekre is). Ehhez elegendő az $y = -x$ helyettesítést elvégezni. Így a L'Hospital-szabály könnyen kétoldali határértékekre is átfogalmazható.
2. A $(+\infty)/(+\infty)$ esetre vonatkozó L'Hospital-szabály alkalmazható a $(+\infty)/(-\infty)$, a $(-\infty)/(+\infty)$ és a $(-\infty)/(-\infty)$ típusú esetekre is.
3. Mivel az $a < b$ értékeket úgy választhatjuk, hogy egymáshoz tetszőleges közelségben legyenek, így a $\forall x \in (a, b): g'(x) \neq 0$ feltétel szinte mindig előfordul a gyakorlatban.
4. A L'Hospital-szabály alkalmazása előtt győződjünk meg, hogy a határérték teljesíti a szabály alkalmazásához szükséges feltételeket. Például, ha

$$f(x) := \cos x, \quad \text{és} \quad g(x) := x + 1 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

akkor

$$\lim_0 \frac{f}{g} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x + 1} = \frac{1}{0 + 1} = 1, \quad \text{de} \quad \lim_0 \frac{f'}{g'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{1} = 0 \neq \lim_0 \frac{f}{g}.$$

5. A L'Hospital-szabály többször egymás után is alkalmazható, ha szükséges. Például

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Azonban előfordul, hogy ez soha nem vezet eredményhez. Például

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x},$$

és ha még egyszer alkalmazzuk a L'Hospital-szabályt, akkor az induló kifejezést kapjuk.

6. A L'Hospital-szabály nem fordítható meg abban az értelemben, hogy ha elvégzése után a kapott határérték nem létezik, akkor attól még lehet, hogy a keresett határérték létezik. Például

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1} \nexists, \text{ de } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x} \right) = 1.$$

Ha $a > 1$ és $1 \leq n \in \mathbb{N}$, akkor a L'Hospital-szabály n -szeri alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{x^n} &= \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln a) \cdot a^x}{n \cdot x^{n-1}} = \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln a)^2 \cdot a^x}{n \cdot (n-1) \cdot x^{n-2}} = \dots = \\ &= \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln a)^{n-1} \cdot a^x}{n(n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot x} = \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln a)^n \cdot a^x}{n!} = +\infty. \end{aligned}$$

Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy ha $a > 1$, akkor $x \rightarrow +\infty$ esetén az a^x ($x \in \mathbb{R}$) függvény gyorsabban tart $(+\infty)$ -hez, mint x bármelyik pozitív kitevőjű hatványa, és ezt szokás így is jelölni:

$$x^n \ll a^x, \quad \text{ha } x \text{ elég nagy.}$$

Hasonlóan, ha $1 \leq m, n \in \mathbb{N}$, akkor a L'Hospital-szabály n -szeri alkalmazásával azt kapjuk, hogy

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^n x}{x^m} = \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n \cdot \ln^{n-1} x}{m \cdot x^m} = \dots = \left(\frac{+\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{m^n \cdot x^m} = 0,$$

azaz x bármely pozitív kitevőjű hatványa gyorsabban tart $(+\infty)$ -hez $x \rightarrow +\infty$ esetén, mint $\ln x$ bármely pozitív kitevőjű hatványa. Röviden: minden $1 \leq n, m \in \mathbb{N}$ esetén

$$(\ln x)^n \ll x^m, \quad \text{ha } x \text{ elég nagy.}$$

A többi kritikus határértéktípust gyakran vissza lehet vezetni $0/0$ vagy $(+\infty)/(+\infty)$ típusú határértékre, és így megpróbálhatjuk alkalmazni a L'Hospital-szabályt.

Példák.

$$1. \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x = (0 \cdot (-\infty)) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \left(\frac{-\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0+0} (-x) = 0.$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= (?) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} = \\ &= \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x + \cos x - x \sin x} = \frac{0}{1 + 1 - 0} = 0. \end{aligned}$$

$$3. \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} x^x = (0^0) = \lim_{x \rightarrow 0+0} (e^{\ln x})^x = \lim_{x \rightarrow 0+0} e^{x \ln x} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x \right) = \exp(0) = 1,$$

hiszen \exp folytonos függvény, és már igazoltuk, hogy $\lim_{x \rightarrow 0+0} x \ln x = 0$.

Teljes függvényvizsgálat

Adott f valós-valós függvény **teljes függvényvizsgálatán** f analitikus és geometriai tulajdonságainak a megállapítását értjük. Ennek során a következőket kell meghatározni:

1. Kezdeti vizsgálatok. (Deriválhatóság, zérushelyek, előjelvizsgálat, paritás, periodicitás megállapítása.)
2. Lokális szélsőértékek és monotonitási intervallumok.
3. Konvexitási intervallumok és inflexiós pontok.
4. Határértékek és aszimptoták.
5. A függvény grafikonjának felrajzolása.

2. Feladat. Teljes függvényvizsgálat végzése után vázolja az

$$f(x) := x - 1 - \frac{4x}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvény grafikonját!

Megoldás.

1. **Kezdeti vizsgálatok.** A deriválási szabályok alapján az f függvény minden $x \in \mathbb{R}$ pontban akárhányszor deriválható. Mivel

$$f(x) = x - 1 - \frac{4x}{x^2 + 1} = \frac{x^3 - x^2 - 3x - 1}{x^2 + 1} = \frac{(x+1)(x^2 - 2x - 1)}{x^2 + 1},$$

így $f(x) = 0 \iff x = -1$ vagy $x^2 - 2x - 1 = 0$, azaz

$$x = -1, \quad x = x_1 := 1 - \sqrt{2} \approx -0,414 \quad \text{vagy} \quad x = x_2 := 1 + \sqrt{2} \approx 2,414.$$

Előjelvizsgálat

	$x < -1$	-1	$-1 < x < x_1$	x_1	$x_1 < x < x_2$	x_2	$x > x_2$
f	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

A függvény nem páros, páratlan vagy periodikus.

2. **Monotonitás.** Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f'(x) = 1 - \frac{4 \cdot (x^2 + 1) - 4x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^4 + 6x^2 - 3}{(x^2 + 1)^2},$$

ezért

$$f'(x) = 0 \iff x^4 + 6x^2 - 3 = 0.$$

A $t = x^2$ helyettesítéssel

$$t^2 + 6t - 3 = 0 \iff t = -3 - 2\sqrt{3} < 0, \quad \text{vagy} \quad t = -3 + 2\sqrt{3} > 0.$$

Ezért $x^2 = 2\sqrt{3} - 3 \iff$

$$x = x_3 := \sqrt{2\sqrt{3} - 3} \approx 0,681 \quad \text{vagy} \quad x = -x_3 := -\sqrt{2\sqrt{3} - 3} \approx -0,681$$

	$x < -x_3$	$-x_3$	$-x_3 < x < x_3$	x_3	$x > x_3$
f'	+	0	-	0	+
f	\uparrow	0,18	\downarrow	-2,18	\uparrow
lok.		max		min	

3. **Konveritás.** Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$f''(x) = \frac{(4x^3 + 12x)(x^2 + 1)^2 - (x^4 + 6x^2 - 3) \cdot 2(x^2 + 1) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^4} = \frac{8x(3 - x^2)}{(x^2 + 1)^3},$$

ezért $f''(x) = 0 \iff x = 0, \quad x = -\sqrt{3} \approx -1,73, \quad \text{vagy} \quad x = \sqrt{3} \approx 1,73.$

	$x < -\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	$-\sqrt{3} < x < 0$	0	$0 < x < \sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$x > \sqrt{3}$
f''	+	0	-	0	+	0	-
f	\smile	-1	\frown	-1	\smile	-1	\frown
		infl.		infl.		infl.	

4. **Határértékek és aszimptoták.** Mivel

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x}{1 + x^2} = \left(\frac{\pm\infty}{+\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{2x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x} = 0,$$

ezért

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x - 1 - \frac{4x}{1 + x^2} \right) = \pm\infty - 1 - 0 = \pm\infty.$$

Továbbá

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{4}{1 + x^2} \right) = 1 =: A$$

és

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - 1 \cdot x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-1 - \frac{4x}{1 + x^2} \right) = -1 =: B.$$

Ez azt jelenti, hogy az $y = Ax + B$, azaz az $y = x - 1$ egyenletű egyenes az f függvény aszimptotája $(+\infty)$ -ben és $(-\infty)$ -ben is.

5. **Ábrázolás.**

