

# Numerikus módszerek C

## 12. előadás: Numerikus integrálás

Krebsz Anna

ELTE IK





**Feladat:** az

$$\int_a^b f(x) dx \quad \text{illetve az} \quad \int_a^b f(x) w(x) dx$$

Riemann integrál közelítő kiszámítása, ahol  $w(x) \geq 0$  súlyfüggvény.

**Feladat:** az

$$\int_a^b f(x) dx \quad \text{illetve az} \quad \int_a^b f(x)w(x) dx$$

Riemann integrál közelítő kiszámítása, ahol  $w(x) \geq 0$  súlyfüggvény.

Kézenfekvő lenne a definícióval (alsó- és felső közelítő összegekkel vagy Riemann közelítő összeggel) számolni, azonban így túl sokat kellene számolnunk a pontosabb eredmény eléréséhez.

→ Nem gazdaságos.

## Alkalmazási területei a matematikában:

- Amikor a primitív függvény nem állítható elő zárt alakban.

## Alkalmazási területei a matematikában:

- Amikor a primitív függvény nem állítható elő zárt alakban.
- Az analitikus integrálás túl bonyolult lenne.

## Alkalmazási területei a matematikában:

- Amikor a primitív függvény nem állítható elő zárt alakban.
- Az analitikus integrálás túl bonyolult lenne.
- Terület, térfogat, ívhossz számításnál.



## Alkalmazási területei a matematikában:

- Amikor a primitív függvény nem állítható elő zárt alakban.
- Az analitikus integrálás túl bonyolult lenne.
- Terület, térfogat, ívhossz számításnál.
- Differenciálegyeletek numerikus módszereinél a módszerek konstrukciójakor.

## Alkalmazási területei a matematikában:

- Amikor a primitív függvény nem állítható elő zárt alakban.
- Az analitikus integrálás túl bonyolult lenne.
- Terület, térfogat, ívhossz számításnál.
- Differenciálegyeletek numerikus módszereinél a módszerek konstrukciójakor.

**Példa:** Számítsuk ki a következő integrálok értékét!

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = ?, \quad \int_0^{\pi} \cos(x^2) dx = ?$$

## Alkalmazási területei a fizikában:

- Pl. forgatónyomaték, sűrűség, görbület számításnál.

## Alkalmazási területei a fizikában:

- Pl. forgatónyomaték, sűrűség, görbület számításnál.
- Ha a függvény csak mintavételezéssel adott.

## Alkalmazási területei a fizikában:

- Pl. forgatónyomaték, sűrűség, görbület számításnál.
- Ha a függvény csak mintavételezéssel adott.

**Példa:** Egy gazdaság területe egy folyó egyenes 10 km hosszú partszakaszának egyik partján fekszik. A folyó mentén kilométerenként megmérték, hogy a folyóra merőleges irányban hány kilométerre nyúlik a gazdaság területe. A kapott 11 értékből számítsuk ki közelítően a gazdaság területét!

## Ötlet:

Tekintsük az  $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$  felosztást és az általánosabb tárgyalásmódhoz a  $w(x) \geq 0$  súlyfüggvényt. Feltesszük, hogy  $\int_a^b w(x) dx < \infty$ . Közelítsük az  $f(x)$  függvényt az interpolációs polinomjának Lagrange-alakjával,  $L_n(x)$ -el.

## Ötlet:

Tekintsük az  $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$  felosztást és az általánosabb tárgyalásmódhoz a  $w(x) \geq 0$  súlyfüggvényt. Feltesszük, hogy  $\int_a^b w(x) dx < \infty$ . Közelítsük az  $f(x)$  függvényt az interpolációs polinomjának Lagrange-alakjával,  $L_n(x)$ -el.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)w(x) dx &\approx \int_a^b L_n(x)w(x) dx = \int_a^b \sum_{k=0}^n f(x_k)\ell_k(x)w(x) dx = \\ &= \sum_{k=0}^n f(x_k) \underbrace{\int_a^b \ell_k(x)w(x) dx}_{=: A_k} = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \end{aligned}$$

## Ötlet:

Tekintsük az  $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$  felosztást és az általánosabb tárgyalásmódhoz a  $w(x) \geq 0$  súlyfüggvényt. Feltesszük, hogy  $\int_a^b w(x) dx < \infty$ . Közelítsük az  $f(x)$  függvényt az interpolációs polinomjának Lagrange-alakjával,  $L_n(x)$ -el.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)w(x) dx &\approx \int_a^b L_n(x)w(x) dx = \int_a^b \sum_{k=0}^n f(x_k)\ell_k(x)w(x) dx = \\ &= \sum_{k=0}^n f(x_k) \underbrace{\int_a^b \ell_k(x)w(x) dx}_{=: A_k} = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \end{aligned}$$

**Megj.:**  $A_k$  csak az alappontoktól és a súlyfüggvénytől függ,  $f$ -től nem. Szingularitással rendelkező függvények esetén lesz szerepe a súlyfüggvénynek.



## **Definíció:** Interpolációs kvadrátúra formulák

- ① A  $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  formulát *kvadrátúra formulának* nevezzük.

## Definíció: Interpolációs kvadratura formulák

- 1 A  $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  formulát *kvadratura formulának* nevezzük.
- 2 A kvadratura formula *interpolációs típusú*, ha  $A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx$  ( $k = 0, \dots, n$ ).

## Definíció: Interpolációs kvadratura formulák

- ① A  $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  formulát *kvadratura formulának* nevezzük.
- ② A kvadratura formula *interpolációs típusú*, ha  $A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx$  ( $k = 0, \dots, n$ ).

## Tétel: Pontossági tétel

$$\forall f \in P_n\text{-re} \quad \int_a^b f(x) w(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

$$\Leftrightarrow A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx \quad (k = 0, \dots, n)$$

## Definíció: Interpolációs kvadratúra formulák

- ① A  $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  formulát *kvadratúra formulának* nevezzük.
- ② A kvadratúra formula *interpolációs típusú*, ha  $A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx$  ( $k = 0, \dots, n$ ).

## Tétel: Pontossági tétel

$$\forall f \in P_n\text{-re} \quad \int_a^b f(x) w(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

$$\Leftrightarrow A_k = \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx \quad (k = 0, \dots, n)$$

## Következmény:

①  $f \equiv 1$ -re pontos a formula:

$$\sum_{k=0}^n A_k = \int_a^b w(x) dx =: \mu_0.$$

## Következmény:

- ❶  $f \equiv 1$ -re pontos a formula:

$$\sum_{k=0}^n A_k = \int_a^b w(x) dx =: \mu_0.$$

- ❷ Ha  $w(x) \equiv 1$ , akkor

$$\sum_{k=0}^n A_k = b - a.$$

**Megjegyzés.:** A  $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  képletben  $2(n+1)$  szabad paraméter van:  $A_k, x_k$ , így a legfeljebb  $n$ -edfokú polinomokra való pontosság kevésnek tűnik.

**Megjegyzés.:** A  $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  képletben  $2(n+1)$  szabad paraméter van:  $A_k, x_k$ , így a legfeljebb  $n$ -edfokú polinomokra való pontosság kevésnek tűnik.

**Kvadratúra formula típusok:**



**Megjegyzés.:** A  $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  képletben  $2(n+1)$  szabad paraméter van:  $A_k, x_k$ , így a legfeljebb  $n$ -edfokú polinomokra való pontosság kevésnek tűnik.

## Kvadratúra formula típusok:

### ① Newton–Cotes típus:

$w(x) \equiv 1$  és az  $\{x_i : i = 0, \dots, n\}$  alappontok egyenletes felosztású pontok  $[a; b]$ -n.

**Megjegyzés.:** A  $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  képletben  $2(n+1)$  szabad paraméter van:  $A_k, x_k$ , így a legfeljebb  $n$ -edfokú polinomokra való pontosság kevésnek tűnik.

## Kvadratúra formula típusok:

### ① Newton–Cotes típus:

$w(x) \equiv 1$  és az  $\{x_i : i = 0, \dots, n\}$  alappontok egyenletes felosztású pontok  $[a; b]$ -n.

### ② Csebisev típus:

$A_k \equiv A$  ( $k = 0, \dots, n$ ).

**Megjegyzés.:** A  $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$  képletben  $2(n+1)$  szabad paraméter van:  $A_k, x_k$ , így a legfeljebb  $n$ -edfokú polinomokra való pontosság kevésnek tűnik.

## Kvadratúra formula típusok:

### ① Newton–Cotes típus:

$w(x) \equiv 1$  és az  $\{x_i : i = 0, \dots, n\}$  alappontok egyenletes felosztású pontok  $[a; b]$ -n.

### ② Csebisev típus:

$A_k \equiv A$  ( $k = 0, \dots, n$ ).

### ③ Gauss típus:

maximális fokszámig  $(2n+1)$  pontos formulák.



## Newton–Cotes típusú kvadratúra formulák:

$$w(x) \equiv 1 \quad \text{és} \quad x_k = x_0 + kh$$

## Newton–Cotes típusú kvadratúra formulák:

$$w(x) \equiv 1 \quad \text{és} \quad x_k = x_0 + kh$$

- **Zárt formulák ( $Z(n)$ ):**  $a$  és  $b$  alappont

$$x_0 = a, x_n = b, \quad h = \frac{b - a}{n} \quad \text{és} \quad x_k = a + kh \quad (k = 0, \dots, n)$$

## Newton–Cotes típusú kvadratúra formulák:

$$w(x) \equiv 1 \quad \text{és} \quad x_k = x_0 + kh$$

- **Zárt formulák ( $Z(n)$ ):**  $a$  és  $b$  alappont

$$x_0 = a, x_n = b, \quad h = \frac{b-a}{n} \quad \text{és} \quad x_k = a + kh \quad (k = 0, \dots, n)$$

- **Nyílt formulák ( $Ny(n)$ ):**  $a$  és  $b$  *nem* alappont

$$h = \frac{b-a}{n+2}, \quad x_k = a + kh \quad (k = 1, \dots, n+1) \quad \text{így} \quad x_0 = a+h, \quad x_n = b-h$$

## A zárt N-C együtthatók számítása:

$$x = a + th, \quad t \in [0; n]$$

$$x - x_j = (t - j)h$$

$$x_k - x_j = (k - j)h$$



## A zárt N-C együtthatók számítása:

$$x = a + th, \quad t \in [0; n]$$

$$x - x_j = (t - j)h$$

$$x_k - x_j = (k - j)h$$

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) dx = \int_a^b \frac{(x - x_0) \dots \sqrt[k]{\dots} (x - x_n)}{(x_k - x_0) \dots \sqrt[k]{\dots} (x_k - x_n)} dx$$

## A zárt N-C együtthatók számítása:

$$x = a + th, \quad t \in [0; n]$$

$$x - x_j = (t - j)h$$

$$x_k - x_j = (k - j)h$$

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) dx = \int_a^b \frac{(x - x_0) \dots \sqrt[k]{\dots} (x - x_n)}{(x_k - x_0) \dots \sqrt[k]{\dots} (x_k - x_n)} dx$$

A  $t = \frac{x-a}{h}$  helyettesítést bevezetve  $a \mapsto 0, b \mapsto n$  és  $dx = h dt$ :

$$A_k = h \cdot \int_0^n \frac{(t - 0)(t - 1) \dots \sqrt[k]{\dots} (t - n)}{(k - 0)(k - 1) \dots \sqrt[k]{\dots} (k - n)} dt$$

$$\begin{aligned}
 A_k &= h \cdot \int_0^n \frac{(t-0)(t-1)\dots \cancel{t} \dots (t-n)}{(k-0)(k-1)\dots \cancel{k} \dots (k-n)} dt = \\
 &= h \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{k!(n-k)!} \cdot \int_0^n \frac{t(t-1)\dots(t-n)}{(t-k)} dt = \\
 &= (b-a) \underbrace{\frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k!(n-k)!} \cdot \int_0^n \frac{t(t-1)\dots(t-n)}{(t-k)} dt}_{=B_k^{(z)}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A_k &= h \cdot \int_0^n \frac{(t-0)(t-1)\dots \cancel{t} \dots (t-n)}{(k-0)(k-1)\dots \cancel{k} \dots (k-n)} dt = \\
 &= h \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{k!(n-k)!} \cdot \int_0^n \frac{t(t-1)\dots(t-n)}{(t-k)} dt = \\
 &= (b-a) \underbrace{\frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k!(n-k)!} \cdot \int_0^n \frac{t(t-1)\dots(t-n)}{(t-k)} dt}_{=B_k^{(z)}}
 \end{aligned}$$

A  $B_k^{(z)}$  együtthatók függetlenek az  $[a; b]$  intervallumtól.

## A nyílt N-C együtthatók számítása.

$$x = a + th, \quad t \in [0; n + 2]$$

$$x - x_j = (a + th) - (a + (j + 1)h) = (t - (j + 1))h$$

$$x_k - x_j = (a + (k + 1)h) - (a + (j + 1)h) = (k - j)h$$

## A nyílt N-C együtthatók számítása.

$$x = a + th, \quad t \in [0; n + 2]$$

$$x - x_j = (a + th) - (a + (j + 1)h) = (t - (j + 1))h$$

$$x_k - x_j = (a + (k + 1)h) - (a + (j + 1)h) = (k - j)h$$

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) dx = \int_a^b \frac{(x - x_0) \dots \sqrt[k]{\dots} (x - x_n)}{(x_k - x_0) \dots \sqrt[k]{\dots} (x_k - x_n)} dx$$

## A nyílt N-C együtthatók számítása.

$$x = a + th, \quad t \in [0; n + 2]$$

$$x - x_j = (a + th) - (a + (j + 1)h) = (t - (j + 1))h$$

$$x_k - x_j = (a + (k + 1)h) - (a + (j + 1)h) = (k - j)h$$

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) dx = \int_a^b \frac{(x - x_0) \dots \sqrt[k]{\dots} (x - x_n)}{(x_k - x_0) \dots \sqrt[k]{\dots} (x_k - x_n)} dx$$

A  $t = \frac{x-a}{h}$  helyettesítést bevezetve  $a \mapsto 0, b \mapsto n + 2$  és  $dx = h dt$ :

$$A_k = h \cdot \int_0^{n+2} \frac{(t - 1) \dots (t - k)(t - (k + 2)) \dots (t - (n + 1))}{k(k - 1) \dots 1 \cdot (k - (k + 1)) \dots (k - n)} dt$$

$$\begin{aligned}
 A_k &= h \cdot \int_0^{n+2} \frac{(t-1) \dots (t-k)(t-(k+2)) \dots (t-(n+1))}{k(k-1) \dots 1 \cdot (k-(k+1)) \dots (k-n)} dt = \\
 &= h \cdot \frac{(-1)^{n-k}}{k!(n-k)!} \cdot \int_0^{n+2} \frac{(t-1) \dots (t-(n+1))}{(t-(k+1))} dt = \\
 &= (b-a) \underbrace{\frac{(-1)^{n-k}}{(n+2) \cdot k!(n-k)!} \cdot \int_0^{n+2} \frac{(t-1) \dots (t-(n+1))}{(t-(k+1))} dt}_{=B_k^{(ny)}}
 \end{aligned}$$

A  $B_k^{(ny)}$  együtthatók függetlenek az  $[a; b]$  intervallumtól.



Tétel:

$$\textcircled{1} \sum_{k=0}^n B_k = 1$$

Tétel:

- 1  $\sum_{k=0}^n B_k = 1$
- 2  $B_k = B_{n-k}, \quad k = 0, \dots, n$

Tétel:

- 1  $\sum_{k=0}^n B_k = 1$
- 2  $B_k = B_{n-k}, \quad k = 0, \dots, n$

**Biz:**

**Tétel:**

❶  $\sum_{k=0}^n B_k = 1$

❷  $B_k = B_{n-k}, \quad k = 0, \dots, n$

**Biz:**

❶  $f \equiv 1$ -re pontos a formula illetve

## Tétel:

- ①  $\sum_{k=0}^n B_k = 1$
- ②  $B_k = B_{n-k}, \quad k = 0, \dots, n$

## Biz:

- ①  $f \equiv 1$ -re pontos a formula illetve
- ② az alappontok szimmetriájából következik.  
( $y := n - t$  változó bevezetésével az integrálból.)

A N-C formulák együtthatóit más módon is meghatározhatjuk. A  $P_n$ -re való pontosság az integrál linearitása miatt azonos az  $1, x, x^2, \dots, x^n$  hatványfüggvényekre való pontossággal. Ebből  $A_k$ -ra LER-t írhatunk fel:

A N-C formulák együtthatóit más módon is meghatározhatjuk. A  $P_n$ -re való pontosság az integrál linearitása miatt azonos az  $1, x, x^2, \dots, x^n$  hatványfüggvényekre való pontossággal. Ebből  $A_k$ -ra LER-t írhatunk fel:

$$\int_a^b 1 \, dx = b - a = A_0 + A_1 + \dots + A_n$$

$$\int_a^b x \, dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) = A_0x_0 + A_1x_1 + \dots + A_nx_n$$

.....

$$\int_a^b x^n \, dx = \frac{1}{n+1} (b^{n+1} - a^{n+1}) = A_0x_0^n + A_1x_1^n + \dots + A_nx_n^n$$

A N-C formulák együtthatóit más módon is meghatározhatjuk. A  $P_n$ -re való pontosság az integrál linearitása miatt azonos az  $1, x, x^2, \dots, x^n$  hatványfüggvényekre való pontossággal. Ebből  $A_k$ -ra LER-t írhatunk fel:

$$\int_a^b 1 \, dx = b - a = A_0 + A_1 + \dots + A_n$$

$$\int_a^b x \, dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) = A_0x_0 + A_1x_1 + \dots + A_nx_n$$

.....

$$\int_a^b x^n \, dx = \frac{1}{n+1} (b^{n+1} - a^{n+1}) = A_0x_0^n + A_1x_1^n + \dots + A_nx_n^n$$

A kapott LER mátrixa a Vandermonde-mátrix transzponáltja, tehát a fenti módszer csak kézi számolásra használható.



## Érintő formula (Ny(0))

$$\int_a^b f \approx (b - a) \cdot f\left(\frac{a + b}{2}\right) =: E(f)$$

## Érintő formula (Ny(0))

$$\int_a^b f \approx (b - a) \cdot f\left(\frac{a + b}{2}\right) =: E(f)$$

**Biz:** A Newton–Cotes együtthatók tulajdonsága alapján


$$A_0 = b - a.$$

## Érintő formula (Ny(0))

$$\int_a^b f \approx (b-a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) =: E(f)$$

**Biz:** A Newton–Cotes együtthatók tulajdonsága alapján

$$A_0 = b - a.$$



## Trapéz formula (Z(1))

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{2} \cdot (f(a) + f(b)) =: T(f)$$

## Trapéz formula (Z(1))


$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{2} \cdot (f(a) + f(b)) =: T(f)$$

**Biz:** A Newton–Cotes együtthatók tulajdonsága alapján  $A_0 = A_1$  és  $A_0 + A_1 = b - a$ . Innen  $A_0 = A_1 = \frac{b-a}{2}$ .

## Trapéz formula (Z(1))

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{2} \cdot (f(a) + f(b)) =: T(f)$$

**Biz:** A Newton–Cotes együtthatók tulajdonsága alapján  $A_0 = A_1$  és  $A_0 + A_1 = b - a$ . Innen  $A_0 = A_1 = \frac{b-a}{2}$ .



## Simpson formula (Z(2))

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{6} \cdot \left( f(a) + 4 \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) =: S(f)$$

## Simpson formula (Z(2))

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{6} \cdot \left( f(a) + 4 \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) =: S(f)$$

**Biz:** Elég  $A_1$ -et a definícióból számolni.

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_a^b \ell_1(x) dx = \int_a^b \frac{(x-a)(x-b)}{\left(\frac{a+b}{2} - a\right)\left(\frac{a+b}{2} - b\right)} dx = \\ &= \frac{-4}{(b-a)^2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx = \\ &= \frac{-4}{(b-a)^2} \int_a^b (x^2 - (a+b)x + ab) dx \end{aligned}$$



## Simpson formula (Z(2))

$$\begin{aligned} &= \frac{-4}{(b-a)^2} \left[ \frac{x^3}{3} - (a+b)\frac{x^2}{2} + ab \cdot x \right]_a^b = \\ &= \frac{-4}{(b-a)^2} \left( \frac{1}{3}(b^3 - a^3) - \frac{1}{2}(a+b)(b^2 - a^2) + ab(b-a) \right) = \\ &= \frac{-4}{6(b-a)^2} \left( 2(b^3 - a^3) - 3(a+b)(b^2 - a^2) + 6ab(b-a) \right) = \\ &= \frac{-4}{6(b-a)^2} \left( 2b^3 - 2a^3 - (3ab^2 - 3a^3 + 3b^3 - 3a^2b) + 6ab^2 - 6a^2b \right) = \\ &= \frac{-4}{6(b-a)^2} \left( -b^3 + a^3 + 3ab^2 - 3a^2b \right) = \frac{4(b-a)^3}{6(b-a)^2} = \frac{4}{6}(b-a) = A_1 \end{aligned}$$

## Simpson formula (Z(2))

$$\begin{aligned} &= \frac{-4}{(b-a)^2} \left[ \frac{x^3}{3} - (a+b)\frac{x^2}{2} + ab \cdot x \right]_a^b = \\ &= \frac{-4}{(b-a)^2} \left( \frac{1}{3}(b^3 - a^3) - \frac{1}{2}(a+b)(b^2 - a^2) + ab(b-a) \right) = \\ &= \frac{-4}{6(b-a)^2} \left( 2(b^3 - a^3) - 3(a+b)(b^2 - a^2) + 6ab(b-a) \right) = \\ &= \frac{-4}{6(b-a)^2} \left( 2b^3 - 2a^3 - (3ab^2 - 3a^3 + 3b^3 - 3a^2b) + 6ab^2 - 6a^2b \right) = \\ &= \frac{-4}{6(b-a)^2} \left( -b^3 + a^3 + 3ab^2 - 3a^2b \right) = \frac{4(b-a)^3}{6(b-a)^2} = \frac{4}{6}(b-a) = A_1 \end{aligned}$$

Innen

$$A_0 = A_2 \text{ és } A_0 + A_1 + A_2 = b - a \quad \Rightarrow \quad A_0 = A_2 = \frac{1}{6}(b-a).$$



Tétel (Emlékeztető): Az integrálszámítás középértéktétele

Ha  $f \in C[a; b]$  és  $g \geq 0$ , ekkor  $\exists \xi \in (a; b)$ :

$$\int_a^b fg = f(\xi) \cdot \int_a^b g.$$

**Tétel (Emlékeztető):** Az integrálszámítás középértéktétele

Ha  $f \in C[a; b]$  és  $g \geq 0$ , ekkor  $\exists \xi \in (a; b)$ :

$$\int_a^b fg = f(\xi) \cdot \int_a^b g.$$

**Tétel:** Az érintő formula hibája

Ha  $f \in C^2[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - E(f) = \frac{(b-a)^3}{24} \cdot f''(\eta).$$

**Tétel (Emlékeztető):** Az integrálszámítás középértéktétele

Ha  $f \in C[a; b]$  és  $g \geq 0$ , ekkor  $\exists \xi \in (a; b)$ :

$$\int_a^b fg = f(\xi) \cdot \int_a^b g.$$

**Tétel:** Az érintő formula hibája

Ha  $f \in C^2[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - E(f) = \frac{(b-a)^3}{24} \cdot f''(\eta).$$

**Biz.:** Táblán.

**Tétel: A trapéz formula hibája**

Ha  $f \in C^2[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - T(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} \cdot f''(\eta).$$

**Tétel:** A trapéz formula hibája

Ha  $f \in C^2[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - T(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} \cdot f''(\eta).$$

**Biz.:** Táblán.



**Tétel: A trapéz formula hibája**

Ha  $f \in C^2[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - T(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} \cdot f''(\eta).$$

**Biz.:** Táblán.

**Tétel: A Simpson formula hibája**

Ha  $f \in C^4[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - S(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} \cdot f^{(4)}(\eta).$$

**Tétel: A trapéz formula hibája**

Ha  $f \in C^2[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - T(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} \cdot f''(\eta).$$

**Biz.:** Táblán.

**Tétel: A Simpson formula hibája**

Ha  $f \in C^4[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - S(f) = -\frac{(b-a)^5}{2880} \cdot f^{(4)}(\eta).$$

**Biz.:** Táblán.

## Tétel: A N-C formulák hibája

Jelölje  $I(f)$  jelöli a N-C kvadratúra formulát.

❶ Ha  $n$  páratlan és  $f \in C^{n+1}[a; b]$ , akkor létezik  $\xi \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - I(f) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega_n(x) dx.$$

**Tétel: A N-C formulák hibája**

Jelölje  $I(f)$  jelöli a N-C kvadratúra formulát.

- ❶ Ha  $n$  páratlan és  $f \in C^{n+1}[a; b]$ , akkor létezik  $\xi \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - I(f) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega_n(x) dx.$$

- ❷ Ha  $n$  páros és  $f \in C^{n+2}[a; b]$ , akkor létezik  $\xi \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - I(f) = \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \int_a^b x \cdot \omega_n(x) dx.$$

**Tétel: A N-C formulák hibája**

Jelölje  $I(f)$  jelöli a N-C kvadratúra formulát.

- ❶ Ha  $n$  páratlan és  $f \in C^{n+1}[a; b]$ , akkor létezik  $\xi \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - I(f) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega_n(x) dx.$$

- ❷ Ha  $n$  páros és  $f \in C^{n+2}[a; b]$ , akkor létezik  $\xi \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - I(f) = \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \int_a^b x \cdot \omega_n(x) dx.$$

**Megjegyzés:** Vagyis páros  $n$  esetén a formula nagyobb pontosságot tud, mint amit elvárunk tőle. (Lásd érintő és Simpson formula.) Nem biz.



# Trapéz összetett formula

$[a; b]$ -t  $m$  egyenlő részre osztjuk és minden részintervallumon trapéz formulát ( $T(f)$ ) alkalmazunk.

# Trapéz összetett formula

$[a; b]$ -t  $m$  egyenlő részre osztjuk és minden részintervallumon trapéz formulát ( $T(f)$ ) alkalmazunk.

## Trapéz összetett formula (Trapéz szabály)

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{2m} \cdot \left( f(a) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(b) \right) =: T_m(f)$$



# Trapéz összetett formula

$[a; b]$ -t  $m$  egyenlő részre osztjuk és minden részintervallumon trapéz formulát ( $T(f)$ ) alkalmazunk.

## Trapéz összetett formula (Trapéz szabály)

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{2m} \cdot \left( f(a) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(b) \right) =: T_m(f)$$

**Megj.:** A megjegyzendő együttható sorozat:  $1, 2, 2, \dots, 2, 2, 1$ .

# Trapéz összetett formula

$[a; b]$ -t  $m$  egyenlő részre osztjuk és minden részintervallumon trapéz formulát ( $T(f)$ ) alkalmazunk.

## Trapéz összetett formula (Trapéz szabály)

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{2m} \cdot \left( f(a) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(b) \right) =: T_m(f)$$

**Megj.:** A megjegyzendő együttható sorozat:  $1, 2, 2, \dots, 2, 2, 1$ .

## Tétel: A trapéz összetett formula hibája

Ha  $f \in C^2[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - T_m(f) = -\frac{(b-a)^3}{12m^2} \cdot f''(\eta).$$

# Trapéz összetett formula

$[a; b]$ -t  $m$  egyenlő részre osztjuk és minden részintervallumon trapéz formulát ( $T(f)$ ) alkalmazunk.

## Trapéz összetett formula (Trapéz szabály)

$$\int_a^b f \approx \frac{b-a}{2m} \cdot \left( f(a) + 2 \sum_{k=1}^{m-1} f(x_k) + f(b) \right) =: T_m(f)$$

**Megj.:** A megjegyzendő együttható sorozat:  $1, 2, 2, \dots, 2, 2, 1$ .

## Tétel: A trapéz összetett formula hibája

Ha  $f \in C^2[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - T_m(f) = -\frac{(b-a)^3}{12m^2} \cdot f''(\eta).$$

**Biz.:** Táblán.

# Simpson összetett formula

Legyen  $m$  páros és  $[a; b]$ -t  $m$  egyenlő részre osztjuk, majd az  $I_k := [x_{2k-2}, x_{2k}]$ ,  $(k = 1, \dots, \frac{m}{2})$  részintervallumokra Simpson formulát  $(S(f))$  alkalmazunk. Vagyis a belső felezőpontokat is megszámoztuk, így  $\frac{m}{2}$  Simpson formulát használunk.

Legyen  $m$  páros és  $[a; b]$ -t  $m$  egyenlő részre osztjuk, majd az  $I_k := [x_{2k-2}, x_{2k}]$ ,  $(k = 1, \dots, \frac{m}{2})$  részintervallumokra Simpson formulát ( $S(f)$ ) alkalmazunk. Vagyis a belső felezőpontokat is megszámoztuk, így  $\frac{m}{2}$  Simpson formulát használunk.

## A Simpson összetett formula (Simpson szabály)

$$S_m(f) := \frac{b-a}{3m} \cdot \left( f(a) + 4 \sum_{k=1}^{\frac{m}{2}} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{\frac{m}{2}-1} f(x_{2k}) + f(b) \right)$$
$$\int_a^b f \approx S_m(f)$$

Legyen  $m$  páros és  $[a; b]$ -t  $m$  egyenlő részre osztjuk, majd az  $I_k := [x_{2k-2}, x_{2k}]$ ,  $(k = 1, \dots, \frac{m}{2})$  részintervallumokra Simpson formulát ( $S(f)$ ) alkalmazunk. Vagyis a belső felezőpontokat is megszámoztuk, így  $\frac{m}{2}$  Simpson formulát használunk.

## A Simpson összetett formula (Simpson szabály)

$$S_m(f) := \frac{b-a}{3m} \cdot \left( f(a) + 4 \sum_{k=1}^{\frac{m}{2}} f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{\frac{m}{2}-1} f(x_{2k}) + f(b) \right)$$
$$\int_a^b f \approx S_m(f)$$

**Megj.:** A megjegyzendő együttható sorozat:

$1, 4, 2, 4, \dots, 4, 2, 4, 1.$

Tétel: A Simpson összetett formula hibája

Ha  $f \in C^4[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - S_m(f) = -\frac{(b-a)^5}{180m^4} \cdot f^{(4)}(\eta).$$

**Tétel:** A Simpson összetett formula hibája

Ha  $f \in C^4[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - S_m(f) = -\frac{(b-a)^5}{180m^4} \cdot f^{(4)}(\eta).$$

**Biz.:** Táblán.



**Tétel:** A Simpson összetett formula hibája

Ha  $f \in C^4[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - S_m(f) = -\frac{(b-a)^5}{180m^4} \cdot f^{(4)}(\eta).$$

**Biz.:** Táblán.

**Megjegyzés:**

**Tétel:** A Simpson összetett formula hibája

Ha  $f \in C^4[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - S_m(f) = -\frac{(b-a)^5}{180m^4} \cdot f^{(4)}(\eta).$$

**Biz.:** Táblán.

**Megjegyzés:**

- Az érintő formulából is készíthető összetett formula az előzőekhez hasonlóan.

## Tétel: A Simpson összetett formula hibája

Ha  $f \in C^4[a; b]$ , ekkor  $\exists \eta \in [a; b]$ :

$$\int_a^b f - S_m(f) = -\frac{(b-a)^5}{180m^4} \cdot f^{(4)}(\eta).$$

**Biz.:** Táblán.

## Megjegyzés:

- Az érintő formulából is készíthető összetett formula az előzőekhez hasonlóan.
- Ha  $f \in C^2[a; b]$  illetve  $f \in C^4[a; b]$ , akkor  $m \rightarrow \infty$  esetén

$$T_m(f) \rightarrow \int_a^b f, \text{ illetve } S_m(f) \rightarrow \int_a^b f$$

$m^2$  illetve  $m^4$  nagyságrendben.

## Richardson-féle extrapoláció a trapéz összetett formulára:

Írjuk fel a trapéz összetett formulát  $m$ -re és  $2m$ -re:

$$\int_a^b f - T_m(f) = -\frac{(b-a)^3}{12m^2} \cdot f''(\eta_1)$$
$$\int_a^b f - T_{2m}(f) = -\frac{(b-a)^3}{48m^2} \cdot f''(\eta_2)$$

## Richardson-féle extrapoláció a trapéz összetett formulára:

Írjuk fel a trapéz összetett formulát  $m$ -re és  $2m$ -re:

$$\begin{aligned}\int_a^b f - T_m(f) &= -\frac{(b-a)^3}{12m^2} \cdot f''(\eta_1) \\ \int_a^b f - T_{2m}(f) &= -\frac{(b-a)^3}{48m^2} \cdot f''(\eta_2)\end{aligned}$$

Ha  $f''$  elég sima, akkor  $f''(\eta_1) \approx f''(\eta_2)$ , így a 2. egyenlet 4-szereséből kivonva az 1. egyenletet

**Richardson-féle extrapoláció a trapéz összetett formulára:**

Írjuk fel a trapéz összetett formulát  $m$ -re és  $2m$ -re:

$$\begin{aligned}\int_a^b f - T_m(f) &= -\frac{(b-a)^3}{12m^2} \cdot f''(\eta_1) \\ \int_a^b f - T_{2m}(f) &= -\frac{(b-a)^3}{48m^2} \cdot f''(\eta_2)\end{aligned}$$

Ha  $f''$  elég sima, akkor  $f''(\eta_1) \approx f''(\eta_2)$ , így a 2. egyenlet 4-szereséből kivonva az 1. egyenletet

$$\begin{aligned}3 \int_a^b f - 4T_{2m}(f) + T_m(f) &\approx 0 \\ \int_a^b f &\approx \frac{1}{3} (4T_{2m}(f) - T_m(f))\end{aligned}$$

A trapéz szabály javító formulája

$$\frac{1}{3}(4T_{2m}(f) - T_m(f)) = S_m(f)$$

A közelítés hibája  $O(h^4)$ .

## A trapéz szabály javító formulája

$$\frac{1}{3}(4T_{2m}(f) - T_m(f)) = S_m(f)$$

A közelítés hibája  $O(h^4)$ .

**Példa:** Az  $\int_0^1 x^{1/3} dx$  integrál kiszámításához a Richardson-féle extrapoláció nem használható, mert  $f$  nem deriválható a 0-ban. Az ehhez hasonló szingularitások kezeléséhez más típusú módszerek kellenek. (Lásd Gauss-kvadratúra formulák.)



## Richardson-féle extrapoláció a Simpson összetett formulára:

Írjuk fel a Simpson összetett formulát  $m$ -re és  $2m$ -re:

$$\int_a^b f - S_m(f) = -\frac{(b-a)^5}{180 m^4} \cdot f^{(4)}(\eta_1)$$
$$\int_a^b f - S_{2m}(f) = -\frac{(b-a)^5}{180 \cdot 16 m^4} \cdot f^{(4)}(\eta_2)$$

## Richardson-féle extrapoláció a Simpson összetett formulára:

Írjuk fel a Simpson összetett formulát  $m$ -re és  $2m$ -re:

$$\begin{aligned}\int_a^b f - S_m(f) &= -\frac{(b-a)^5}{180 m^4} \cdot f^{(4)}(\eta_1) \\ \int_a^b f - S_{2m}(f) &= -\frac{(b-a)^5}{180 \cdot 16 m^4} \cdot f^{(4)}(\eta_2)\end{aligned}$$

Ha  $f^{(4)}$  elég sima, akkor  $f^{(4)}(\eta_1) \approx f^{(4)}(\eta_2)$ , így a 2. egyenlet 16-szorosából kivonva az 1. egyenletet

**Richardson-féle extrapoláció a Simpson összetett formulára:**

Írjuk fel a Simpson összetett formulát  $m$ -re és  $2m$ -re:

$$\begin{aligned}\int_a^b f - S_m(f) &= -\frac{(b-a)^5}{180 m^4} \cdot f^{(4)}(\eta_1) \\ \int_a^b f - S_{2m}(f) &= -\frac{(b-a)^5}{180 \cdot 16 m^4} \cdot f^{(4)}(\eta_2)\end{aligned}$$

Ha  $f^{(4)}$  elég sima, akkor  $f^{(4)}(\eta_1) \approx f^{(4)}(\eta_2)$ , így a 2. egyenlet 16-szorosából kivonva az 1. egyenletet

$$\begin{aligned}15 \int_a^b f - 16 S_{2m}(f) + S_m(f) &\approx 0 \\ \int_a^b f &\approx \frac{1}{15} (16 S_{2m}(f) - S_m(f))\end{aligned}$$

## A Simpson szabály javító formulája

$$\frac{1}{15} (16 S_{2m}(f) - S_m(f))$$

A közelítés hibája  $O(h^6)$ .

## Megjegyzés:

- A Richardson-féle extrapolációból készített rekurzió a Romberg integrálás alapja.

## Megjegyzés:

- A Richardson-féle extrapolációból készített rekurzió a Romberg integrálás alapja.
- A gyakorlati számítások során jól használhatók a következő tételek:

## Megjegyzés:

- A Richardson-féle extrapolációból készített rekurzió a Romberg integrálás alapja.
- A gyakorlati számítások során jól használhatók a következő tételek:

## Tétel:

- Ha  $f''$  korlátos  $[a; b]$ -n, akkor

$$\left| \int_a^b f - T_m(f) \right| \leq |T_m(f) - T_{2m}(f)|.$$

## Megjegyzés:

- A Richardson-féle extrapolációból készített rekurzió a Romberg integrálás alapja.
- A gyakorlati számítások során jól használhatók a következő tételek:

## Tétel:

- Ha  $f''$  korlátos  $[a; b]$ -n, akkor

$$\left| \int_a^b f - T_m(f) \right| \leq |T_m(f) - T_{2m}(f)|.$$

- Ha  $f^{(4)}$  korlátos  $[a; b]$ -n, akkor

$$\left| \int_a^b f - S_m(f) \right| \leq |S_m(f) - S_{2m}(f)|.$$